



જીલ્લા કૃષિ હવામાન એકમ (DAMU)

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (GKMS)
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી
અમદેલી-૩૬૫૬૦૧
કોન્ન નં. ૦૨૭૯૨ ૨૨૭૧૨૨



(જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપત્ત્ર)

આનંદી
કા
અમૃત મહોત્સવ
#AmritMahotsav



અહીં ક્લિક કરી કૃષિ હવામાન બુલેટીન અંગે આપના પ્રતિભાવ અવશ્ય જણાવો



અમદેલી જીલ્લાના તાલુકાઓ મુજબની હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ માટે ટેલીગ્રામ અથવા



વોટ્સઅપ ગ્રૂપમાં જોડાવા અંતિમ પેજની મુલાકાત લો

અમદેલી કૃષિ હવામાન બુલેટીન ક. ૦૯૯/૨૦૨૨

તા. ૧૬-૧૨-૨૦૨૨

અમદેલી જીલ્લાની તા. 17/12/2022 થી 21/12/2022 ની હવામાન આગાહી:

#	હવામાન પરિબળો	17/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
૧	વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
૨	મહત્તમ તાપમાન (°સે.)	31	31	32	31	31
૩	લઘુતમ તાપમાન (°સે.)	22	22	21	21	20
૪	મહત્તમ બેજ સવાર (%)	44	33	25	26	21
૫	લઘુતમ બેજ બપોર (%)	24	20	17	15	14
૬	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	10.2	13	14.3	11.7	12.7
૭	પવનની દિશા (ડિગ્રી)	45	56	30	56	27
		ઇશાન	ઇશાન	ઉત્તર ઇશાન	ઇશાન	ઉત્તર ઇશાન
૮	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો) માંથી	6	4	3	3	0

નોંધ: આ આગાહી સમગ્ર જીલ્લાની સરેરાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જગ્યા માટે લાગુ કરવી નહિ.

કૃષિ સલાહ

હવામાન સારાંશ અમદેલી જીલ્લામાં આગામી પ દિવસ દરમિયાન હવામાન મધ્યમ બેજવાળું અને આંશિક વાદળાંથું રહેવાની શક્યતા છે. આગામી પ દિવસ દરમિયાન મહત્તમ તાપમાન **૩૧-૩૨ °સે** અને લઘુતમ તાપમાન **૨૦-૨૧ °સે** જેટલું રહેવાની શક્યતા છે. વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી.

પવનની ગતિ સામાન્ય, અંદાજીત ૧૦-૧૪ કિ.મી./કલાક સુધીની રહેવાની શક્યતા છે. દિશા મોટાબાળો ઇશાન થી ઉત્તર ઇશાન રહેવાની શક્યતા છે.

આગોઠણ અનુમાન: તા. ૨૨ થી ૨૬ ડિસેમ્બર દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં હવામાન આંશિક વાદળાંથું અથવા ચોખ્યું રહેવાની શક્યતા છે. વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. મહત્તમ તાપમાન અને લઘુતમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતા છે.

- સામાન્ય કૃષિ શલાહ
- જીલ્લાના પાકને અંકળથી બચાવવા માટે વહેલી સવારે સુતરાઉ કાપડ અથવા કંતાન વડે અંકળ ખંખેરી રોગનું જોખમ મહદાંશે ઘટાડી શકાય.
 - એરંડામાં ઘોડીયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલી કવીનાલ્ફોસ(૧.૫% ભૂકી) ૧૦લી.પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો.
 - ચાણાના પાકનું વાવેલ કરેલ હોય તો તેમાં આવતી લીલી અને લશકરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૬ ગ્રામ એમામેક્ટિન બેન્જોયેટ અથવા ૨૦ મીલી કવીનાલ્ફોસ ૧૦ લીટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવાથી સારુ પરીણામ મળે છે.

→ મેથી અને ધાળણા પાકમાં ભૂતીછારા રોગના નિયંત્રણ માટે હેક્ઝાક્ઝોનાઝોલ ૨૦ મીલી અથવા સલ્ફર ૮૦ % WP ૫૦ ગ્રામ/૧૫ લીટર પાણી બેળવીને છંટકાવ કરવો.

SMS

→ આગામી દિવસોમાં વાતાવરણ આંશિક વાદળણાંયું રહેવાની શક્યતા હોવાથી લસણ અને તેમાં સુકારો આવતો હોયતો પાકમાં પિયતને મુલતવી રાખવું.

પાક મુજબ ફૂષિ સલાહ

પાક	પાક અવસ્થા	કામગીરી / જાત / જીવાત / રોગ	ફૂષિ સલાહ
કપાસ	વીણી		<ul style="list-style-type: none"> બિન પિયત વિસ્તારમાં કપાસની છેલ્લી વીણી સમયસર પૂર્ણ કરવી . છેલ્લી વીણી પછી ઘેટા બકરા ચરાવવાજેથી ખૂલ્યા વગસના ગુલાબી ઈયળના નુકશાન વાળા . જીડવા અને અન્ય કચરો નાશ પામેત્યારબાદ કરાંઠી સળગાવવી નહિ પરંતુ . રોટાવેટર મોબાઇલ ચોપરથી નાના ટુકડા કરી જમીનમાં દાંટી/દેવા જેથી જમીન સેન્ટ્રિય તત્વનો ઉમેરો થવાથી સુંશ્મ જીવોની સંખ્યા વધશે અને જમીનના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અથવા . કરાંઠી ભેગી કરી શ્રેડરથી નાના ટુકડા કરીને છાણ, યુરીયા, કમ્પોસ્ટ કલ્બર ઉમેરી દેશી (સેન્ટ્રિય) .ખાતર બનાવવું
કુંગારી	રોગ વળી જવી અને જાંબલી ધાબાનો રોગ		<ul style="list-style-type: none"> કુંગારીમાં જાંબલી ધાબા, કોલેટોટ્રાયકમ અને ફ્લૂઝેરીયમ ફૂગનો રોગ લાગે નહિ તે માટે પ્રોપીકોનાઝોલ, મેસ્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અને કાર્બન્ડારીમ ૧૫ ગ્રામ ૧ પમ્પમાં વારાકૃતી કોઈપણ એક દવા નાખીને ૧૫ દિવસના અંતરે ૩ છંટકાવ કરવા. સર્કેદ કંજુ કુંગારીના વાવેતર સમયે કાર્બન્ડારીમ દવા ૨ થી ૩ ગ્રામ પ્રતિ કિલો મુજબ ૫૮ આપીને પછી વાવેતર કરવું. શિયાળુ કુંગારીનો રોપ ગાદી ક્યારા બનાવી તૈયાર કરવો.
આંબો	મધીયો		<ul style="list-style-type: none"> આંબાના મધિયાના નિયંત્રણ માટે ઇમિડાક્લોપ્રિડ ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૫૦ મિ મિક્સ કરી .લિ. થડ, ડાળીઓ ઉપર છંટકાવ કરવો શક્ય બને તો કૂલો આવતા હોય ત્યારે કોઈ જંતુનાશક દવા . છાંટવી નહી જેથી પરાગનયન બરાબર થઈ શકે અથવા લીમડા તેલ આધારિત દવા ૧૦૦ લિટર નાંખી છંટકાવ ક .લિ.પાણીમાં ૫૦૦ મિટ્રવો અથવા ગૌમૂર ૧૦ લિટર, ગાયનું છાણ ૨ કિલો તેમજ જેટ્રોફા (રતનજોયોત) ના પાન, આકડાના પાન, સીતાકૃણના પાન ૨,૨ કિલો લઈ કર્યારી તેનો રસ કાઢી, ઉકાળી ગાળી ૩.૪ દિવસ ઠરવા દઈ ૧૦ લિટર પાણીમાં ૫૦૦ મિ-લિ ઉમેરી . છંટકાવ કરવો
	મિલિબગ		<ul style="list-style-type: none"> મિલિબગ ના નિયંત્રણ માટે વાડીના (ચીકટો) શેફા ડિસેમ્બરમાં-નવેમ્બર .પાળા સાફ રાખવા / આ .ખામણાં સાફ કરી મિથાઈલ પેરાથિયાન ઉસ્ત ૨ ટકા ભૂકી ખામણામાં ગોડ કરી આપવી -સિવાય આંબાના થડ ફરતે ગ્રીસ લગાડેલ ૨૦૨૫ સેપ્ટેમ્બર .મી. ખામણામાં ગોડ કરી આપવી-આ સિવાય આંબાના થડ ફરતે ગ્રીસ લગાડેલ ૨૦ .૨૫ સેપ્ટેમ્બર ખાસ્ટિક .મી.નો પટ્ટો બાંધવો.
અજમો	વાવેતર		<ul style="list-style-type: none"> અજમાના વાવેતર માટે સુધારેલી જાત ગુરુનું વાવેતર કરવું-અજમો. હેક્ટર દીઠ બીજારી વાવણી ૧.૦ કિ.પ થી ૨.ગ્રા.૪૫ સે-૩૦ .મી.ના ગાળે વાવણી કરવી. વાવણી બાદ તરત જ હળવું પિયત આપવું.
	નીંદણ નિયંત્રણ		<ul style="list-style-type: none"> અસરકારક નીંદણ નિયંત્રણ માટે પેન્ડીમીથાલીન ૧.૦૦ કિ.ગ્રા./દે. (૩.૩૩૩ લિ.) દવાનો ઉપયોગ વાવણી બાદ તરત જ પાક ઉગ્યા પહેલાં ૨-૩ દિવસમાં છંટકાવ કરવો.
લસણ	ખાતર		<ul style="list-style-type: none"> ૨૫ કિ.ગ્રા. નાઇટ્રોજન પૂર્તિ ખાતર તરીકે વાવણીનાં એક મહિના પછી આપવો.
	અંતરખેડ અને નિદાણ નિયંત્રણ		<ul style="list-style-type: none"> ફેરરોપણી બાદ ૨૦ અને ૪૦ દિવસે એમ બે વખત હાથથી નીંદણ કરવું.
	પિયત		<ul style="list-style-type: none"> જડરિયાત મુજબ પિયત આપવું લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગ આવે નહિ તે માટે વધુ પડતું . પિયત આપવું નહિ

રાઈ/ રાયડો	ખેત આયોજન અને જાત પસંદગી	ખાતર	<ul style="list-style-type: none"> પૂર્તિ ખાતર માટે રય ડિલો નાઈટ્રોજન પાક જ્યારે કૂલદાંડી અસ્થાએ હોય ત્યારે એટલે કે અંદાજે વાવણી પછી તું થી ૪૦ દિવસે આપવો આ. આ સમયે જમીનમાં પુરતો ભેજ હોવો જરૂરી છે. માટે પર ડિલો ચુસ્તિયા અથવા ૧૫ ડિલો એમોનિયમ સલ્કેનો ઉપયોગ કરવો.
	આંતરખેડ અને નિદાન નિયંત્રણ		<ul style="list-style-type: none"> રાઈ ની બિનપિયત ખેતી પદ્ધતિમાં એકાદ આંતરખેડ તેમજ નિદામણનીજરૂર પડે છે જ્યારે. પિયત પાકમાં પાક ૨૦સે ઊચાઈનો થાય ત્યાર પછી જરૂરિયાત પ્રમાણે આંતરખેડ મી.
ચણા	ખેત આયોજન અને જાત પસંદગી	ખાતર	<ul style="list-style-type: none"> ચણાના મૂળમાં રાઈજોબિયમ જીવાણુંની પ્રવૃત્તિ ૧૧ દિવસોમાં શરૂ થાય છે, તેથી છોડ પોતે જ હવાનો નાઈટ્રોજન વાપરવાની શક્તિ મેળવી લે છે ચણાને આ કારણથી. પૂર્તિ ખાતરની જરૂર નથી. ધણા પેડૂતો પિયત ચણામાં પૂર્તિ ખાતર તરીકે ચુસ્તિયા આપે છે જેથી ખોટો ખર્ચ થાય છે. ઉપરાંત તેનાથી નુકસાન થાય છેઅમ વધારાનું નાઈટ્રોજન ખાતર. આપવાથી છોડની વધુ પડતી વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ થાય છે. આવા છોડમાં કૂલો પણ મોડાં બેસે છે તેથી ચણામાં પૂર્તિ ખાતર ક્યારેય ન આપવું.
	સુકારો		<ul style="list-style-type: none"> ૧૫-૨૦ દિવસના ચણામાં સહેદ કુગથી થતો સુકારો જોવા મળે તો તેના નિયંત્રણ માટે ટ્રાયકોર્મા કુગાનો પાવડર ૨.૫ કી.ગ્રા./હે. મુજબ વાપરવો.
ઘઉં	ખેત આયોજન અને જાત પસંદગી	વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> મોડી વાવણી : (રક નવેમ્બર થી ૧૦ ડિસેમ્બર) : જી૧૭૩-ડબલ્યુ., ૧૧, લોક૧૧-
		ખાતર	<ul style="list-style-type: none"> મધ્યમ પોટાશ ધરાવતી જમીનમાં મગફળી – (ખરીફ)ઘઉં પાક પદ્ધતિમાં ઘઉના પાકને (રવિ) ૧૫ કિગ્રા પાચાના ખાતર તરીકે અને ૧૫ કિગ્રા ૩૦ દિવસે પોટાશ .ગ્રા.પ્રતિ હેકટરે ૩૦ કી. (આપવાથી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે). પાચાના ખાતર તરીકે ૧૩૦ કીગ્રા ટીએપી., ૧૫ કિ મ્યુનેટ ઓફ. ગ્રા.યુરીયા અને ૧૦૦ કિ. ગ્રા. પોટાશ આપવું, જમીનમાં લોહ અને જસતનું પ્રમાણ ખામીયુક્ત અથવા મધ્યમ હોય તો ૧૫ કિગ્રા ફેરસ સલ્કેટ અને ૮ કીગ્રા ઝીક સલ્કેટ પાચાના ખાતર તરીકે વાવણી વખત.૦૮ દર વર્ષ જમીનમાં આપવું.
મુકુટ તંતુ મૂળ અવસ્થા			<ul style="list-style-type: none"> મુકુટ.અને પિયત આપવું.હે/ચુસ્તિયા. ગ્રા.તંતુ મૂળ અવસ્થાએ ૧૩૦ કી/.
	નિદામણ નિયંત્રણ		<ul style="list-style-type: none"> ઘઉના પાકમાં હાથથી નિદાન નિયંત્રણ હિતાવહ છેઅમ છતાં મજૂરોની અછત હોય તો .., વાવ્યા પછી અને ઉગાવા પહેલાં : (ઇમરજન્સ-પ્રી) પેન્ડીમિથાઇલ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ૫૫ મિપ્રમાણે ઓગાળી વાવેતરના પિયત બાદ ૪૮ કલાકની અંદર છંટકાવ કરવો.લી.. વાવ્યા પછી અને ઉગાવા બાદ પોસ્ટ ઇમરજન્સા): ઉભા પાકમાં પહોળા પાનવાળા નિદામણનું પ્રમાણ વધારે હોય તો વાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસે મેટા સલ્ફ્યુરોન ૮ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦૦ લીટર પાણી એટલે કે ૦.૮ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી અથવા ૧૨ ગ્રામ ૨, ૪ એસ્ટર) ટી-નિદામણનાશક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો (ફોર્મ
ધાળા	નિદામણ અને આંતરખેડ		<ul style="list-style-type: none"> નીદામણના ઉપદ્રવને ધ્યાનમાં રાખીને ૨ ર ૩ આંતરખેડ અને બે હાથ નીદામણ જરૂરિયાત રહે- છે જ્યાં મજૂરની અછત અને નીદામણ વધારે હોય ત્યારે વાવણી બાદ તૂરત ૪ નીદાનાશક .દવાઓ જેવી કે પેન્ડીમિથેલીન ૧૦ કિ.સિક્યુરિટી તત્ત્વ અથવા ફ્લ્યુક્લોરાલીન ૦.ગ્રા.૬ કિ.ગ્રા. સક્રિય તત્ત્વ પ્રતિ હેકટર પ્રમાણે વાવણી પહેલાં છંટકાવ કરી પિયત આપવું અથવા વાવણી બાદ પિયત આપી, બે દિવસ બાદ છંટકાવ કરવો.
જીંબ		પિયત	<ul style="list-style-type: none"> જીઝના પાકમાં પ્રથમ પિયત વાવણી બાદ તૂરત ૪ આપવું. જીઝનો ઉગાવો ૧૧ થી ૧૨ દિવસે થતો હોવાથી સારા ઉગાવા માટે બીજુ પિયત જમીનની પ્રત પ્રમાણે ૮ થી ૧૦ દિવસે સમયસર આપવું. જીઝ પિયત નીદામણ કર્યા બાદ ૩૦ દિવસે આપવું અને ચોંબુ પિયત ૫૦ દિવસે આપવું.
	નિદામણ અને આંતરખેડ		<ul style="list-style-type: none"> જીઝના પાકમાં જીરાળો નીદામણ મોટાભાગે જોવા મળે છે જીરાળાના નિયંત્રણ માટે વાવણી .બાદ ૨૫ થી ૩૦ દિવસે અને ૫૦ થી ૬૦ દિવસે હાથથી નીદામણ કરી નીદાનાશુક્ત રાખી શકાશે જીઝને ઘણીવાર પૂણીને વાવેતર કરવામાં આવે છે તેથી તેમાં રાસાયનિક પદ્ધતિથી નીદાન નિયંત્રણ કરવું આવશ્યક બને છે.આ પદ્ધતિમાં પેન્ડીમિથેલીન ૧.૦ કિ.સિક્યુરિય તત્ત્વ હેકટરે.ગ્રા.

		પ્રોગ્રામની વાચણી પછી પ્રથમ પિયત બાદ જમીનમાં પુરતો બેજ હોય ત્યારે પાકના ઉગાવા પહેલા એકસરખી રીતે જમીન પર છંટકાવ કરવો.
પાક સંરક્ષણ		<ul style="list-style-type: none"> મોલોમશીનો ઉપદ્રવ જણાય તો શોષક પ્રકારની દવાનો છંટકાવ કરવો. ભૂકીછારા રોગના નિયંત્રણ માટે વહેલી સવારે ૩૦૦ મૈશનો ગંધક પાવડર હેક્ટરે ૧૫ થી ૨૦ કીઅથવા.ગ્રા. પ્રોપીકોનેઝોલ અથવા હૈકાફોનેઝોલ ૧૦ મીલી દવા. ૧૦લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જીરુમાં ચરમી રોગના નિયંત્રણ માટે પાક ૩૦ દિવસનો થાય ત્યારે મેન્ડોઝેબ ૭૫% વેટેબલ પાવડર રૂપ ગ્રામ અથવા એઝોક્સીસ્ટ્રોબીન ૨૨ એસસી ૧૦ મિ અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦.લી. ૧૫.પા.વે ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનેઝોલ રૂપ ઇસી ૧૦ મિન્ટો.લી. લીટર પાણીમાં ભેળવી જરૂર્યાત મુજબ છંટકાવ કરવો.
શાકભાજુ	સફેદ માઘી	<ul style="list-style-type: none"> રીગણી અને ટામેટોમાં સફેદ માઘીના નિયંત્રણ માટે લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીભોળીના મૌંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ડાયફેન્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોક્સ ૪૦ ઇસી રૂપ મિ.લી. દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
કુંઘ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ		<ul style="list-style-type: none"> ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં દાંઠી દેવા અને કલોરાનટાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી દવા ૩ મિલી અથવા (રીનાક્ષીપાયર) .ડીડીવીપી ૭૬ ઇસી ૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
પાન કથીરી		<ul style="list-style-type: none"> રીગણમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા ઇસી ૧૫ મિલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.સી.
પશુપાલન		<ul style="list-style-type: none"> પશુઓના સ્વાસ્થ્યની તપાસ કરાવવી. નાના બચ્ચાને સમયાંતરે કૃમિનાશક દવાઓ આપવી. વેતરે આયેલ પશુનું બીજદાન કરાવવું. નાના બચ્ચાઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. બચ્ચાઓને જન્મયા પછી ખીરુ પીવડાવવું અને ઢંડી સામે રક્ષણ આપવું. પશુને ઢંડીથી બચાવવા ગોળ ખવડાવવો.

વિષય નિષ્ણાંત
કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર



કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અમરેલી દ્વારા બનાવવામાં આવેલા અમરેલી જીલ્લાના હવામાન આધ્યાત્મિક કૃષિ સલાહ અંગેના તાલુકા મુજબના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે તમારા તાલુકા પર ક્લિક કરો.



જીલ્લા કૃષિ હવામાન એકમ (DAMU), ગ્રામીણ કૃષિ મૌસૂમ સેવા (GKMS), કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી, અમરેલી.૩૬૫૦૧-, ફોન નં૦૨૭૧૯૨ ૨૨૭૧૧૨૨.

અમેરેલી જુલ્લો

<https://chat.whatsapp.com/JAWfIDrsNIgKE1Z2EYAkMq>



District Agrometeorological Unit (DAMU)

Gramin Krishi Mausam Seva (GKMS)

Krishi Vigyan Kendra

Junagadh Agricultural University

Amreli-365601

Phone: 02792-227122



Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department

आंतरिक
का
अमृत महोत्सव
#AmritMahotsav



Join our Telegram channel and block wise WhatsApp groups



Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 098 (2022)

Date: 16-12-2022

Weather Forecast from 17/12/2022 to 21/12/2022						
#	Parameter	17/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
1	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
2	Max.Temp.(°C)	31	31	32	31	31
3	Min.Temp.(°C)	22	22	21	21	20
4	RH-I (%)	44	33	25	26	21
5	RH-II (%)	24	20	17	15	14
6	Wind Speed (kmph)	10.2	13	14.3	11.7	12.7
7	Wind Direction(deg.)	45	56	30	56	27
		NE	NE	NNE	NE	NNE
8	Total CC (octa) out of 8	6	4	3	3	0

Note: Above forecast is the average situation of whole district

Agro-Advisory

Weather Summary

- The weather in Amreli District is likely to be dry and partly cloudy in next 5 days. No probability of rainfall in district in next five days. The minimum temperature is likely to be **21-22 °C**. The maximum temperature is likely to be **31-32° C** in next five days.
- Wind direction likely from NE to NNE in next 5 days **with gusts of 10 to 14 km/h.**
- Extended Range Forecast: No probability of rainfall over the Saurashtra and Kutch region from 22 to 26 December. Maximum temperature and minimum temperature likely normal on period of extended range forecast.

General Advisory

- The risk of diseases can be significantly reduced by the rattling of dew from the crop with a cotton cloth or linen in the early morning to protect the cumin crop from dew.

- For control of Semilooper in castor, Spray quinalphos @ 20 ml (1.5% powder) in 10 liters of water.
- Apply spray of emamectine benzoate @ 6 g or quinalphos @ 20 ml in 10 liters for control of Heliothis in chickpea of water and sprayed gives good results.
- To control powdery mildew in fenugreek and coriander crop, spray hexaconazole @ 20 ml or sulfur 80% WP @ 50 gm / 15 liters of water

**SMS
Advisory:**

- Postponed the irrigation in Onion and Garlic crop due to partly cloudy weather forecasted in next five days

Crops	Crop Stage	Practices	Advisory
Cotton	Picking and Pulling		<ul style="list-style-type: none"> • Carry out picking in time. • Animals like goats, sheep among others, should be allowed to graze on unopened bolls and plant debris in the cotton fields after the last picking to prevent infestation in subsequent year. After grazing, don't burn cotton stalk but do in situ chopping & burying of cotton stalk in soil by mobile chopper and rotavator to improve soil biomass and health.
Onion			<ul style="list-style-type: none"> • Seed should be sown on raised seedbed for seedling purpose. • Carry out transplanting of onion, if seedling is ready. • For the control of purple blotch blight and fusarium wilt disease in onion make 3 alternate sprays of Mancozeb 25 gm and Carbendazim 10 gm in 10 litres of water at 10 days interval.
Mango	Mango Hoppers		<ul style="list-style-type: none"> • Apply spray Imidacloprid @ 50 ml in 100 lit of water on stem of the orchard. Do not spray insecticides in mango during the flowering for the better pollination process. Or can spray of neem oil @ 500 ml Or Make mixture of Cow urine @ 10 lit + Cow dung @ 2 kg + Jetropha leaves @ 2 kg + Giant calotrope leaves @ 2 kg+ custard apple leaves @ 2 kg and spray after 3 days after boil it.
	Mealy bug		<ul style="list-style-type: none"> • Keep clean the borders of the orchard, and apply Methyl parathione 2% Dust in furrow. Or Fastening of alkathene sheet (400 gauge)/grease band of 25 cm wide afterwards mud plastering of trunk at 30 cm above the ground in the middle of December
Ajwain	Sowing		<ul style="list-style-type: none"> • Recommended variety: Gujarat Ajwain-2. • Seed rate: 1.5 to 2.0 kg/ha.

			<ul style="list-style-type: none"> • Spacing: 30 to 45 cm. • Apply light irrigation after sowing.
	Weed management		<ul style="list-style-type: none"> • For effective weed control apply spray of pendimethalin @ 1 kg a.i. (3.333 lit.) per hectare as a pre-emergence.
Mustard	Land Preparation and sowing	Fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> • Apply Nitrogen @ 25 kg/ha as a supplementary dose at the time of flowering stage i.e. approximately 35 to 40 days after sowing. The soil needs to have enough moisture at this time. For this apply urea @ 54 kg or ammonium sulphate @ 125 kg/ha. • Apply gypsum @ 250 kg/ha or Sulphur @ 40 kg/ha if there is a deficiency of sulphur in soil and choose SSP Fertilizer for the fulfilment of phosphorus, Apply zinc sulphate and Ferrous sulphate • If there is a deficiency of sulphur in the soil, Apply at the time of sowing in the form of gypsum at the rate of 250 kg / ha or 40 kg of sulphur and for chemical fertilizers choose single super phosphate for the fulfilment of phosphorus.
	Interculturing and Weed management		<ul style="list-style-type: none"> • One hand weeding and one interculturing is required in non irrigated mustard, and several weeding and interculturing are required as per the need after the plant height is reached 20 cm.
Garlic		Fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> • Apply 25 kg Nitrogen fertilizer at one month after sowing as supplementary dose.
	Interculturing and Weed management		<ul style="list-style-type: none"> • Two hand weeding 20 and 40 days after transplanting are recommended.
Chickpea	Land Preparation and Variety selection	fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> • The activity of Rhizobium bacteria in chickpea roots starts in 21 days, so the plant itself acquires to use nitrogen from the air. Chickpeas do not need adequate fertilizer for this reason. Many farmers apply urea as a supplement to irrigated chickpeas at a wrong cost. It also causes damage. Thus giving excessive nitrogen fertilizer leads to excessive vegetative growth of the plant. Such plants also have late flowering so never apply supplement fertilizer dose to chickpeas.
Wheat	Land Preparation	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> • Sowing the timely variety of wheat when maximum temperature down at 32 to 34 °C and minimum temperature lies between 18 to 20 °C.

and Variety selection	<ul style="list-style-type: none"> Timely Sowing: (15th to 25th November): Lok-1, GW-366, 496. Late sowing: (26th November to 10th September): GW-173,11 and Lok-11.
Crow root Initiation	<ul style="list-style-type: none"> Apply Irrigation after the application of urea @ 130 kg/ha at crow root initiation.
Fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> Farmers can gain more economic benefit by application of Potassium @ 30 kg (15 kg as a basal dose and 15 kg as supplement dose at 30 days after sowing) for soil having medium range of potash and previous crop is groundnut in kharif. Apply DAP @ 130 kg, Urea @ 15 kg and MOP @ 100 kg per hectare as a basal dose. Apply zinc sulphate @ 8 kg and Ferus sulphate @ 15 kg every year if there are deficiency of zinc and iron.
Corriender	<p>Weeding and Interculturing</p> <ul style="list-style-type: none"> Two hand weeding and 2 to 3 interculturing operations are recommended, Or Apply pendimethaline 1.0 kg a.i or fluchloralin 0.9 kg a.i/ha as a pre-emergence if there is shortage of labour.
Cumin	<p>Irrigation</p> <ul style="list-style-type: none"> Apply light irrigation after sowing. Apply second irrigation 8 to 10 days after sowing since, germination of the crop at 11 to 12 days. <p>Weeding and Interculturing</p> <ul style="list-style-type: none"> Keep crop weed free by doing weeding at 25 to 30 and 50 to 60 days after sowing. If there is sowing of the crop is done by broadcasting method then apply Pendimethalin @ 1.0 kg a.i. in 500 to 600 liters of water as a pre-emergence for the weed control.
	<p>Crop Protection</p> <ul style="list-style-type: none"> Apply spray of systemic insecticide if there observed aphid attack. Apply spray of Propiconazole @ 10 ml/10 liter in water or Hexaconazole or Supher @ 15-20 kg/ha for control of powdery mildew. Apply spray of Mancozeb 75 WP @25 g liter or Azoxystrobin 23 SC @ 10 ml or Propineb 70 WP @ 15 g or Propiconazole 25 EC @ 10 ml in 10 liter of water for the control of fusarium wilt.
Vegetable Crops	<p>Seedling, Vegetative and Fruiting</p> <p>Shoot & Fruit borer</p> <ul style="list-style-type: none"> In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato crops, infested fruits and shoots should be collected

and buried into the soil. If insect population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml or DDVP @ 7 ml/10 litre of water is advised.

Mites

- If infestation of mite is observed in brinjal, then spraying of Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water.
-

Livestock



- Regular health check-up to the animals.
 - Periodically give deworming to the young calf.
 - More care should be taken of new born calf. Give colostrum to the new born calf
 - Apply jaggery as a feed to the animals.
-

**Subject Matter Specialist
Agrometeorology**

Click your block to join whatsapp group of DAMU

Amreli
District

<https://chat.whatsapp.com/JAWflDrsNIgKE1Z2EYAkMq>