



જીલ્લા કૃષિ હવામાન એકમ (DAMU)

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (GKMS)
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી
અમદેલી-૩૬૫૬૦૧
કોન નં. ૦૨૭૯૮૨ ૨૨૭૭૧૨૨



(જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપત્તિ)

આનંદી
કા
અમૃત મહોત્સવ

#AmritMahotsav



અહીં ક્લિક કરી કૃષિ હવામાન બુલેટીન અંગે આપના પ્રતિભાવ અવશ્ય જણાવો



અમદેલી જીલ્લાના તાલુકાઓ મુજબની હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ માટે ટેલીગ્રામ અથવા



વોટ્સએપ ગુપમાં જોડાવા અંતિમ પેજની મુલાકાત લો

અમદેલી કૃષિ હવામાન બુલેટીન ક. ૦૫૦/૨૦૨૩

તા. ૨૭-૦૬-૨૦૨૩

પાછળા અઠવાડીયાનું અમદેલીનું હવામાન

	હવામાન પરિબળો	21-06-2023	22-06-2023	23-06-2023	24-06-2023	25-06-2023	26-06-2023	27-06-2023
૧	વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૫	૬૦	૨
૨	મહત્તમ તાપમાન (°સે.)	૩૬.૮	૩૬.૬	૩૬.૮	૩૫.૮	૩૧.૬	૨૯	૩૧.૩
૩	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.)	૨૬.૫	૨૬.૮	૨૭.૨	૨૬.૪	૨૪.૭	૨૪.૬	૨૫.૫
૪	મહત્તમ ભેજ સવાર (%)	૯૬	૯૭	૧૦૦	૯૯	૧૦૦	૧૦૦	૯૯
૫	લઘુત્તમ ભેજ બ્યોર (%)	૪૨	૪૫	૪૦	૪૭	૭૬	૮૬	૮૦
૬	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૧૨.૧	૧૧.૦	૧૨.૭	૧૧.૩	૭.૭	૭.૨	૧૦.૧
૭	પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૫૨	૫૧	૫૮	૬૨	૪૫	૪૨	૬૦
		પૂર્વ ઈશાન	પૂર્વ ઈશાન	પૂર્વ ઈશાન	પૂર્વ ઈશાન	ઈશાન	ઈશાન	પૂર્વ ઈશાન
૮	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા) ૮ માંથી	૨	૪	૪	૫	૬	૮	૮


અમદેલી જીલ્લાની તા. ૨૮/૦૬/૨૦૨૩ થી ૦૨/૦૭/૨૦૨૩ ની હવામાન આગાહી:

#	હવામાન પરિબળો	૨૮/૦૬/૨૦૨૩	૨૯/૦૬/૨૦૨૩	૩૦/૦૬/૨૦૨૩	૦૧/૦૭/૨૦૨૩	૦૨/૦૭/૨૦૨૩
૧	વરસાદ (મી.મી.)	૬૦	૭૦	૩૦	૨૦	૨૦
૨	મહત્તમ તાપમાન (°સે.)	૩૨	૩૧	૩૧	૩૦	૩૦
૩	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.)	૨૫	૨૪	૨૩	૨૪	૨૫
૪	મહત્તમ ભેજ સવાર (%)	૮૩	૮૭	૮૫	૮૫	૮૨
૫	લઘુત્તમ ભેજ બ્યોર (%)	૬૨	૮૦	૬૮	૭૩	૬૧
૬	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૨૩	૨૨	૨૪	૨૬	૨૭
૭	પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૪૮	૨૪૮	૨૪૮	૨૪૮	૨૪૮
		પશ્ચિમ નૈऋત્ય				
૮	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા) ૮ માંથી	૮	૮	૮	૭	૫

નોંધ: આ આગાહી સમગ્ર જીલ્લાની સરેરાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જગ્યા માટે લાગુ કરવી નહિ.

કૃષિ સલાહ

હવામાન સારાંશ	અમદેલી જીલ્લામાં આગામી ૫ દિવસ દરમિયાન હવામાન ભેજવાનું અને વાદળણાં રહેવાની શક્યતા છે. મહત્તમ તાપમાન ૩૦-૩૨ °સે અને લઘુત્તમ તાપમાન ૨૩-૨૫ °સે જેટલું રહેવાની શક્યતા છે. આગામી પાંચ દિવસ દરમિયાન જીલ્લામાં છુટા છવાયા મધ્યમ થી ભારે અને ઘણા વિસ્તારોમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
---------------	---



મહત્વમાન પવનની ગતિ સામાન્ય કરતા વધુ, અંદાજીત ૨૩-૨૭ કિમી/કલાક સુધી ની રહેવાની શક્યતા છે. પવનની દિશા પશ્ચિમ-નૈऋત્ય રહેવાની શક્યતા છે.

નૈऋત્ય ચોમાસુ: નૈऋત્ય ચોમાસું આજે ૨૭ જુને ઉત્તર અરબી સમુદ્રના મોટાભાગના ભાગોમાં, સંપૂર્ણ ગુજરાતમાં અને રાજસ્થાનના કેટલાક વધુ ભાગોમાં આગળ વધ્યું છે.

આગોતરં અનુમાન: તા. ૦૩ થી ૦૭ જુલાઈ ૨૦૨૩ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં હવામાન ભેજવાનું અને આંશિક વાદળાયું રહેવાની શક્યતા છે. મહત્વમાન તાપમાન ૨૮-૩૨ °સે અને લઘુત્તમ તાપમાન ૨૪-૨૮ °સે રહેવાની શક્યતા છે. આ અઠવાડિયા દરમિયાન છુટા છવાયા હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા રહેશે.

સામાન્ય ફૂલિયાની સલાહ

- બાકી રહેલા ચોમાસુ પાકો ની વાવણી કરવી.
 - વાવણી વખતે બિયારણ અને રસાયણિક ખાતરનું મિશ્રણ કરવાથી બિયારણને નુકસાન થઈ શકે છે, રસાયણિક ખાતર હમેશા બીજ થી પ સેમી દુર રહેતે મન રહેણું નાઈટ્રોજન યુક્ત ખાતર હમેશા બે અથવા ત્રણ ભાગમાં આપવું, દા. ત. વાવણી સમયે ૧ ભાગ આપેલ છે તો ત્યાર બાદ તેની પછીના એક અથવા બે ડોઝ ભલામણ મુજબ આપવા.
 - કુદરતી વધુ વરસાદી પરિસ્થિતિમાં બોડુતોએ ‘ખેતરનું પાણી ખેતરમાં, સીમનું પાણી સીમમાં’ સંગ્રહ કરવા પ્રયત્ન કરવો.
 - વધારાના પાણીનો સંગ્રહ તથા ભૂગર્ભ રીચાર્જ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ થવું જાઈએ જેથી કિમતી પાણીનો અગામી સમયમાં ઉપયોગ કરી શકાય.
 - જે ખેતરમાંથી પાણી નિતાર થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા હોય તો ઊભા પાકમાં ત્વરિત પાણીનો નિતાર થાય તેવા પગલાં લેવાથી પાકને બચાવી શકાય અને ઉત્પાદન મેળવી શકાય.
 - પવનની ગતિ વધુ હોય ત્યારે જંતુનાશક દવા, ખાતરનો છંટકાવ કરવો નહિ.
 - કોઈપણ પાકના બિયારણને પટ આપવા માટે પહેલા ફૂગનાશક, કીટનાશક અને ત્યારબાદ જ જૈવિક ખાતરનો પટ આપવો.
 - બિયારણ=>ફૂગનાશક=>કીટનાશક=>જૈવિક ખાતર
 - ચોમાસા પહેલાં કરમીયાની દવા પશુઓને પીવડાવી દેવી જોઈએ જેથી પશુઓને રોગો સામે રક્ષણ મળે કરાણ કે ચોમાસામાં કરમિયાનું પ્રમાણ વધે છે.
- SMS**
- જમીનજન્ય રોગ, મગફળીમાં સફેદફૂગનો સુકારો, કપાસનો સુકારો, મૂળખાઈ રોગના નિયંત્રણ માટે ટ્રાઇકોડર્મા ફૂગનો પાઉડર હેકટરે ૨.૫ ડિલો વાપરટો.

પાક મુજબ ફૂલિયાની સલાહ

પાક	પાક અવસ્થા	કામગીરી / જાત / રોગ / જીવત	ફૂલિયાની સલાહ
જળ વ્યવસ્થાપન		ખેત તલાવડી	<ul style="list-style-type: none"> ● ખરીદ વાવેતર પછી વરસાદ યોચાય ત્યારે પાકને ટકાવી રાખવા ખેતરમાં ખેત તલાવડી બનાવવી. ● ખેત તલાવડી ખેતરના નીચાણવાળા ભાગમાં બનાવવી. સંગ્રહ ક્ષમતા મુજબ ઢાળ અને નિકાલ વ્યવસ્થા નક્કી કરવા માટે ખેતરમાં કન્ટૂર સર્વે કરવામાં આવે છે. ખાસ્ટિક ફિલ્મ તળાવ (ખેત તલાવડી) ના તળિયે પાથરવાથી. ● હલકી પ્રતવાળી જમીનમાં પણ ખાસ્ટિક ફિલ્મ પાથરવાથી ખેત તલાવડીમાં પાણીનો સંગ્રહ કરી શકાય છે. કારવાળી જમીનમાં ખાસ્ટિક ફિલ્મ પાથરવાથી તળાવના પાણીમાં ક્ષાર ભળતો અટકાવી શકાય છે.

			<ul style="list-style-type: none"> તેના દ્વારા પાકની કટોકટીની અવસ્થાએ સિંચાઈ આપી શકાય છે તેમજ પાણીનો ઉપયોગ પીવા માટે કરી શકાય છે અને તેમાં મત્સ્ય પાલન પણ કરી શકાય છે.
કપાસ	વાવેતર	વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> વાવણી લાયક વરસાદ થયેથી જૂલાઈના બીજા અઠવાડીયા સુધીમાં વાવેતર કરવું
	ખાતર		<ul style="list-style-type: none"> ૧૦ ટન પ્રતિ હેક્ટારે સેન્ટ્રિય ખાતર (છાણીયું ખાતર) નાખવું. રાસાયણિક ખાતરો જમીનના પરીક્ષણ પણી, વાવેતર સમયે ૫૫ કિ.ગ્રા./હેક્ટર DAP અને ૧૨૫ કિ.ગ્રા./હેક્ટર મ્યુરેટ ઓફ પોટાસ આપી શકાય છે.
	વાવેતર અંતર:		<ul style="list-style-type: none"> પાયામાં રસાયણિક ખાતર પપ કિગ્રા DAP અને ૧૨૫ કિગ્રા મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ પ્રતિ હેક્ટર (જમીન ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જેટલું ઘટટું હોય તેટલું જ નાખવું)
	બિયારણનો દર:		<ul style="list-style-type: none"> પિયત વાળા વિસ્તારમાં બે ચાસ વચ્ચે ૧૨૦ સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૪૫ સે.મી., અને બિનપિયત વિસ્તારમાંથી અંતર ૬૦, ૩૦ સેમી રાખવું
	બીજ માવજત:		<ul style="list-style-type: none"> ૩.૫ થી ૪.૦ કિ.ગ્રા./હે, જમીનમાના બેજને ધ્યાનમાં રાખી ૪-૬ સે.મી.ની ઉડાઈએ વાવણી કરવી દેશી જાતો ઓરીને વાવેતર કરવી બિયારણનો દર ૧૫ થી ૨૦ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર રાખવો.
	જાત પસંદગી		<ul style="list-style-type: none"> દેશી : ગુજરાત કપાસ દેશી, સંકર-૭, ૬, ૧૧, ગુજરાત કપાસ-૧૩, ૧૭, ૨૧, ૨૩, ૨૫ સંકર જાતો: ગુજરાત, સંકર કપાસ-૪, ૬, ૮, ૧૦, ૧૨ બીટી : ગુજરાત કપાસ સંકર ૬, ૮, ૧૨ અને જુટીએચએચ-૪૮ (બીજુ-૨) તથા સરકાર માન્ય જુટી જુટી બીટી જાતો
	પરવાણી અને ખાલા પુરવા		<ul style="list-style-type: none"> બે કે વધુ છોડ હોય ત્યાં એક છોડ રાખી પારવણી કરવી, તથા જચાં બીજ ઉગેલ ન હોય ત્યાં ખાલા જલ્દી પુરવા.
	અંતર પાક		<ul style="list-style-type: none"> આંતર પાક તરીકે મચ અથવા અડદ નું વાવેતર કરવાની મુળખાઈ રોગ નું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. મુળખાઈ રોગ: છોડ એકાએક ચીમળાઈ જાય છે. ખેતરમાં ગોળાકાર સ્વરૂપે છોડ સુકાય જાય છે. છોડ સહેલાઈથી ખેંચી શકાય છે. 
મગફળી (ચોમાસુ)	વાવેતર	વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> મગફળીના વાવેતર માટે વરસાદ થયે સમયસસ્ના વાવેતર માટે ઉભડી, અધ્યવેલડી અથવા વેલડી એમ કોઈપણ પ્રકારની મગફળીની જાતનું વાવેતર કરવું.
	ખાતર		<ul style="list-style-type: none"> સેન્ટ્રીય ખેતી કરતા ખેડૂતોએ હેક્ટારે ૮ થી ૧૦ ટન કોહવાયેલુ ગળતીયું ખાતર અથવા ૫૦૦ કિગ્રા દિવેલોનો ખોળ જમીનમાં આપવો સાથે જૈવિક કન્સ્ટોર્ટીયા (NPK) ખાતર ૧૦ મિલી પ્રતિ કિલોગ્રામ બિયારણે પટ આપવો. રાસાયણિક ખાતર વાપરતા ખેડૂતોએ હેક્ટારે ૧૨.૫ કિગ્રા નાઇટ્રોજન, ૨૫ કિગ્રા ફોઝરસ અને ૫૦ કિગ્રા પોટાશ જમીન ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જરૂર મુજબ ચાસમાં આપવું. આ માટે એમોનીયમ સલ્ફેટ ફર્ન.૫ કિલોગ્રામ અને સીંગલ સુપર ફોઝેફટ ૧૫૬ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટાર ચાસમાં આપવું. જમીનમાં ગંધક, લોહ અને જીક ની ઉણપ જોવા મળે તો ૨૦ કિગ્રા સલ્ફર, ૧૦ કિલોગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટ અને ૨૦ કિલોગ્રામ જીક સલ્ફેટ પ્રતિ હેક્ટર પાયાના ખાતર તરીકે આપવું.
	બીજ માવજત		<ul style="list-style-type: none"> જમીનજન્ય ફૂગ અને સહેદ ઘેણના જૈવિક નિયંત્રણ માટે ટ્રાયકોડર્મા ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ કિગ્રા બીજ, અને મેટારીજીયમ એનીસોપ્લી હેક્ટારે ૮ કિલોગ્રામ જમીનમાં આપવું. જમીનજન્ય ફૂગ અને સહેદ ઘેણના રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે બીજને વાવતા પહેલા ૩ ગ્રામ ફૂગનાશક દવા (થાયરમ અથવા કાર્બન્ટેગીમ અથવા મેન્સોઝેબ) અને કવીનાલફોસ ૮૫ ઈસી

<p style="text-align: right;">અથવા કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી માની કોઇપણ એક દવા પરંદ કરી ૧૫ થી ૨૦ મિલી દવા પ્રતિ ૧ કીલોગ્રામ બીજને પટ આપી વાવતા પહેલા ૩-૪ કલાક છાંચામા સુકવી વાવેતર કરવું.</p>			
જાતો			<ul style="list-style-type: none"> વેલડી જાત (આગોતરી વાવણી): જીએચ્યુઝુ-૧૦, જીજુ-૧૧, જીજુ-૧૩, જીજેજુ-૧૭ (મોડી પાકતી જાતો). અર્ધ વેલડી (સમયસર વાવણી-૧૫ થી ૩૦ જુન) : જીજુ-૨૦ અને જીજેજુ-૨૨ ઉભડી (મોડી વાવણી): જીજુ-૨, જીજુ-૫, જીજુ-૭, જીજેજુ-૮ (પહેલી પાકતી જાતો)
ખાલા પુરવા			<ul style="list-style-type: none"> બીજનું સ્કૂરણ થયા બાદ જ્યાં ખાલા પડેલ હોય ત્યાં ૧૦ દિવસમાં દાણા ચોપીને વાવેતર કરેલ વિસ્તારમાં છોડની પૂરતી સંખ્યા જાળવવી.
આંતરખેડ અને નિંદામણા :			<ul style="list-style-type: none"> મગફળીના પાકને પ્રથમ દોઢ મહીના સુધી નિંદામણમુક્ત રાખો. એટલા માટે વાવણી પછી ૨૦ દિવસે પ્રથમ આંતરખેડ અને હાથ નિંદામણ કરવા. ત્યારબાદ ૨૦ દિવસ પછી બીજુ વાર આંતરખેડ અને હાથ નિંદામણ કરવા.
આંતર પાકો			<ul style="list-style-type: none"> મગફળી એકલો પાક લેવાથી મોટું નુકશાન થવા સંભવ રહે છે. એટલે મગફળી સાથે કપાસ, ઓરેંડા, તુવેર, તલ, સૂર્યમુખી જેવા પાકો આંતરપાક તરીકે લેવાથી ઉત્પાદન જોખમ ઘટાડી શકાય, સરવાળે બે પાકમાંથી ઘેડૂનને વધુ આવક મળી શકે છે. એટલે આંતર કે રીલે પાક પદ્ધતિ અપનાવવી.
બાજરો (ચોમાસુ)	વાવેતર થી બીજાંકુરણ	વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> વાવણી લાયક વરસાદ થાય કે તરત જ વાવેતર કરવું
		જાતો	<ul style="list-style-type: none"> જીએચ્યુઝી-૫૮ જીએચ્યુઝી-૫૩૮, જીએચ્યુઝી-૫૭૭, જીએચ્યુઝી-૭૧૬, જીએચ્યુઝી-૭૩૨ અને જીએચ્યુઝી-૭૪૪
તલ (ચોમાસુ)	વાવેતર થી બીજાંકુરણ	વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> જૂનના ગ્રીજા અઠવાડીયાથી જૂલાઈના અઠવાડીયા દરમ્યાન વાવણી લાયક વરસાદ થતા કરવું.
		જાતો	<ul style="list-style-type: none"> ગુજરાત તલ-૨, ગુજરાત તલ-૩, અને ગુજરાત તલ-૫
તુવેર	વાવેતર થી બીજાંકુરણ	વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> વાવણી લાયક વરસાદ થી લઈ જુલાઈ મહિનાના ગ્રીજા અઠવાડીયા સુધી વાવેતર કરી શકાય
		જાતો	<ul style="list-style-type: none"> વહેલી પાકતી: ગુજરાત તુવેર-૧, ગુજરાત તુવેર-૧૦૧ મોડી પાકતી: જીજેપી-૧, બીડીએન-૨, વૈશાલી
		બિયારણનો દર	<ul style="list-style-type: none"> વહેલી પાકતી: ૨૦-૨૫ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર મોડી પાકતી: ૧૫-૨૦ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર
મગ/અડદ	વાવેતર થી બીજાંકુરણ	વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> વાવણી લાયક વરસાદ હોય ત્યાં સમયસર વાવેતર પૂર્ણ કરવું
		જાતો	<ul style="list-style-type: none"> મગ: ગુજરાત મગ-૪, કે-૮૫૧, ગુજરાત આણદ મગ-૫ (પીળા પંચંગીયા સામે પ્રતિકારક) અડદ: ગુજરાત અડદ-૧, ૨
		બિયારણ નો દર	<ul style="list-style-type: none"> ૧૮ થી ૨૦ કી.ગ્રા./હેક્ટર
		બીજ માવજત	<ul style="list-style-type: none"> બીજને વાવતા પહેલા પ્રથમ થાયરમ / કેપાન / કાર્બોનાર્જીમ ૩ ગ્રામ /ક્રિ.ગ્રા., ત્યારબાદ કીટનાશક દવા ઈમીડાકલોપ્રેચ ૭૦ ડબલ્યુ.એસ. અથવા થાયોમીથોકામ ૭૦ ડબલ્યુ.એસ. ૫ ગ્રામ/ક્રિ.ગ્રા. પ્રમાણે પટ (મોલોમશી, તડતરીયા, શ્રીપસ અને સરેફેદમાખીના

નિયંત્રણ માટે) આપવો અને છેલ્યે બીજને રાઇઝોભીયમ અને પી.એસ.બી. કલ્યાનો પટ
૨૫૦ ગ્રામ / ૮ થી ૧૦ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે બનેનો પટ આપવો.

		ખાતર	<ul style="list-style-type: none"> હેકટરે ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ તત્વની જરૂરીયાત છે. જેના માટે ૭૭ કિ.ગ્રા. DAP અને ૮ કિ.ગ્રા. ચુરીયા જમીન ચકાસાણી અહેવાલ મુજબ આપવું. પાચાનું ખાતર ચાસમાં બીજના વાવેર વખતે અથવા પહેલા ઓરીને આપવું. સલ્ફરની ઉણાપ હોયતો હેકટરે ૨૦ કિ.ગ્રા. સલ્ફર આપવો. પૂર્તિખાતર તરીકે ચુરીયા કયારેય આ પાડોમાં આપવો નહિ.
		નીદણ નિયંત્રણ	<ul style="list-style-type: none"> એક માસ સુધી નિદામણ મુક્ત રાખવો. ખેતમજુરોની અછિત હોય તો પેન્ડીમીથીલીન નિદામણ નાશક દવા ૧.૦ કિ.ગ્રા. સકીય તત્ત્વ (૩.૩ લીટર / ૫૦૦ થી ૬૦૦ લીટર પાણીમાં બેળવીને) પ્રતિ હેકટર છાંટવી. આ દવા વાવેતર બાદ તુરતજ પરતું બીજ ઉગાવા પહેલાં જમીનમાં લેજ હોય ત્યારે અસરકારક થાય છે.
ઓળો	વાવેતર થી બીજાંકુરણ	વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> વાવણી લાયક વરસાદ હોય ત્યાં સમયસર વાવેતર પૂર્ણ કરવું
		જાતો	<ul style="list-style-type: none"> ગુજરાત ઓળા -૧,૨,૪ અને પૂસા ફાળુની
		વાવણી અંતર	<ul style="list-style-type: none"> ૬૦ X ૪૫ સે.મી. અથવા ૬૦ X ૩૦ સે.મી.
		ખાતર	<ul style="list-style-type: none"> ૧૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન, ૨૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ, ૨૫ કિ.ગ્રા. પોટાશ
મકાઈ	વાવેતર થી બીજાંકુરણ	વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> ૧૫ જૂન થી ૧૫ જુલાઈ સુધી વાવેતર કરી શકાય.
		જાતો	<ul style="list-style-type: none"> ધાસચારા માટે: ગંગા સફેદ-૨, ફાર્મ સમેરી, ગંગા-૫, વિજય, ગુજરાત મકાઈ-૧, ગુજરાત મકાઈ-૨, ગુજરાત મકાઈ-૩, ગુજરાત મકાઈ-૪ અને પાયોનિયર સંકર. બેબી કોર્ન અને સ્વીટ કોર્નની જાતો પણ લીલા ચારા તરીકે ઉપયોગી છે.
		બિયારણ નો દર	<ul style="list-style-type: none"> ઉત્પાદન માટે: વીનાઓરેન્ઝ સ્વીટકોર્ન, અંબર, બેબીકોર્ન
		વાવણી અંતર	<ul style="list-style-type: none"> ધાસચારા માટે: હેકટર દીઠ ૬૦ કિ.ગ્રા. દર રાખી બે હાર વચ્ચે ૧૫-૩૦ સે.મી.નું અંતર જાળવી વાવણી કરવી જોઈએ.
		બીજ માવજત	<ul style="list-style-type: none"> ઉત્પાદન માટે: ૨૦ થી ૨૫ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેકટર
		ખાતર	<ul style="list-style-type: none"> ધાસચારા માટે: બે હાર વચ્ચે ૧૫-૩૦ સે.મી. નું અંતર
		પાચવાણી	<ul style="list-style-type: none"> ઉત્પાદન માટે: ૬૦ સે.મી. X ૨૦ સે.મી. થી ૭૫ સે.મી. X ૨૦ સે.મી.
		નિદામણ	<ul style="list-style-type: none"> બીજને વાવતાં પહેલા એક કિલો બીજ દીઠ ૨ થી ૩ ગ્રામ કેપાન અથવા થાયરમનો પટ આપવો.
મરચી	વાવેતર થી બીજાંકુરણ	વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> ધરણ માટે બેડ તૈયાર કરવું
		જાતો	<ul style="list-style-type: none"> રેશમ પટા, ગુજરાત મરચી-૧૦૧, ૧૧૧, ૧૨૧, આણાદ મરચા-૧૩૧, ગુ.આણાદ મરચી-૧૧૨, ગુ.આણાદ સંકર મરચી-૧, વઢવાણી, ઘોલર, જવાલા.
		બિયારણ નો દર	<ul style="list-style-type: none"> ૬૦૦ થી ૭૫૦ ગ્રામ પ્રતિ હેકટર

સુર્યમુખી	વાવેતર થી બીજાંકુરણ	વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> વાવણી લાયક વરસાદ થયે જૂન-જુલાઈ માસમાં વાવેતર કરવું.
		જાતો	<ul style="list-style-type: none"> ગુજરાત સુર્યમુખી-૧, ઈસી-૬૪૭૪, મોર્ડન ફ્રાર્ડ તથા સંકર જાત MSH-૧૭
		વાવણી અંતર	<ul style="list-style-type: none"> ૬૦ X ૩૦ સે.મી.નું અંતર રાખવું. મોર્ડન ટીંગણી અને વહેલી પાકતી જાત હોય તેનું વાવેતર ૪૫ X ૨૦ સે.મી. અંતર રાખી કરવું.
		પાચવણી	<ul style="list-style-type: none"> ઉગ્યા બાદ ૧૨થી ૧૫ દિવસે કરવી.
		ખાતર	<ul style="list-style-type: none"> વાવણી પહેલા ૧૩૦ કિ.ગ્રા. ડી.એ.પી., ૧૦૮ કિ.ગ્રા. એમોનિયમ સંક્રટ પાયા ના ખાતર તરીકે અને યુરિયા ૮૮ કિ.ગ્રા. વાવણી પછી ૩૦ દિવસે પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવું.
જુવાર	વાવેતર થી બીજાંકુરણ	જાતો	<ul style="list-style-type: none"> એક કાપણી માટે: એસ.-૧૦૪૮ (સુંદીયા જુવાર), સી.-૧૦-૨ (છાસટીયો), જી.એક.એસ.-૩, જી.એક.એસ.-૪. બહુ કાપણી માટે: એસ.એસ.જી.-૫૮-૩, એસ.એસ.જી.-૮૮૮, એસ.એસ.જી.-૫૫૫, જી.એક.એસ.એચ.-૧, જી.એક.એસ.એચ.-૩, જી.એક.એસ.એચ.-૪, જી.એક.એસ.એચ.-૫.
		વાવેતર અંતર અને બિચારણનો દર	<ul style="list-style-type: none"> સુધારેલી જાતો માટે હેક્ટટે ૬૦ કિ.ગ્રા. અને સંકર જાતો માટે ૩૦ કિ.ગ્રા. દર રાખી બે હાર વચ્ચે ૧૫-૩૦ સે.મી.નું અંતર રાખી વાવણી કરવી.
		બીજ માવજત	<ul style="list-style-type: none"> જો વરસાદની શરૂઆત સાથે જ વાવણી શક્ય ન હોય તો સાંચાની માળીના નિયંત્રણ માટે બીજને કાર્બોસલ્ફાન ૧૫ કિ.ગ્રા. ૧૦૦ ગ્રામ /કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણી માવજત આપવી. આ ઉપરાંત પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ થાયરમ/કેપ્ટાનનો પટ આપવો. એઝેટોબેક્ટર અથવા એઝોસ્પારીલમ કલ્યાનો પટ પણ આપી શકાય.
		ખાતર	<ul style="list-style-type: none"> હેક્ટર દીઠ ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન વાવણી વખતે તેમજ ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન વાવણી બાદ ૩૦-૪૦ દિવસે આપવું. સંકર જાતો માટે હેક્ટર દીઠ ૪૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ વાવણી વખતે તેમજ ૪૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન વાવણી બાદ ૩૦-૪૦ દિવસે આપવો. બહુ કાપણી માટે ૧૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ વાવણી વખતે તેમજ ૧૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન વાવણી બાદ ૩૦ દિવસે અને ૧૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પ્રથમ કાપણી બાદ આપવો. જે જમીનમાં જસતનું પ્રમાણ ઓછું (૦.૫ પીપીએમ કરતાં ઓછું) હોય ત્યાં દર ત્રણ વર્ષે હેક્ટટે ૧૫ કિ.ગ્રા. જીક સંક્રટ આપવો.
		નીદણ નિયંત્રણ:	<ul style="list-style-type: none"> એક આંતરએક અને વાવણી બાદ ૩૦-૫૫ દિવસે હાથ નિયંત્રણ કરવા. રાસાયણિક નીદણ નિયંત્રણ માટે વાવણી બાદ બીજા દિવસે બેજવાળી જમીનમાં એટ્રાઇન અથવા પ્રોપેઝીન ૦.૨૫-૦.૫૦ કિ.ગ્રા. સડિય તત્વ પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાલ કરવો.
શેરડી	પાક સંરક્ષણ		<ul style="list-style-type: none"> શેરડી નો વધુ ઉતારો લેવા તેમજ ખાડી ની ટકાવારી લેવા રોપણી બાદ ૬, ૭ અને ૮ મહિને એમ ત્રણ વખત ૨૫% પણો (શેરડીના સાંઠા ઉપસના ફુલ પણો ના નોંધે થી ચોથા ભાગના ચુકાવેલા પણો) કાઢી ઘેતરમાં જ આવરણ તરીકે ઉપયોગ કરવો. શેરડીના પાન કાઢી નાખવાથી ભીગડાવાળી જીવાત, ચીકટો વગેરે જીવાતોનું તેના ફુદરતી દુષ્મનો દ્વારા અસરકારક નિયંત્રણ થઈ શકે છે.

દાડમ	કુળ/કૂલ અવસ્થા	પાક સંરક્ષણા	<ul style="list-style-type: none"> દાડમની ખેતીમાં ગાઠયા ફુમિનું નિયત્રણ માટે દાડમની ખેતી કરતા પેડૂતોને ગાંધ્યા ફુમિના અસરકારક અને અર્થક્ષમ નિયત્રણ માટે પેસીલીયોમાયસીસ લીલાસીનસ (૨ ૧૦ બીજાણું/ગ્રામ) ૨૦ કિ.ગ્રા.હે+ ટિવેલી ખોળ ૨ ટન/હે. ચોમાસાની શરૂઆતમા અને ત્યારબાદ દર ક માસના આંતરે થડથી ૧૨ થી ૧૮ હજુ દૂર તથા આશરે ૬ હજુ ઊરી રીંગ કરીને જમીનમાં મૂળની નજીક આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
કેળા	વાવેતર	જાત પસંદગી	<ul style="list-style-type: none"> કેળાની ખેતી કરતા પેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર વધારેમાં વધારે ઉત્પાદન તેમજ આવક મેળવવા માટે “કેળાની ગણાએવી સિલેક્શન” જાત વાવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
ટ્રેટા	ધરન ઉછેર	જાતો	<ul style="list-style-type: none"> પુસા રૂબી, ગુ. ટ્રેટા-૧ અને ૨, જૂનાગઢ ટ્રેટા-૩, જૂનાગઢ રૂબી, અરકા, આણંદ ટ્રેટા-૩, પુસા હાયબ્રિડ - ૨ અને ૪,
		વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> જુન થી જુલાઈ માં ધરન માટે બેડ તૈયાર કરવો.
રીંગણા	ધરન ઉછેર	જાતો	<ul style="list-style-type: none"> પીએલઆર-૧, જૂનાગઢ લીલા ગોળ, રીંગણા-૧, જીજબી-૨ & ૩, ગુ.લાંબા રીંગણા-૧, ગુ.લંબગોળ રીંગણા-૧, ગુ.આણંદ લંબગોળ, રીંગણા-૨ & ૩, પુસા સાદાબહાર, કે.એસ.-૩૩૧, જી.બી.એચ.-૧, ૨, પુસા હાઈબ્રિડ -૫, ૬
		વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> જુન થી જુલાઈ માં ધરન માટે બેડ તૈયાર કરવો.
વરીયાળી	ધરન ઉછેર	જાતો	<ul style="list-style-type: none"> પી.એક.-૩૫, ગુજરાત વસ્થિયાળી-૧, ૨ અને ૧૨.
		ધરુવાડિયું	<ul style="list-style-type: none"> જુન થી જુલાઈ માં ધરન માટે બેડ તૈયાર કરવો, એક હેક્ટર વિસ્તાર માટે ૧ ગંઠા વિસ્તારમાં ૧.૫ કિ.ગ્રા. બીજાના ઉપયોગ કરી ધરુવાડિયું જૂન માસમાં બનાવવું, ધરુવાડિયા માટે પ્રતિ હેક્ટરે ૫ ટન છાણિયું ખાતર પાયાના ખાતર તરીકે જમીન તૈયાર કરતી વખતે આપવું, વાવણી પહેલાં બીજાને એજેટોબેક્ટર અને ફોસ્ફેટ કલ્યાની માવજત આપવી. ધરુવાડિયાના ગાઢી કયારા ૧ મીટર × ૩ મીટર માપના બનાવવા. રૂ થી ૩૦ સે.મી. ઊંચાઈનું ૪૦ થી ૪૫ દિવસનું પાટલી પડેલ ધરુવેપોપણી માટે ઉત્તમ.
સોયાબીન	વાવેતર થી બીજાનુકરણ	જાતો	<ul style="list-style-type: none"> સૌરાષ્ટ્ર માટે: ગુજરાત સોયાબીન-૧, જીજએસ-૩.
		વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> જુન-જુલાઈ
દુધી	ધરન ઉછેર	જાતો	<ul style="list-style-type: none"> જૂનાગઢ લોંગ ટેન્ડર, પુસા નવીન, પુસા સમર પ્રોલીફ્રીક લોંગ, અર્કા, બહાર, પુસા મેધદૂત, પંજાબલોંગ, પંજાબ ગોળ, આણંદ દુધી-૧, પુસા સંકર-૩
		વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> જુન-જુલાઈ
પશુપાલન			<ul style="list-style-type: none"> ચોમાસા પહેલાં કરમીયાની દવા પશુઓને પીવડાવી ટેવી જોઈએ જેથી પશુઓને રોગો સામે રક્ષણ મળે કારણ કે ચોમાસામાં કરમિયાનું પ્રમાણ વધે છે. દૂધાળ ગાયોમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી દૂધ દોહન બાદ આંચળને એન્ટિસેરિક દ્રાવણમાં ડૂબાડવા જોઈએ જેથી એને પૂરેપૂર રક્ષણ મળે. ચેપનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરી ફ્રાર્મની ચોખ્યાઈ જાળવી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. મે-જૂન મહિનામાં ગાળસુંડાની રરી અવશ્ય મુકાવવી જોઈએ જેથી ચોમાસા દરમિયાન પશુઓ ગાળસુંડા સામે બચી શકે.

અમરેલી જુલ્લો



કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અમરેલી દ્વારા બનાવવામાં આવેલા અમરેલી જુલ્લાના
હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ અંગેના તાલુકા મુજબના વોટ્સઅપ
ગુપ્તમાં જોડાવા માટે તમારા તાલુકા પર ક્લિક કરો.



જુલ્લા કૃષિ હવામાન એકમ (DAMU), ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (GKMS), કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી,
અમરેલી-૩૬૫૬૦૧, ફોન નં. ૦૨૭૬૮ ૨૨૭૧૨૨



District Agrometeorological Unit (DAMU)
Gramin Krishi Mausam Seva (GKMS)
Krishi Vigyan Kendra
Junagadh Agricultural University
Amreli-365601
Phone: 02792-227122



Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department

આનંદી
કા
અમૃત મહોત્સવ
#AmritMahotsav



Join our Telegram channel and block wise WhatsApp groups



Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 050(2023)

Date:27-06-2023

Significant weather of past week, Amreli

#	Parameter	21-06-2023	22-06-2023	23-06-2023	24-06-2023	25-06-2023	26-06-2023	27-06-2023
1	Rainfall (mm)	0	0	0	0	5	60	2
2	Max.Temp.(°C)	36.8	36.6	36.8	35.8	31.6	29	31.3
3	Min.Temp.(°C)	26.5	26.8	27.2	26.4	24.7	24.6	25.5
4	RH-I (%)	96	97	100	99	100	100	99
5	RH-II (%)	42	45	40	47	76	86	80
6	Wind Speed (kmph)	12.1	11.0	12.7	11.3	7.7	7.2	10.1
7	Wind Direction(deg.)	52	51	58	62	45	42	60
		ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE
8	Total CC (octa) out of 8	2	4	4	5	6	8	8

Weather Forecast from 28/06/2023 to 02/07/2023

#	Parameter	28/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	01/07/2023	02/07/2023
1	Rainfall (mm)	60	70	30	20	20
2	Max.Temp.(°C)	32	31	31	30	30
3	Min.Temp.(°C)	25	24	23	24	25
4	RH-I (%)	83	87	85	85	82
5	RH-II (%)	62	80	68	73	61
6	Wind Speed (kmph)	23	22	24	26	27
7	Wind Direction(deg.)	248	248	248	248	248
		WSW	WSW	WSW	WSW	WSW
8	Total CC (octa) out of 8	8	8	8	7	5

Note: Above forecast is the average situation of whole district


Agro-Advisory

**Weather
Summery**

- The weather in Amreli District is likely to be cool, humid, and mostly cloudy in next 5 days. Isolated moderate to heavy and fairly widespread light to moderate rainfall likely

on next five days over the district. The maximum temperature is likely to be **30-32 °C**. The minimum temperature is likely to be **23-25° C** in next five days.

- Wind direction likely from WSW **wind gust speed likley 23 to 27 km/h.**
- **Extended Range Forecast:** The weather of Saurashtra and Kutch is likely to be moderately humid and partly cloudy from 03 to 07 July. The isolated light to moderate rainfall likely over the region in this week.
- The Southwest Monsoon has further advanced into most parts of north Arabian Sea, remaining parts of Gujarat and some more parts of Rajasthan today, the 27th June.
- The Northern Limit of Monsoon (NLM) now passes through Lat. 26.0°N/ Long. 55°E, Lat. 26.0°N/ Long. 65°E, Lat. 25.0°N/ Long. 70°E, Jodhpur, Sikar, Narnaul, Firozpur and Lat. 32.5°N/ Long. 72.5°E.
- Conditions are favourable for further advance of Southwest Monsoon into some more parts of Rajasthan and remaining parts of Haryana and Punjab during next 2 days.



General Advisory

→Do preparation for the remaining Kharif crops.

→Don't mix seed with chemical fertilizer, It causes damage to seeds. Apply fertilizers below or around the seed up to 5 cm depth. Nitrogenous fertilizers should be applied in two or three split doses to the crop i.e. first one is at sowing time and remaining one or two doses should be applied after sowing as per recommendations

→In case of excessive rainfall, farmers should try to store 'farm water in the farm.'

→Efforts should be made to store excess water and recharge the groundwater so that the precious water can be used in the future.

→If there is a system where water can be drained from the field, then by taking immediate drainage measures to rescue the standing crop.

→Plantation and grow windbreaks trees on border to prevent loss by the high winds.

→Keep maintain the sequence in seed treatment like first treat the seed with Fungicide, Insecticide and then after seed treatment with biofertilizer

→Seed Treatment: Seed Material => Fungicide => Insecticide => Biofertilizer.

→Deworming tablet should be given to the animals before monsoon to protect the animals against worms which are increases in monsoon.

**SMS
Advisory:**

Use Trichoderma spp. @ 2.5 kg/ha for control of soil bourne diseases, Cotton wilt, and stem rot and collar rot in groundnut.

Crops	Crop Stage	Practices	Advisory
Water Management	Farm Pond		<ul style="list-style-type: none">When the monsoon breaks during monsoon season, there is need irrigation to Kharif crops. In these circumstances, store or harvest the rainwater and apply it as irrigation to crops in their critical stages. It is necessary to keep inlet and outlet structure in Farm Pond. Construct farm pond at low lying area at water arrive from all the part of the farm. The advantage of plastic film at the bottom of farm-pond are 1) preventing seepage and infiltration up to 95%. *) Store water for a long time. *) Store the water in soil having less water holding capacity. *) In alkali soils, Preventing mixing of salts in harvested water. *) use this water direct as at critical irrigation, drinking water and fisheries purpose.
Cotton	Mitigation		<ul style="list-style-type: none">Plough the land and level it. Reduce the slope.Apply compost in the furrow in this month.
	Pink bollworm		<ul style="list-style-type: none">Timely picking of the cotton and after that graze sheep, goats and cattle in cotton field.Make organic fertilizer of stalk of the cottonRemove and destroy the undesired plants of cotton in and around the field.
	Sowing	Sowing	<ul style="list-style-type: none">If there is adequate rainfall, Crop can be sowing till the second week of July.
		Fertilizer	<ul style="list-style-type: none">Apply FYM @ 10 ton/haChemical Fertilizer can be applied after soil testing, DAP @ 55 kg and Murate of potash @ 125 kg per hectare at the time of sowing.
		Spacing	<ul style="list-style-type: none">120 X 45 cm in Irrigated and 90 X 30 in non-irrigate area.
		Seed Rate	<ul style="list-style-type: none">3.5 to 4.0 kg/ha in Bt cotton at 4 to 6 cm depth when adequate moisture in soil. And sowing by seed drill for arboreum cotton @ 15-20 kg/ha seed
		Seed treatment	<ul style="list-style-type: none">Apply seed treatment to hybrid cotton by captain and thiram @ 2-3 g and Imidacloprid @ 7.5 g per Kg od seed
		Varieties	<ul style="list-style-type: none">Arboretum: Gujarat Cotton Desi, Hybrid-7, 9, 11, Gujarat Cotton- 13,17, 23, 25Hybrid: Gujarat Cotton Hybrid-4, 6, 8, 10, 12BT: Gujarat Cotton Hybrid-6, 8, 12, GTHH-49 (BG-II), and other government approved seed.

	Thinning and gap filling	<ul style="list-style-type: none"> Where two or more plants remove extra plants, and fill the gaps in the field.
	Intercrop	<ul style="list-style-type: none"> Sowing of Mothbean or Blackgram as a intercrop to prevent Rhizoctonia disease.
Groundnut	Sowing	<p>Sowing</p> <ul style="list-style-type: none"> Sowing of Bunchy, Semi-spreading or spreading variety of groundnut according to onset of monsoon.
	Fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> Organically cultivated groundnut apply 8 to 10 tons of FYM or 500 kg of castor cake in the soil per hectare, apply 10 ml per kg of seed for biological consortia (NPK). Farmers using chemical fertilizers should apply 12.5 kg nitrogen, 25 kg phosphorus and 50 kg potash per hectare in the furrow as per the soil report. For this, apply 62 kg of ammonium sulphate and 156 kg of single super phosphate per hectare. In order to check the deficiency of sulphur in the soil, 20 kg of sulphur per hectare, 10 kg of ferrous sulphate per hectare for iron and 20 kg of zinc sulphate per hectare for zinc should be given while preparing the soil as Basel dose of fertilizer.
	Seed treatment	<ul style="list-style-type: none"> For control of soil borne fungi, apply Trichoderma @10 gm/kg of seed, and for control of white grub, metarhizium anisopliae @ 8 kg / ha. OR apply fungicide like Thirum or Carbendazim or Mancozeb @ of 3 gm per 1 kg of seed. For white grub, choose either Quinalphos 25 EC or Chlorpyrifos 20 EC and @ 15 to 20 ml of per 1 kg seed.
	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> spreading (Pre-sowing): GAUG-10, GG-11, GG-13, GJG-17 (Late maturing) Semi-spreading (Timely Sowing: 15 to 30 June): GG-20 and GJG-22 Bunchy (Late sowing): GG-2, GG-5, GG-7, GJG-9 (Early maturing)
	Gap filling	<ul style="list-style-type: none"> Maintain plant population by gap filling through dibbling in the field in 10 days after sowing.
	Interculturing and weed management	<ul style="list-style-type: none"> Keep crop weed free for 45 days of sowing. One interculturing and hand weeding at 20 days after sowing, and repeat this practice after 20 days (i.e. 40 days after sowing).
	Inter cropping	<ul style="list-style-type: none"> Sowing of cotton, pigeon pea, castor, sesame, and sunflower as an intercrop with groundnut to reduce crop loss due to uneven weather and erratic rainfall.

Pearl Millet	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> If sufficient rainfall received sowing of Pearl millet.
	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> GHB-558, GHB-538, GHB-577, GHB-719, GHB-732 and GHB-744
Sesame	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> Sowing of crop from third week of June to first week of July.
	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> GT-2, 3 and 5
Pigeon Pea	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> If sufficient rainfall received sowing in June to July.
	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> Early maturing: Guj. Pigeon pea-1, Gujarat pigeon pea-101 Late maturing: GJP-1, BDN-2, Vaishali
Green Gram / Black Gram	Seed rate	<ul style="list-style-type: none"> Early maturing: 20-25 kg/ha Late maturing: 15-20 kg/ha
	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> If sufficient rainfall received sowing in June to July.
	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> Green gram: GM-4, K-851, GAM-5(yellow vein mosaic virus resistant) Black gram: Gujarat Urd-1 and 2 (GU1)
	Seed rate	<ul style="list-style-type: none"> 18 to 20 kg/ha
	Seed treatment	<ul style="list-style-type: none"> Treat the seed with thiram/ captan/ carbendazim @ 3 g/kg seed and then imidachloprid 70 WS / Thiometoxam 70 WS @ 5g/kg after this, treat the seed with rhizobium and PSB @ 25g/kg.
	Fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> Requirement of the crop is 20-40-0 NPK kg/ha in soil, for this could be apply 87 kg DAP and 9 kg urea as per soil testing report. Apply basal fertilizer dose at or before sowing in the furrow. If there is Sulfur deficiency, apply sulphur @ 20 kg/ ha.
	Weed management	<ul style="list-style-type: none"> Keep weeds free for one month. In case of shortage of farm lab spray pendimethlylene herbicide @ 10 kg. active ingredient (3.3 liters / 500 to 600 liters of water) per hectare. This herbicide is effective immediately after sowing but before the seed germination when there is moisture in the soil.
	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> Sowing can be done from 15th June to 15th July if sufficient moisture available in soil.
Maize	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> Fodder: Ganga Safed-2, Farm Sameri, Ganga-5, Vijay, Gujarat Maize-1, 2, 3, 4 and Pioneer. Grain purpose: Win orange sweetcorn, Ambar, Babycorn.
	Seed rate	<ul style="list-style-type: none"> Fodder: 60 kg/ha Grain: 20-25 kg/ha.

	Spacing	<ul style="list-style-type: none"> Fodder: 25 -30 cm between two rows. Grain: 60 X 20 cm to 75 X 20 cm
	Seed treatment	<ul style="list-style-type: none"> Captan or thiram @ 3 g/kg before sowing. After 24 hours treat the seed with azospirilum and phosphobacterial @ 5 ml/kg.
	Fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> Required Nutrients: 80-40-0 in NPK kg/ha, for this can be apply 87 kg DAP and 53 kg urea at the time of sowing, and 87 kg nitrogen 30 day after sowing as a split.
Cowpea	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> If sufficient rainfall received sowing in June to July.
	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> Gujarat cowpea-1,2,4, Pusa Falguni
	Spacing	<ul style="list-style-type: none"> 60 X 45 cm OR 60 X 30 cm
	Fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> 15 kg. Nitrogen, 5 kg. Phosphorus, 2 kg. Potash
Chilli	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> Prepare the bed for Seedling.
	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> Resham Pataa, Gujarat Chilli-101, 111, 121, Anand Chilli-131, G. Anand Chilli-112, G. Anand Sankar Chilli-1, Wadhwani, Gholar, Jawala.
	Seed rate	<ul style="list-style-type: none"> 600 to 750 g/ha
Sugarcane	Crop Protection	<ul style="list-style-type: none"> To control aphids and whiteflies in sugarcane, spray 5% solution made from Neem seed @ 500 g of 10 liters of water.
Sunflower	Sowing to germination	<ul style="list-style-type: none"> Sowing in June to July.
		<ul style="list-style-type: none"> Gujarat Sunflower-1, EC-68414, Modern Dwarf and hybrid MSFH-17.
	Spacing	<ul style="list-style-type: none"> 60 X 30 cm generally
	Thinning	<ul style="list-style-type: none"> And 45 X 20 cm for Early maturing variety like Modern Dwarf
	Fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> Thinning should be done in 15 to 18 days after sowing crop
Sorghum	Sowing to germination	<ul style="list-style-type: none"> Single Cut: S-1049 (Sundhiya Jowar), C-10-2 (Chhasatiyo), GFS-3, GFS-4.
		<ul style="list-style-type: none"> For multi-cut: SSG-59-3, SSG-998, SSG-898, SSG-555, GFSH-1, GFSH-3, GFSH-4, and GFSH-5.
		<ul style="list-style-type: none"> Seed rate for sowing is 60 kg/ha for improved varieties, and 30 kg/ha for hybrid varieties. Spacing should be 25 to 30 cm between two rows.

		Fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> If sowing is not possible with the onset of rains, seed treatment with carbosulfan 28 EC @ 100 g per kilogram seed for control of shoot fly
		Weed management	<ul style="list-style-type: none"> In addition Seed treatment Thiram / Captan @ 3 g/kg, and Azotobacter or Azospirillum culture can also be given.
Tomato	Bad preparation	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> Pusa Ruby, Gu. Tomato-1 and 2, Junagadh Tomato-3, Junagadh Ruby, Arka, Anand Tomato-3, Pusa Hybrid - 2 and 4,
		Sowing	<ul style="list-style-type: none"> Prepare bed for seedling in June to July.
Brinjal	Bad preparation	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> PLR-1, Junagadh Green Round, Brinjal-1, GJB-2 & , Gu. long Brinjal-1, G. Oblong Brinjal-1, G. Anand Oblong, Brinjal-2 & 3, Pusa sadabhar, KS-331, GBH-1, 2, Pusa Hybrid-P, 4.
		Sowing	<ul style="list-style-type: none"> Bed preparation for seedling in June to July
Fennel	Bad preparation	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> PF-35, Gujarat Fennel-1,2 and 12.
		Sowing	<ul style="list-style-type: none"> Bed preparation for seedling in June to July. Prepare the bed of 100 m² area by about 1.5 kg seed for the transplanting of 1 ha area in June month. Apply FYM @ 5 ton/ha during bed preparation. Also apply seed treatment of Azotobactor and phosphate culture before the sowing. Make raised bed of 1 X 3 m² height: 25-30 cm
Soybean	Sowing to germination	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> Gujarat Soyabean-1, JGS-3.
		Sowing	<ul style="list-style-type: none"> June-July
Bottle guard	Bad preparation	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> Junagadh Long Tender, Pusa Naveen, Pusa Summer Prolific Long, Arka, Bahar, Pusa Meghdoot, Punjablong, Punjab Gol, Anand Dudhi-1, Pusa Sankar-3
		Sowing	<ul style="list-style-type: none"> June-July
Pomegranate	Fruiting / flowering	Crop Protection	<ul style="list-style-type: none"> For effective and efficient control of nematodes, it is recommended to make a ring 12 to 18 inches away from the trunk and about 9 inches deep near the roots in the soil and apply <i>Paecilomyces lilacinus</i> 20 kg/ha at the beginning of monsoon and thereafter at intervals of every 6 months.
Banana	Sowing	Varieties	<ul style="list-style-type: none"> Farmers cultivating bananas are recommended to cultivate "Ganadevi Selection of Banana" variety to get maximum yield and income per hectare.

Livestock



- Deworming tablet should be given to the animals before monsoon to protect the animals against worms which are increases in monsoon.
- In milking cows, the udder should be dipped in antiseptic solution after milking as far as possible to give it complete protection.
- It is very important to maintain the cleanliness of the farm using pesticides.
- The gonorrhea vaccine must be given in May-June to protect the animals against HS (Hemorrhagic septicemia) during the monsoon.

**Subject Matter Specialist
Agrometeorology**

Click your block to join whatsapp group of DAMU

Amreli District	https://chat.whatsapp.com/LJHGr15dR3e7tcIALWDiw8
--------------------	---