



## જલ્લા કૃપિ હવામાન એકમ (DAMU)

ગ્રામીણ કૃપિ મૌસમ સેવા (GKMS)

કૃપિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર

જુ.કૃ.યુ., જામનગર- ૩૬૧૦૦૬

તા. ૨૨-૦૬-૨૦૨૨ થી તા. ૨૬-૦૬-૨૦૨૨



(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav)

જામનગર જલ્લા કૃપિ હવામાન બુલેટીન નં. ૪૭(૨૦૨૨) તારીખ: ૨૧-૦૬-૨૦૨૨

(જૂનાગઢ કૃપિ યુનીવર્સિટી અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

પાછલા અઠવાડીયાનું જામનગર નું હવામાન

હવામાન પરિબળો		
વરસાદ (મી.મી)	૦.૦૦	
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૩૪.૫-૩૬.૦	
લધુતમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૨૫.૦-૨૬.૫	
ભેજ(%)	સવાર	૭૧-૮૧
	બપોરબાદ	૩૨-૪૧
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૫.૧-૮.૭	

### હવામાન આગાહી

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતાબોહવાકીય વિભાગ - જામનગર જલ્લાની હવામાન આગાહી

તારીખ	દિવસ-૧ ૨૨-૦૬-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૨૩-૦૬-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૨૪-૦૬-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૨૫-૦૬-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૨૬-૦૬-૨૦૨૨
પેરામીટર					
વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૪
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૩૩	૩૪	૩૩	૩૩	૩૨
લધુતમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૨૮	૨૮	૨૮	૨૮	૨૮
મહત્તમ ભેજ (%) સવાર	૭૧	૭૬	૮૧	૮૦	૭૮
લધુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૫૩	૫૩	૪૫	૪૬	૪૮
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૩૧.૭	૨૧.૭	૨૪.૫	૨૭.૨	૨૫.૮
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	પક્ષિમ	પક્ષિમ	પક્ષિમ	પક્ષિમ	પક્ષિમ
વાદળની સ્થિતિ	મોટાભાગનું વાદળછાયું				

નોંધ: આ આગાહી સમગ્ર જલ્લાની સરેરાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જગ્યા માટે લાગુ કરવી નહીં.

ભારત સરકારશીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃપિ મૌસમ સેવા વિભાગ, કૃપિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતાબોહવાકીય વિસ્તારના.

જામનગર જલ્લામાં આગામી સપ્તાહ દરમયાન હવામાન મોટાભાગનું વાદળછાયું રહેશે તથા અમૃક વિસ્તારોમાં

હળવો વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૨-૩૪ ડિગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લધુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૮-૨૯ ડિગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. સવારના સમયે બેજનું પ્રમાણ ૭૧-૮૦ % રહેશે તથા બપોર પછીના બેજનું પ્રમાણ ૪૫-૭૨% રહેવાની શક્યતા છે. પવનની દિશા મોટેભાગે પક્ષિમ તરફથી રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૨૧.૭-૩૧.૭ રહેશે.

### સામાન્ય કૃષિ સલાહ


- ખેતરના સેઢા, પાળા અને વરસાદના પાણીની નીકાલની ગટરોને સાફ્ કરી ને આગામી ચોમાસા માટે ખેતરને તૈયાર કરવું.
- બિયારણને પટ ઓપવા માટે પહેલા ફૂગનાશક, કીટનાશક અને ત્યારબાદ જ જૈવીક ખાતરનો પટ આપવો. બીયારણ + ફૂગનાશક + કીટનાશક + જૌવવક ખાતર.
- પહેલા વરસાદ થે પુખ્ત મુંડા જમીનમાંથી બહાર આવીને ખેતરના અનુભૂતિના વૃક્ષો પર વસવાટ કરે છે તેથી તેના નાસ માટે કલોરપાયરીફોસ ૨૫ મિલી તથા પ્રોફેનોફોસ ૧૦ મિલી તથા મિથાઈલ પેરાથીઓન ૧૦ મિલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિક્સ કરી વૃક્ષો પર છંટકાવ કરવો જોઈએ.
- વરસાદની અનિયમિતતા નિવારવા માટે આંતરપાક વાવવાનું આયોજન કરવું જોઈએ, જેથી એક પાક નિષ્ફળ જય તો બીજા પાકમાંથી ઉપજ મેળવી સકાય છે.

### પાક પ્રમાણે કૃષિ સલાહ

મુખ્યપાક	કૃષિસલાહ
ચોમાસું મગફળી	<ul style="list-style-type: none"> <li>● સિંચાઈની પૂર્તી સગવડ હોય તો ખરીફ મગફળી પાકનાં આગોઠણ વાવેતર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવી.</li> <li>● <b>જાતો:</b> ઉભાડી: જીજી-૨, જીજી-૫, જીજેજી-૩૨ અર્ધ વેલ્ડી: જીજી-૨૦, જીજેજી-૨૨ વેલ્ડી: જીજી-૧૦, જીજી-૧૧, જીજી-૧૨, જીજેજી-૧૭, જીજેજી એચ પી એસ-૧</li> <li>● <b>ખાતર:</b> વાવેતર સમયે સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૧૫૬ કી.ગ્રા./હે. એમોનીયમ સલફેટ ૬૨ કી.ગ્રા./હે, અને એરંડીનો ખોળ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે. પાયામાં આપવો.</li> <li>● <b>સુક્રારો:</b> મગફળીમાં સુકારાના નિયંત્રણ માટે ૨.૫ કિગ્રા ટ્રોઇકોડરમાં પાવડર ૨૫૦-૩૦૦ કિગ્રા એરંડી અથવા લીમબોળીના ખોળ સાથે મિક્સ કરીને એક લેક્ટરમાં વાવવું જોઈએ.</li> </ul>
ચોમાસું કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ગુલાબી ઈયળનાં નિયંત્રણ માટે કપાસનું વહેલું વાવેતર ન કરતા સમયસર વાવણી થયા પછી વાવેતર કરવાથી અમુકંશે નિયંત્રણ કરી શકાય છે.</li> <li>● <b>જાતો:</b> દેશી: ગુજરાત કપાસ દેશી, સંકર-૭, ૯, ૧૧, ગુજરાત કપાસ-૧૩, ૧૭, ૨૧, ૨૩, ૨૫ સંકર જાતો: ગુજરાત સંકર કપાસ-૪, ૬, ૮, ૧૦, ૧૨ બીટી: ગુજરાત કપાસ સંકર ૬, ૮, ૧૨ અને જીટીઅયએચ-૪૮ (બીજી-૨) તથા સરકાર માન્યજુદી જુદી બીટી જાતોની પસંદગી કરવી.</li> <li>● <b>ખાતર:</b> બીટી કપાસમાં સારું ઉત્પાદન મેળવવા માટે પ્રતિ ૧૦ ટન સંપૂર્ણ કોહવાયેલું ગળતીયુ ખાતર જમીનમાં ઉમેશું, આ ઉપરાંત જમીન ચકાસણી અહેવાલ પછી ઘટતા પોપક ટ્ર્યો પ્રમાણે કુલ ૨૪૦ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન (૬૦-૬૦ કિલોગ્રામ ૪ ભાગમાં વાવણી સમયે, ૩૦, ૬૦ અને ૮૦ દિવસે આપવું), ફોસ્ફરસ ૫૦ કિલોગ્રામ (બે ભાગમાં વાવણી સમયે અને ૬૦ દિવસે ૨૫-૨૫ કિલો આપવું).</li> <li>● કપાસના કપાસના પાકમાં પાન મેળેસિયમ તત્વની ઉણપને કારણે લાલ થાય જય છે જેને નિવારવા માટે ૨૫ કિગ્રા મેળેસિયમ સલફેટ પ્રતિ લેક્ટરે આપવું.</li> <li>● <b>અનિયમિત વરસાદનું જોખમ ઓછું કરવા કપાસના પાકમાં તલ, મગફળી, સોયાબીન, કઠોળ જેવાં પાકોનું આંતર</b></li> </ul>

	<b>પાક તરીકી વાવેતરનું આયોજન કરવું.</b>
<b>દિવેલા</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• દિવેલાના પાકમાં હેક્ટર દીઠ ઉપ કિગ્રા નાઈટ્રોજન અને ૫૦ કિગ્રા ફોસ્ફરસ તત્વ આપવાની ભલામણ છે. તેથી ૩૭.૫ કિગ્રા નાઈટ્રોજન અને ૫૦ કિગ્રા ફોસ્ફરસ તત્વ વાવની સમયે જ પાયાના ખાતર તરીકી આપવું.</li> <li>• જો જમીનમાં સલ્ફર તત્વની ઉશુપ હોય તો હેક્ટરે ૨૦ કિગ્રા સલ્ફર (૧૨૫ કિગ્રા જાપ્સમના રૂપમાં) આપવાની ભલામણ છે</li> </ul>
<b>તલ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• વાવણી લાયક વરસાદ થયે વાવેતર કરવું.</li> <li>• <b>જાતો:</b> તલના પાકની વાવણીની માટે ગુજરાત તલ-૨, ૩, ૪, ૬ જેવી નવી જાતોની પસંદગી કરવી.</li> <li>• <b>ખાતર:</b> તલના પાકને વાવેતર સમયે ડી.એ.પી. ૫૪ કી.ગ્રા. અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૬૭ કી.ગ્રા./હે. પાયામાં આપવું.</li> </ul>
<b>બાજરો</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• વાવણી લાયક વરસાદ થયે વાવેતર કરવું.</li> <li>• <b>જાતો:</b> જીએચબી-૫૫૮ જીએચબી-૫૭૮, જીએચબી-૭૧૯, જીએચબી-૭૩૨ અને જીએચબી-૭૪૪.</li> <li>• <b>ખાતર:</b> બાજરીના પાકને વાવેતર સમયે ડી.એ.પી. ૮૭ કી.ગ્રા. અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૫૭ કી.ગ્રા./હે. પાયામાં આપવું.</li> </ul>
<b>તુવેર</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• વાવણી લાયક વરસાદ થયે વાવેતર કરવું.</li> <li>• <b>જાતો:</b> તુવેરના વાવેતર માટે વહેલી પાકતી જાતો જેવીકી ગુજરાત તુવેર-૧૦૦ અને ગુજરાત તુવેર ૧૦૧ અથવા મધ્યમ મોડી બી. ડી. એન.-૨ જાતની પસંદગી કરવી જોઈએ.</li> <li>• <b>ખાતર:</b> તુવેર ના પાકને વાવેતર સમયે ડી.એ.પી. ૮૭ કી.ગ્રા./હે. પાયામાં આપવું.</li> </ul>
<b>મગ/ અડદ/ ચોળી</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• વાવણી લાયક વરસાદ થાય ત્યારે સમયસર વાવેતર પૂર્ણ કરવું.</li> <li>• <b>જાતો:</b> મગનાં વાવેતર માટે ગુજરાત મગ-૪, કે-૮૫૧, ગુજરાત આણંદ મગ-૫ જેવી જતો પસંદ કરવી.</li> <li>• અડદનાં વાવેતર માટે ગુજરાત અડદ ૧, ૨ જેવી જતો પસંદ કરવી.</li> <li>• ચોળીનાં વાવેતર માટે ગુજરાત ચોળા- ૧, ૨, ૪ અને પૂસા ફાલગુની જેવી જતો પસંદ કરવી.</li> <li>• <b>ખાતર:</b> તુવેર ના પાકને વાવેતર સમયે ડી.એ.પી. ૮૭ કી.ગ્રા./હે. પાયામાં આપવું.</li> </ul>
<b>શાકભાજ પાકો</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>પાન કોરીયુ:</b> વેલાવાળા શાકભાજ પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ ટાળવા માટે ૧૫ મીલી મીથાઈલ-ઓ-ટેમેટોન (૨૫ ઈસી) અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીયોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૫ લીટર પાણીના પંપમાં નાખીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>• <b>શ્રીપ્સ:</b> મરચીના પાકમાં શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ૩૦ મીલી પ્રોફેનોફોસ ૧૫ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી છાંટવી. શ્રીપ્સનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાડ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા ૭-૮ મીલી. પ્રતિ પંપ છાંટવી.</li> <li>• <b>ફળમાખી:</b> ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે એસીટામીપ્રીડ ૨૦ ટકા ૧૫ ગ્રામ દવા ૧૫ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</li> <li>• <b>લીલી ઈયળ:</b> ટામેટાના પાકમાં લીલી ઈયળનો ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે છે તેના નિયંત્રણ માટે ઈન્ડોક્ઝાકાર્બી ૨૫ ઈસી ૩૦ મિલી અથવા સ્પીનોસાડ ૪૫ ઈસી ૫ મિલી પ્રતિ પંપ છાંટવી.</li> <li>• <b>પાનકથીરી:</b> શાકભાજ પાકોમાં પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો ફેનાજાકવિન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા ડાયફેન્યુરોન ૫૦ ડાલ્ટ્યુ ૫૧ ૧૫ ગ્રામ ૧૫ લીટર પાણીમાં પંપમાં નાખીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>• <b>સફેદ માખી અને લીલી પોપટી:</b> ભીડામાં સફેદ માખી અને લીલી પોપટીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મી.લી. અથવા લીંબોળીના મીજનું ૫ ટકા અંદર નું દ્રાવણ ૫૦૦ મી.લી. અને ડાયફેન્યુનથાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
<b>પશુ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• વરસાદી વતાવર સમયે પશુઓને બંધ શેડમાં રાખવા જોઈએ.</li> <li>• યોગ્ય માત્રામાં આવશ્યક ક્ષાર / ખનિજ મિશ્રણ ચારા સાથે ભેળવીને પ્રાણીઓને આપવું આવશ્યક છે.</li> <li>• પશુઓના રહેદાણની જગ્યાની વ્યવસ્થિત સફાઈ રાખવી અને માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફ્રિનાઈલ છાંટવું અથવા લીમડાનાં પાનનો ધૂમાડો કરવો.</li> </ul>

- પશુને દ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને પ્રતિ લીટર દુધની ઊપજ હોય તેમને નિયમિત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્ત્વોનું મિશ્રણ આપવું.
- દિતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેવટામેશ્રીન અથવા એમીટ્રાવ ર મી.લી. એક લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી.



ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે લાલ કલરની લાઈન ચોમાસું બેસવાની નોર્મલ (એવેનેજ) તારીખ સૂચવે છે, જ્યારે ભૂરા કલરની લાઈન આ વર્ષે ચોમાસું બેસવાની તારીખ (ચોમાસું ક્રાંતિકાનું પહોંચ્યું તે) સૂચવે છે.

# District Agrometeorological Unit (DAMU)

GraminKrushi Mausam Seva (GKMS)

Krishi Vigyan kendra

Junagadh Agricultural University

Jamnagar-361006

Date:22-06-2022 to 26-06-2022

(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav)



## Jamnagar District Agromet Advisory Service bulletin No. 47 (2022) Date: 21-06-2022

(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

### Significant weather for the preceding week

weather parameter		
Rain fall (mm)		0.00
Maximum temperature (°C)		34.5-36.0
Minimum temperature (°C)		25.0-26.5
Relative Humidity (%)	Morning	71-81
	Afternoon	32-41
Wind speed (Kmph)		5.1-9.7

### Weather forecasting for Jamnagar District

Date	Day-1 22-06-2022	Day-2 23-06-2022	Day-3 24-06-2022	Day-4 25-06-2022	Day-5 26-06-2022
Parameters					
Rain fall (mm)	0	0	0	0	4
Maximum temperature (°C)	33	34	33	33	32
Minimum temperature (°C)	29	29	29	29	28
Relative Humidity-I (%)	71	76	81	80	78
Relative Humidity-II (%)	53	53	45	46	49
Wind speed (Km/h)	31.7	21.7	24.5	27.2	25.8
Wind Direction (deg.)	W	W	W	W	W
Cloud cover (Okta)	Generally Cloudy				

Note: Above forecast is the average situation of whole district not for one particular place.

Gramin Krishi Mausam Seva, Krishi Vigyan Kendra, Jamnagar and Indian meteorological department announce upcoming five days weather forecast of

Jamnagar district have sky will be generally cloudy weather forecast in next five days.

**Rain fall:** In the next week light rainfall chances in some isolated places.

**Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range 32-34 °C and 28-29 °C, respectively.

**Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 71-80 % & 45-53 %, respectively.

**Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 21.7-31.7 km/h, respectively.

### **General Agricultural Advisory**

- Cleaning ridge, fencing and drainage system of the field and preparing the field for the next monsoon.
- Keep maintain the sequence in seed treatment like first treat the seed with Fungicide, Insecticide and then after seed treatment with biofertilizer. Seed Treatment: Seed Material + Fungicide + Insecticide + Biofertilizer.
- When first rainfall occur at time adult of white grub come out in the soil and they stay near the tree of farm boundary or other near tree, so spray the Clorpyriphose 25 mm or Profenophos 10 mm or Methyl parathion 10 mm in 10 lit. water and spray on tree.
- Planning the intercropping, if one crop is fail due to rainfall scarcity then get income for other crops.

### **Crop wise Advisory**

<b>crop</b>	<b>Advisory</b>
<b>Kharif Groundnut</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• If adequate irrigation facilities are available then carry out pre-sowing of Kharif groundnut and cotton crops.</li><li>• <b>Variety:</b> <b>Bunch type:</b> GG-2, GG-5, GJG-32 <b>Semi Spreading type:</b> GG-20, GJG-22, GG-10 <b>Spreading type:</b> GG-11, GG-12, GJG-17, GJG HPS-1</li><li>• <b>Fertilizer:</b> In pre-sowing of groundnut may be apply 156 kg/ha SSP, 62 kg/ha Ammonium sulphate and 500 kg/ha Castor cake as basal dose.</li><li>• <b>Wilt:</b> For the control of the wilt in groundnut, before sowing apply the 2.5 kg tricoderma with 200-300 kg neem cake or castor cake per hecter.</li></ul>
<b>Cotton</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Early sowing in cotton crop is not recommended due to pink bollworm attack at early stage.</li><li>• <b>Variety:</b> <b>Arboretum:</b> Gujarat Cotton Desi, Hybrid-7, 9, 11, Gujarat Cotton- 13,17, 23, 25 <b>Hybrid:</b> Gujarat Cotton Hybrid-4, 6, 8, 10, 12 <b>BT:</b> Gujarat Cotton Hybrid-6, 8, 12, GTHH-49 (BG-II), and other</li></ul>


	<p>government approved seed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fertilizer:</b> Apply FYM @ 10 t/ha, Nitrogen @ 240 kg/ha (four split, 25 % of at sowing and remaining three equal dose at 30, 60, and 90 DAS) and P2O5 @ 50 kg/ha (two split, <math>\frac{1}{2}</math> at basal and <math>\frac{1}{2}</math> at 60 DAS) per hectare to cotton crop for getting maximum yield and net return.</li> <li>• Due to deficiency of magnesium cotton leaf become red, so apply the 25 kg magnesium sulphate per hectors.</li> <li>• Adopt inter crop like sesame, groundnut, soybean, pulses and maize in cotton crop for risk management at scarcity of rainfall condition.</li> </ul>
<b>Castor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommendation dose of fertilizer is 75 kg nitrogen and 50 kg phosphorus per hectors, so apply the 37.5 kg nitrogen and 50 kg phosphorus per hectors as a basal dose before sowing.</li> <li>• If sulphur deficiency in soil then apply 20 kg sulphur (in the form of 125 kg gypsum) per hectors.</li> </ul>
<b>Sesame</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carry out sowing where sufficient rainfall received.</li> <li>• <b>Variety:</b> For the sowing of sesame crop select the new variety like Gujarat til-2, 3, 4, 6.</li> <li>• <b>Fertilizer:</b> Apply DAP @ 54 kg and Murate of potash @ 67 kg per hectare as basal.</li> </ul>
<b>pearl millet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carry out sowing where sufficient rain fall receive for sowing.</li> <li>• <b>Variety:</b> GHB-558, GHB-538, GHB-577, GHB-719, GHB-732 and GHB-744.</li> <li>• <b>Fertilizer:</b> Apply DAP @ 87 kg and Urea @ 53 kg per hectare as basal.</li> </ul>
<b>Red gram</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carry out sowing where sufficient rain fall receive for sowing.</li> <li>• <b>Variety:</b> Select the early mature variety like Gujarat tuver-100 and Gujarat tuver-101 and medium late variety BDN-2.</li> <li>• <b>Fertilizer:</b> Apply DAP @ 87 kg per hectare as basal.</li> </ul>
<b>Green gram/ Black gram/ Cowpea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carry out sowing where sufficient rain fall receive for sowing.</li> <li>• <b>Variety:</b> For Green gram sowing select the varieties like GM-4, K-851, GAM-5. For Black gram sowing select the varieties like Gujarat Adud-1, 2. For Cowpea sowing select the varieties like Gujarat cowpea1,2,4, Pusa Falguni.</li> <li>• <b>Fertilizer:</b> Apply DAP @ 87 kg per hectare as basal.</li> </ul>
<b>Vegetables</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>leaf Webber:</b> For the control of leaf Webber in fruit leafy vegetable spray 15 ml methyl-O-demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC)</li> </ul>

in 15 liter of water.

- **Thrips in chilli:** For the control of thrips in chilli, spray 30 ml profenophos in 15 litres of water. In case of heavy attack make spray of spinosad or spinetoram 7-8 ml per 15 liter of water.
- **Fruit fly:** For the control of Fruit fly spray acetamiprid 20 % 15 gm per 15 liter water pump.
- **Fruit borer:** In brinjal and tomato crops control of fruit borer, spray reenaxipayar @ 5 ml in 15 lit of water. In tomato crops control of fruit borer, spray indoxacarb 25 EC 30 ml or spinosad 45 EC 5 ml per pump mix in water and spray.
- **Mite:** If mite infestation observe in vegetable then spray fenazaquin 10 EC 10 ml or diafenuron 50 WP 15 gm per 15 liter water pump and carried out alternate spray.
- **Whitefly & jassids in Okra:** For control of whitefly & jassids in Okra, spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml neem oil or acephate 75 % SP@ 15 gm or imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water.

#### Animals

- Keep animals indoor during the raining period.
- Essential salts/mineral mixture in appropriate quantities must be mixed with feed and given to the animals.
- Spray phenyl in the animal shed to avoid flys and mosquitoes. Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.
- Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield.
- Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick.



In above diagram Red line for normal onset date of monsoon and Blue line for actual condition of monsoon.