



જલ્લા કૃપિ હવામાન એકમ (DAMU)

ગ્રામીણ કૃપિ મૌસમ સેવા (GKMS)

કૃપિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર

જુ.કૃ.યુ., જામનગર- ૩૬૧૦૦૬

તા. ૨૬-૦૧-૨૦૨૨ થી તા. ૩૦-૦૧-૨૦૨૨



(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav)

જામનગર જલ્લા કૃપિ હવામાન બુલેટીન નં. ૦૭(૨૦૨૧) તારીખ: ૨૫-૦૧-૨૦૨૨

(જૂનાગઢ કૃપિ યુનીવર્સિટી અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

પાછલા અઠવાડીયાનું જામનગર નું હવામાન

હવામાન પરિબળો		
વરસાદ (મી.મી)	૦.૦	
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૨૩.૦-૨૮.૫	
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૧૨.૦-૧૪.૫	
ભેજ(%)	સવાર	૬૭-૮૭
	બપોરબાદ	૨૬-૫૬
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨.૮-૭.૮	

હવામાન આગાહી

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતાબોહવાકીય વિભાગ - જામનગર જલ્લાની હવામાન આગાહી

તારીખ	દિવસ-૧ ૨૬-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૨૭-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૨૮-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૨૯-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૩૦-૦૧-૨૦૨૨
પેરામીટર					
વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૨૫	૨૭	૨૭	૨૮	૨૮
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૧૨	૧૩	૧૩	૧૩	૧૪
મહત્તમ ભેજ (%) સવાર	૪૨	૩૮	૩૮	૩૮	૪૦
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૨૨	૨૦	૧૯	૧૯	૧૯
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૭.૭	૨૧.૧	૧૯.૮	૧૬.૬	૧૧.૨
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	ઈશાન	ઈશાન	ઈશાન	પૂર્વ	પૂર્વ
વાદળની રિથ્નિ	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું

નોંધ: આ આગાહી સમગ્ર જલ્લાની સરેરાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જગ્યા માટે લાગુ કરવી નહીં.


ભારત સરકારશીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃપિ મૌસમ સેવા વિભાગ, કૃપિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના.

જામનગર જલ્લામાં આગામી સપ્તાહ દરમયાન હવામાન ચોખ્ખું રહેશે તથા વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ નહીં વત્ત રહેશે. આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમયાન ૨૮-૨૮ ડિગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમયાન ૧૨-

૧૪ ડિગ્રી સેલ્ફિયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. સવારના સમયે બેજનું પ્રમાણ ૩૮-૪૨ % રહેશે તથા બપોરપદ્ધીના બેજનું પ્રમાણ ૧૮-૨૨ % રહેવાની શક્યતા છે. પવનની દિશા મોટેભાગે ઈશાન-પૂર્વ તરફથી રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૧.૨-૨૧.૧ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 03 (15.01.2022 to 21.01.2022) over Agricultural region

Gujarat



Agricultural vigour is good over few pockets of the state.

સામાન્ય કૃષિ સલાહ


- હવામાન વિભાગના જાણાવ્યા અનુસાર આગામી ૨ દિવસ ઠંડીનું જોર વધુ રહેશે. જરૂરિયાત વગર બહાર જવાનું ટાળો અને ગરમ કપડા પહેરવા જોયો.
- શિયાળું પાકોને ઠંડીથી બચાવવા માટે સાંજના સમયે હળવું પિયત આપવું.
- ઉનાળું પાકોના વાવેતર માટે જમીનની તૈયારી કરવી જોઈએ. વાવેતર માટે યોગ્ય ગુણવત્તા વાળા બીજ મેળવી લેવા. જમીનની જરૂરિયાત મુજબ પાયાના ખાતર તરફ યોગ્ય ખાતરનો ઉપયોગ કરવો.
- જો શિયાળું પાકમાં રોગ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધવાની શક્યતા હોય પાકનું સતત નિરિક્ષણ કરતા રહેવું આર્થિક ક્ષમ્યમાત્રા કરતા વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળો તો ભલામણ મુજબ નિયંત્રણના પગલા લેવા.
- રવિ પાકને રોગથી બચાવવા હેક્ઝોકોનાઓબે ૨૫ મીલી / કાર્બન્ડેઝીમ ૨૦ ગ્રામ / ટેબુકોનાઓલ ૩૦ મીલી / મેન્કોઝેબ ૫૦ ગ્રામ પેકી કોઈ પણ એક દવાનો છંટકાવ વાતાવરણ ચોંઘણું હોય ત્યારે કરવો.
- પાકમાં જરૂરિયાત કરતા વધારે પિયત આપવાથી રોગ અને જીવાતનો ઉપદ્રવ વધે છે, જેથી જરૂરીયાત મુજબ જ પિયત આપવું.

પાક પ્રમાણે કૃષિ સલાહ

મુખ્યપાક	કૃષિસલાહ
ઉનાળું મગફળી	<ul style="list-style-type: none"> • વાવેતર સમય: વાવેતર જાન્યુઆરી માસના અંતમાં ઠંડીનું પ્રમાણ ઓછું થયે કરવું. • બિયારણની જાત: ઉનાળું મગફળીના વાવેતર કરવા માટે ઊભડી અને વહેલી પાકતી જી.જી.-૨, જી.જી.-૫, જી.જી.-૬, ટીએજી-૨૪, ટી.જી.-૨૬, અને ટીજી-૩૭એ માંથી કોઈપણ એક જાતની પસુંદગી કરવી. • વાવણી અંતર: બે હાર વચ્ચે ૭.૫-૧૦ સેમી અને બે છોડ વચ્ચે ૪-૫ સેમીનું અંતર જાળવવું. • બિયારણ દર: ૧૨૦ ડિગ્રી/ લેક્ટરે

	<ul style="list-style-type: none"> રાસાયણિક ખાતર: એક લેક્ટરે ૨૫ કિગ્રા નાઈટ્રોજન, ૫૦ કીગ્રા ફ્રોસ્ફ્રેસ અને ૫૦ કિગ્રા પોટાશ ખાતર ચાસમાં ઓરીને આપવું. પિયત: પ્રથમ પિયત વાવેતર પછી તરત જ અને ત્યાર પછીનું પિયત ૬-૭ દિવસે સારા ઉગાવા માટે આપવું. તે પછી જમીનની પરત મુજબ પિયત આપવા.
ઉનાળું મગ	<ul style="list-style-type: none"> વાવેતર સમય: વાવેતર ૧૫ ફેબ્રુઆરી થી ૧૫ માર્ચ સુધીના સમયગાળા દરમાન કરવું. બિયારણની જાત: વાવેતર માટે ગુજરાત મગ-૨,૩,૪, કે-૮૫૧, સી.ઓ.-૪ અને મેહા જેવી જાતો પસંદ કરવી. વાવણી અંતર: બે હાર વચ્ચે ૩૦ સેમી અને બે છોડ વચ્ચે ૧૦ સેમી. બિયારણ દર: ૨૦-૨૫ કિગ્રા/લેક્ટર રાસાયણિક ખાતર: એક લેક્ટરે ૨૦ કિગ્રા નાઈટ્રોજન, ૪૦ કીગ્રા ફ્રોસ્ફ્રેસ ચાસમાં ઓરીને આપવું. પિયત: પ્રથમ પિયત વાવેતર પછી તરત જ અને ત્યાર પછીનું પિયત ૪-૫ દિવસે સારા ઉગાવા માટે આપવું. તે પછી જમીનની પરત મુજબ પિયત આપવા. નિંદણ નિયંત્રણ: પાક અવસ્થાએ બે આંતર ખેડ અને પછીનાં દિવસોમાં જરૂરિયાત મુજબ હાથ નિંદણ નિયંત્રણ કરવું.
ઉનાળું તલ	<ul style="list-style-type: none"> વાવેતર સમય: ઉનાળું તલનું વાવેતર ફેબ્રુઆરી માસના પ્રથમ પખવાડીયામાં કરવું. બિયારણની જાત: વાવેતર માટે સફેદ તલની જાતો જેવિકી ગુજરાત તલ- ૧,૨,૩,૪ અને કાળા તલની જાતો જેવિકી ગુજરાત તલ-૧૦ પસંદ કરવી. વાવણી અંતર: બે હાર વચ્ચે ૩૦ સેમી અને બે છોડ વચ્ચે ૧૦ સેમીનું અંતર જાળવવું. બિયારણ દર: એક લેક્ટરમાં તલના વાવેતર માટે ૩-૫ કિલો બીજની જરૂરિયાત રહે છે. રાસાયણિક ખાતર: એક લેક્ટર દીઠ ૧૦ ટન છાણીનું ખાતર, ૨૫ કિલો નાઈટ્રોજન, ૨૫ કીલો ફ્રોસ્ફ્રેસ અને ૪૦ કિલો પોટાશ વાવણી સમયે જ આપવું. ડી.એ.પી. ખાતરને બદલે સિંગલ સુપર ફ્રોસ્ફેટ ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી વધારાનો સલ્ફર આપવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. ઉગાવા બાદ ૩૦-૩૫ દિવસે ૨૫ કિલો નાઈટ્રોજન પુરતી ખાતર તરીકી આપવું. પિયત: પ્રથમ પિયત વાવેતર સમયે, બીજું પિયત ૪-૬ દિવસના ગાળે, ત્રીજું પિયત છોડ ચાર પાંદડાનો થાય ત્યારે અને બાડીના. પિયત જરૂરિયાત પ્રમાણે જમીનના પ્રકાર મુજબ ૬-૧૦ દિવસના અંતરે જેમકે કૂલ બેસવા, બેઢા બંધાવા અને દાણા ભરાવા જેવી કટોકટીની અવસ્થાએ આપવાથી સારું ઉત્પાદન મેળવી શકાય. નિંદણ નિયંત્રણ: પાક અવસ્થાએ બે આંતર ખેડ અને પછીનાં દિવસોમાં જરૂરિયાત મુજબ હાથ નિંદણ નિયંત્રણ કરવું.
ઉનાળું બાજરો	<ul style="list-style-type: none"> વાવેતર સમય: ફેબ્રુઆરી માસના પહેલા કે બીજ અઠવાડીયામાં વાવેતર કરવું. ઉનાળું બાજરાના વાવેતર માટે ગુજરાત હાઈબ્રીડ બાજરી-પર્ફ, ગુજરાત હાઈબ્રીડ બાજરી-પપ્પ, ગુજરાત હાઈબ્રીડ બાજરી-પાર્ટ જેવી સુધારેલી જાતો પસંદ કરવી.
ઉનાળું અડદ	<ul style="list-style-type: none"> જાતની પસંદગી: ગુજરાત અડદ-૧, ટીપીયુ-૪ અથવા ટી-૮ જેવી જાતો પસંદ કરવી. વાવણી અંતર: બે હાર વચ્ચે ૩૦ સેમી અને બે છોડ વચ્ચે ૧૦ સેમી. બિયારણ દર: ૨૦-૨૫ કિગ્રા/લેક્ટર રાસાયણિક ખાતર: એક લેક્ટરે ૨૦ કિગ્રા નાઈટ્રોજન, ૪૦ કીગ્રા ફ્રોસ્ફ્રેસ ચાસમાં ઓરીને આપવું. પિયત: પ્રથમ પિયત વાવેતર પછી તરત જ અને ત્યાર પછીનું પિયત ૪-૫ દિવસે સારા ઉગાવા માટે આપવું. તે પછી જમીનની પરત મુજબ પિયત આપવા. નિંદણ નિયંત્રણ: પાક અવસ્થાએ બે આંતર ખેડ અને પછીનાં દિવસોમાં જરૂરિયાત મુજબ હાથ નિંદણ નિયંત્રણ કરવું.
ઘંઠ	<ul style="list-style-type: none"> ઉધ્ય: ઉધ્યનો ઉપદ્રવ રહેતો હોય ત્યાં કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ટકા એ.સી. ૫ લીટર દવા પિયત પાણી સાથે આપવી.

	<ul style="list-style-type: none"> પિયત: ધઉંમાં પિયત કૂલ અવસ્થા અને દુઃખિયા દાણાની અવસ્થાએ પિયત વાતાવરણ ચોખ્ખું હોય ત્યારે આપવું. ઉંદર: જો ધઉંના પાકમાં ઉંદરનું નુકશાન જોવામળે તો જીક ફોસ્ફાઈટ, બેરીયમ કાર્બોનેટ અને રેડ સ્ક્રેલ ભોરાક સાથે બેળવીને મુકવાની ઉંદરના ત્રાસ સામે નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે. રાતડો અને ગેરુ: રોગની શરૂઆતમાં મેન્કોઝેબ ઉપ વેપા ૪૦ ગ્રામ ૧૫ લીટર પાણીમાં બેળવી ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા. 	
ચાળા	<ul style="list-style-type: none"> સુકારો: ટ્રાયકોડર્માં કૂગનાશક પાવડર પ-૬ કિગ્રા/હેક્ટારે જમીનમાં આપવું જેથી જમીનજન્ય રોગોથી થતું નુકસાન અટકાવી શકાય છે. 	
	<ul style="list-style-type: none"> પિયત: ચાળામાં કૂલ અને પોપટા બંધાવવાની અવસ્થાએ પિયત વાતાવરણ ચોખ્ખું હોય ત્યારે આપવું. લીલી ઈયળ: લીલી ઈયળનો ઉપદ્રવ આંથિક ક્ષમ્યમાત્રા કરતાવધુ જોવા મળે ત્યારે કવીનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીછંટકાવ કરવો. 	
જૃ	<ul style="list-style-type: none"> સુકારો: ટ્રાયકોડર્માં કૂગનાશક પાવડર પ-૬ કિગ્રા/હેક્ટારે જમીનમાં આપવું જેથી જમીનજન્ય રોગોથી થતું નુકસાન અટકાવી શકાય છે. 	
	<ul style="list-style-type: none"> પિયત: સુકારો અને કૂગના રોગને રોકવા માટે વધુ પિયત ન કરો. જમીનની પરત મુજબ માત્રને માત્ર ૩-૪ પિયત જ આપવા. કાળી ચરમી: જરૂના પાકમાં જાકળ વધુ પ્રમાણમાં આવે તો પિયત મુલતવી રાખવું, તેમજ કાળી ચરમી અને રાખોડીનો ઉપદ્રવ થાય નહિ તે માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ ૨૫ મિલી દવા ૧ પંખ્યમાં નાખીને છંટકાવ કરવો. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ભૂકીછારો: ભૂકીછારા રોગના નિયંત્રણ માટે વહેલી સવારે ૩૦૦ મૈશનો ગંધક પાવડર હેક્ટારે ૧૫ થી ૨૦ 	

	<p>ક્રિ.ગ્રા.અથવા પ્રોપીકોનોજોલ અથવા હેક્ઝાકોનોજોલ ૧૦ મી.લી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો.</p> 
ધાળા	<ul style="list-style-type: none"> પિયત: સુકારો અને કુગના રોગને રોકવા માટે વધુ પિયત ન કરો. મોલો: મોલોના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૨૦ મિલી અથવા ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. ભૂકીછારો/રાખોડી: ધાળાના પાકમાં ભૂકીછારો/રાખોડી અને કાળી ચરમી નો ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે હેક્ઝાકોનોજોલ ૧૫ મિલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ભૂકી છારાના નિયંત્રણ માટે કુસીલાજોલ ૧૦ મિલી પંપ માં નાખીને છંટકાવ કરવો.
લસણ	<ul style="list-style-type: none"> ચુસીયા પ્રકારની જીવાત: ચુસીયા પ્રકારની જીવાત ના નિયંત્રણ માટે ફોર્સફામીડોન ૫ મીલી અથવા ડાયમીથોએટ ૧૫ મિલી અથવા મીથાઈલ-ઓ-ટેમેટોન ૧૫ મિલી દવાને ૧૫ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા. પીળા પાન: પાન પીળા પડતા અટકાવવા મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અથવા હેક્ઝાકોનોજોલ ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં નાખીને છંટકાવ કરવો. 
	<ul style="list-style-type: none"> પિયત: વધારે પડતું પિયત આપવાથી પાંદડા ના રોગ થવાની સમભાવના વધી જય છે. જરૂરિયાત મુજબ વાતાવરણ ચોખ્ખાનું હોય ત્યારે આપવું.
દુંગળી	<ul style="list-style-type: none"> ચુસીયા પ્રકારની જીવાત: ચુસીયા પ્રકારની જીવાત ના નિયંત્રણ માટે ફોર્સફામીડોન ૫ મીલી અથવા ડાયમીથોએટ ૧૫ મિલી અથવા મીથાઈલ-ઓ-ટેમેટોન ૧૫ મિલી દવાને ૧૫ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા. ઝંબલી ધાબાનો રોગ: દુંગળીમાં ઝંબલી ધાબાનો રોગ લાગે નહિ તે માટે પ્રોપીકોનોજોલ, મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અને કાર્બેન્ડાજીમ ૧૫ ગ્રામ ૧ પંપમાં વારા ફરતી કોઈપણ એક દવા નાખીને ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા. 
કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> વીણી: સમયસર વીણી હાથ ધરવી. છેલ્લી વીણી પછી બકરા, ઘેટાં ચરાવવા જેથી ખુલ્યા વગરના ગુલાબી દીધળના નુકસાન વાળા જીડ્વા અને અન્ય કયરો નાશ પામે. ત્યારબાદ કરાંઠી સળગાવવી નહિ પરંતુ રોટાવેટર અથવા મોબાઈલ ચોપરથી નાના ટુકડા કરી જમીનમાંદાટી દેવા જેથી જમીનમાં સેન્ટ્રીય તત્વનો ઉમેરો થવાથી સૂક્ષ્મ જીવોની સંખ્યા વધશે અને જમીનના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અથવા કરાંઠી ભેગી કરી શ્રેડરથી નાના ટુકડા કરીને છાણ, યુરીયા, કમ્પોસ્ટ કલ્યર ઉમેરી દેશી(સેન્ટ્રીય) ખાતર બનાવવું.
દિવેલા	<ul style="list-style-type: none"> ધોડિયા દીધળ અથવા લીલી દીધળ: ધોડિયા દીધળ અથવા લીલી દીધળ ના નિયંત્રણ માટે ડાયક્લોરેવોસ ૭૬ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા મીથાઈલ ઓ-ટેમેટોન ૨૫ ઈસી ૧૫ મિલી ૧૫ લીટર પાણીમાં નાખીને વરાંપે છંટકાવ કરવો.

		
તુવેર	<ul style="list-style-type: none"> વંધ્યત્વનો રોગ: તુવેરમાં સ્ટરીલીટી મોઝેક (વંધ્યત્વનો રોગ, કથીરી)ના નિયંત્રણ માટે પ્રોપરાઈટ ૫૭% ઈ.સી ૩૦-૪૦ મિલી/પંપ વરાપે છંટકાવ કરવો. ચુસીયા પ્રકારની જીવાતો: તુવેરના પાકમાં ૫૦% કુલ બેસવાની અવસ્થાએ ચુસીયા જીવાતના નિયંત્રણ માટે ૧૫ મીલી પોલીરીન અથવા ૨૦ ગ્રામ એસીફિટ અથવા ૫ મીલી ઈન્ડોક્ષાકાર્બ અથવા ૨૫ મીલી પ્રોફ્નોફ્લોસ દવાને ૧૦લીટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો. શીંગ માખી અને શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળ: તુવેરમાં શીંગ માખીનો વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો ક્વીનાલફ્લોસ અથવા પ્રોફ્નોફ્લોસ ૨૦ મી.લી. પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સ્પીનોસાદ ૪ મી.લી. અથવા એમામેક્ટીન બેન્જોએટ ૭ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. પિયત: કુલ અવસ્થાએ અને શીંગો ભરાવવાની અવસ્થાએ પાણીની ખેચ ના પડે તેમ પિયત આપવું. 	
શાકભાજી પાકો	<ul style="list-style-type: none"> રોગીષ છોડને ખેતરમાંથી ઉપાડીને જમીનમાં દાટી દેવા જોઈએ. શાકભાજી પાકોને નિંદણ મુક્ત રાખવા જોઈએ. પાન કોરીયુ: વેલાવાળા શાકભાજી પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવટાળવા માટે ૧૫ મીલી મીથાઈલ-ઓ-ટેમેટોન (૨૫ઈસી) અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૫ લીટરપાણીના પંપમાં નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો. શ્રીપ્સ: મરચીના પાકમાં શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ૩૦ મીલીપ્રોફ્નોફ્લોસ ૧૫ લીટરપાણીમાં મિશ્રણ કરી છાંટવી. શ્રીપ્સનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા ૭-૮મીલી પ્રતિ પંપ વરાપે છંટવી. ફળમાખી: ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે એસીટામીગ્રીડ ૨૦ ટકા ૧૫ ગ્રામ દવા ૧૫ લીટર પાણીમાં બેળવી વરાપે છંટકાવ કરવો. 	 



- **લીલી ઈયળ:** ટામેટાના પાકમાં લીલી ઈયળનો ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે છે તેના નિયંત્રણ માટે ઈન્ટોક્ઝાકાર્બ ૨૫ ઈસી ૩૦ મિલી અથવા સ્પીનોસાદ ૪૫ ઈસી પ મિલી પ્રતિ પંપ વરાપે છાંટવી.
- રીતાણના પાકમાં જો ફળ અને ડોકાની ઈયળનો ઉપદ્રવ હોય તો રીતાણીપાયર ૧૮.૫ એસ.સી દવા પ મિલી ૧૫ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો.



- **પાનકથીરી:** શાકભાજી પાકોમાં પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો ફેનાઝાકવિન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા ડાયફેનયુરોન ૫૦ ડાયલ્યુ પી ૧૫ ગ્રામ ૧૫ લીટર પાણીમાં પંપમાં નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો.



- **સફેદ માખી અને લીલી:** ભીડામાં સફેદ માખી અને લીલી પોપટીના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનુંતેલ ૫૦ મી.લી. અથવા લીઓળીના મીજનું પ ટકા અંક નુંદ્રાવણ ૫૦૦ મી.લી. અને ડાયફેનથાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો.

પશુ

- પશુઓના રહેઠાણની જગ્યાની વ્યવસ્થિત સફાઈ રાખવી અને માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફ્રિનાઈલ છાંટવું અથવા લીમડાનાં પાનનો ધૂમાડો કરવો.
- પશુને દ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને પ્રતિ લીટર દુધની ઊપજ હોય તેમને નિયમિત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્ત્વોનું મિશ્રણ આપવું.
- ઇતરરીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેશ્નીન અથવા એમીટ્રાલ ૨ મી.લી. એક લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી.

District Agrometeorological Unit (DAMU)

GraminKrushi Mausam Seva (GKMS)

Krishi Vigyan kendra

Junagadh Agricultural University

Jamnagar-361006

Date:26-01-2022 to 30-01-2022

(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav)



Jamnagar District Agromet Advisory Service bulletin No. 07(2021) Date: 25-01-2022

(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

Significant weather for the preceding week

weather parameter		
Rain fall (mm)		0.0
Maximum temperature (°C)		23.0-28.5
Minimum temperature (°C)		12.0-14.5
Relative Humidity (%)	Morning	67-87
	Afternoon	26-56
Wind speed (Kmph)		2.8-7.8

Weather forecasting for Jamnagar District

Date	Day-1 26-01-2022	Day-2 27-01-2022	Day-3 28-01-2022	Day-4 29-01-2022	Day-5 30-01-2022
Parameters					
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature (°C)	25	27	27	28	28
Minimum temperature (°C)	12	13	13	13	14
Relative Humidity-I (%)	42	39	39	39	40
Relative Humidity-II (%)	22	20	19	19	19
Wind speed (Km/h)	17.7	21.1	19.8	16.9	11.2
Wind Direction (deg.)	NE	NE	NE	E	E
Cloud cover (Okta)	Clear sky				

Note: Above forecast is the average situation of whole district not for one particular place.

Gramin Krishi Mausam Seva, Krishi Vigyan Kendra, Jamnagar and Indian meteorological department announce upcoming five days weather forecast of

Jamnagar district have sky will be observed clear weather forecast in next five days.

Rain fall: In the next no chances of rainfall


Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range 25-28 °C and 12-14 °C, respectively.

Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 39-42 % & 19-22 %, respectively.

Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NE-E and 11.2-21.1 km/h, respectively.

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 03 (15.01.2022 to 21.01.2022) over Agricultural region

Gujarat



Agricultural vigour is good over few pockets of the state.

General Agricultural Advisory

- As per IMD forecast next two days have cold wave condition forecast. Prevent to go outside and cover your body with woolen clothes.
- Apply light irrigation at evening time to protect the crop due to cold wave.
- For the sowing of summer crop, prepare the field on the basis of crop. Select the proper variety of related crop and purchase the seed from trustable agency. Apply the basal dose of fertilizer as per crop and soil requirement.
- If pest infestation may increase in Rabi crops, so monitor the crops, if infestation is above ETL then take control measures as per advisory given.
- Spray the Hexaconazole 25 ml / Carbendazim 20 gm / Tebuconazole 30 ml / Mancozeb 50 gm per pump to prevent Disease infestation on Rabi crop at clear sky condition.

- Over irrigation increase pest and diseases in crops, so apply irrigation as per requirement.

Crop wise Advisory	
Crop	Advisory
Summer Groundnut	<ul style="list-style-type: none"> • Sowing time: Sowing should be carried out in the end of January month. • Variety: Selecting early maturing vertical varieties for sowing so that harvesting and threshing operations can be completed before monsoon rains. GG-2, GG-5, GG-6, TAG-24, TG-26 and TG-37A choose any one early maturing variety from these. • Spacing: Between row 7.5-10 cm and between plant 4-5 cm distance maintain. • Seed Rate: 120 kg/ha • Fertilizer: 25 kg Nitrogen, 50 kg Phosphorus and 50 kg Potash for one hectare application. • Irrigation: Apply first irrigation after sowing and next irrigation after 6-7 days for better seed germination.
Summer Greengram	<ul style="list-style-type: none"> • Sowing time: Sowing should be carried out in between February 15th to March 15th Month. • Select the variety like Gujarat Mung-2, 3, 4, K-851, C.O.-4 and Meha. • Spacing: Between row 30 cm and between plant 10 cm distance maintain. • Seed Rate: 20-25 kg/ha • Fertilizer: 20 kg Nitrogen, 40 kg Phosphorus one hectare application. • Irrigation: Apply first irrigation after sowing and next irrigation after 4-5 days for better seed germination. • Weed Control: At a crop stage two time Interculturing and after hand weeding as per requirement.
Summer Sesame	<ul style="list-style-type: none"> • Sowing time: Sowing should be carried out in starting month of February. • Variety: Select the variety like Gujarat til-1, 2, 3, 4 (White seed) and Gujarat til-10 (Black seed). • Spacing: Between row 30 cm and between plant 10 cm distance maintain. • Seed Rate: 3-5 kg/ha • Fertilizer: 25 kg Nitrogen, 25 kg Phosphorus and 40 kg Potash for one hectare application. • Irrigation: Apply first irrigation after sowing, second irrigation after

4-6 days, third irrigation when plant have four leaf stages and after irrigation on the basis of soil type.

- **Weed Control:** At a crop stage two time Interculturing and after hand weeding as per requirement.

Summer Pearl millet

- **Sowing time:** Sowing should be carried out in 1st or 2nd Week of February.
- For the sowing of Summer Bajara select the variety like Gujarat Hybrid Bajara- 526, Gujarat Hybrid Bajara- 558, Gujarat Hybrid Bajara- 538.

Black Gram

- **Spacing:** Between row 30 cm and between plant 10 cm distance maintain.
- **Seed Rate:** 20-25 kg/ha
- **Fertilizer:** 20 kg Nitrogen, 40 kg Phosphorus one hectare application.
- **Irrigation:** Apply first irrigation after sowing and next irrigation after 4-5 days for better seed germination.
- **Weed Control:** At a crop stage two time Interculturing and after hand weeding as per requirement.

Wheat

- **Termite:** Application of Chlorpyriphos (20 EC) @ 5 litres per hectare with irrigation in the fields having perennial problem of termite infestation.



- **Irrigation:** apply irrigation at critical stages viz. flowering stage and dough stage in clear sky condition.
- **Rodent:** If rodent attack seen in wheat crop, make the food availability with poison like Zinc phosphide, Barium carbonate and Red squill.
- **Leaf blight and rust:** To control leaf blight and rust in wheat, at the beginning of the disease Apply a spray of Mancozeb 75 WP 40 gm in 15 litres of water twice at 15 days of interval.



Chick pea

- **Wilt:** apply trichoderma fungicide 5-6 kg/ha to prevent the wilt related disease in chickpea crop.



- **Irrigation:** Apply irrigation at flowering, poding and Maturity stage in clear sky condition.
- **Heliothis:** If incidence of Heliothis cross ETL, spray Quinalphos 25 EC 20 ml in 10 litres of water.



- **Stunt virus:** As the disease is spread through aphid, systemic insecticide like Methyl-O-dimeton @18 ml Or dimethoate @ 15 ml Mix in 15 liters of water and spray as required.



Cumin

- **Wilt:** apply tricoderma fungicide 5-6 kg/ha to prevent the wilt related disease in cumin.



- **Irrigation:** Do not over irrigate to prevent wilt and fungal disease.
- **Alternaria blight:** Postponed the irrigation in cumin crop in case of dew. Apply Hexaconazole 25 ml/pump for the Alternaria blight and wilt control.



- **powdery mildew:** Apply spray of Propiconazole @ 10 ml/10 liter in water or Hexaconazole or Supher @ 15-20 kg/ha for control of powdery mildew.



Coriander

- **Irrigation:** Do not over irrigate to prevent wilt and fungal disease.
- **Aphid:** Spray Diamethoate 20 ml or Imidacloprid 3 ml in 10 liters of water.

- **Powdery mildew/blight:** Spray 15 ml Hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew/ blight disease in coriander under clear weather. Spray the Cusilazole 40% 10 ml/pump for the control of the powdery mildew.

Garlic

- **Sucking pest:** For the control of thrips, spray Phosphamidon 5 ml or Dimethoate 15 ml or Methay-o- Demeton 15 ml in 15 liter of water at 15 days interval.



- **Leaf blight:** Carry out spraying of Mencozeb 75 % WP 40 gm/10 lit or hexaconazole 15ml/10 lit of water to prevent leaf blight disease in garlic crop.



- **Irrigation:** Do not over irrigate to prevent leaf blight disease. Apply irrigation at clear sky condition.

Onion

- **Sucking pest:** For the control of thrips, spray Phosphamidon 5 ml or Dimethoate 15 ml or Methay-o- Demeton 15 ml in 15 liter of water at 15 days interval.
- **purple blotch:** For the control of purple blotch blight and fusarium wilt disease in onion make 3 alternate sprays of Mancozeb 40 gm and Carbendazim 15 gm in 15 litres of water.



Cotton

- **Picking & pulling of cotton stalk:** Carry out picking in time. Animals like goats,sheep among others, should be allowed to graze on unopened bolls and plant debris in the cotton fields after the last picking to prevent infestation in subsequent year. After grazing,don't burn cotton stalk but do in-situ chopping & burying of cotton stalk in soil by mobile chopper and rotavator to improve soil biomass and health.

Castor

- **semi looper and spodoptera:** For the control of semi looper and spodoptera spray dichlorovos 76 EC 10 ml or methyl o demeton 25 EC 15 ml mix in 15 liter water and spray alternate in clear weather condition.



Red gram

- **Starility mosaic Virus:** Red mite infestation and spread Starility mosaic virus, for control them spray properzait 57% EC 30-40 ml/pump in clear weather condition.



- **Sucking pest:** For the control of sucking pest at 50 % flowering, spray 15 ml politrin OR 20 gm acephate OR 50 ml endoxacarb OR 25 ml profenophos in 10 liter of water.

- **Pod fly and Pod borer:** Monitor the crop for infestation of pod fly and pod borers due to cloudy weather if infestation observed spray quinalphos or profenofos 20 ml/10 liter of water for control of pod fly and Spinosad 4 ml or emamectin benzoate 7 gm/10 liter of water for the control of pod borer complex.



- **Irrigation:** Apply irrigation at flowering and pod formation stage without stress.

Vegetables

- Infected plants should be uprooted and buried in the soil.
- Keep vegetable crop weed free.
- **leaf Webber:** For the control of leaf Webber in fruit leafy vegetable spray 15 ml methyl-O-demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 15 liter of water in clear weather condition.



- **Thrips in chilli:** For the control of thrips in chilli, spray 30 ml profenophos in 15 litres of water. In case of heavy attack make spray of spinosad or spinetoram 7-8 ml per 15 liter of water in clear weather condition.



- **Fruit fly:** For the control of Fruit fly spray acetamiprid 20 % 15 gm per 15 liter water pump in clear weather condition.



- **Fruit borer:** In brinjal and tomato crops control of fruit borer, spray reenaxipayar @ 5 ml in 15 lit of water. In tomato crops control of fruit borer, spray indoxacarb 25 EC 30 ml or spinosad 45 EC 5 ml per pump mix in water and spray in clear weather condition.



- **Mite:** If mite infestation observe in vegetable then spray fenazaquin 10 EC 10 ml or diafenuron 50 WP 15 gm per 15 liter water pump and carried out alternate spray in clear weather condition.



- **Whitefly & jassids in Okra:** For control of whitefly & jassids in Okra, spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml neem oil or acephate 75 % SP@ 15 gm or imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 liter of water in clear weather condition.

Animals

- Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.
- Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield.
- Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick.