Unseasonal Rainfall - Alerts and Warning: Dt.12.07.2022

As per IMD

Impact based forecast (IBF) for Agriculture for the districts of Saurashtra-Kachchh (based on the forecast issued on 11-07-2022)

District Level Forecast and warning issued by MC, Ahmedabad on 11-07-2022

Heavy to extremely heavy rainfall Alerts and Warning: Dt.12.07.2022

As per IMD

Dated 12 to 16-July-2022: Rain fall warning as per following

Valid from 0830 Hrs. IST of 12/07/2022 to 0830 Hrs. IST of 13/07/2022:

Heavy to very heavy rains very likely at isolated places in the districts of Saurashtra namely Amreli, Bhavnagar, Gir Somnath & in Diu.

Heavy rains very likely at isolated Places in the districts of Saurashtra namely Porbandar, Junagadh & Dwarka.

Heavy rains very likely at isolated Places in the districts of Saurashtra-Kutch namely Dwarka, Jamnagar and Kutch.

(Valid from 0830 Hrs. IST of 13/07/2022 to 0830 Hrs. IST of 14/07/2022):

Heavy to very heavy rains very likely at isolated places in the districts of Saurashtra namely Amreli, Gir Somnath and Junagadh & in Diu.

Heavy rains very likely at isolated Places in the districts of of Saurashtra namely Rajkot, Porbandar, Bhavnagar and Dwarka.

(Valid from 0830 Hrs. IST of 14/07/2022 to 0830 Hrs. IST of 15/07/2022): Heavy to very heavy rains very likely at isolated places with isolated extremely heavy falls in the districts of Saurashtra namely Amreli, Bhavnagar, Gir Somnath & in Diu.

Heavy to very heavy rains very likely at isolated places in the districts of Saurashtra namely Rajkot, Porbandar & Junagadh.

(Valid from 0830 Hrs. IST of 15/07/2022 to 0830 Hrs. IST of 16/07/2022):

Heavy to very heavy rains very likely at isolated places with isolated extremely heavy falls in the districts of Saurashtra-Kutch namely Jamnagar, Dwarka & Kutch.

Heavy to very heavy rains very likely at isolated places in the districts of Saurashtra Rajkot & Porbandar. Heavy rains very likely at isolated Places in the district of Saurashtra namely Junagadh., Morbi & Girsomnath

Expected Impact with respect to Red Colour warning issued for the Districts namely Amreli,

- Soil erosion and lodging of trees and plant.
- Major damage to kuchcha roads due to inundation.
- Major disruption in traffic in city areas.
- Inundation of low lying areas leading to damage to kuchcha houses.
- Water logging in underpass in city areas.
- Sudden reduction in visibility during heavy downpour leading to road accidents.
- Mainly water logging problem found near wetland and marshy land of urban land rural region.

Steps to betaken to minimize damage:

For Agriculture

- Arrange for extensive drainage facilities to remove excess water from standing crop fields.
- Do not carry out any kind of foliar spray in crop field during forecast period.
- After cessation of wet spell immediately apply Ammoiium sulphate and murate of post fertilizers 30 kg/ha each unde vapsa condition.
- Where cotton crop burn/died due excessive moisture in lowlying area resowing is suggested after wet spell.
- Keep animals indoor during the period.
- Do not let the animal outside during heavy rains.
- Make provision of quality fodder and drinking water for animals.
- Take care that no rain water should enter into poultry house.

IBF & Agromet Advisories based on the forecast issued by

AMFU-Targhadia on 12-07-2022

District	Crop	Stage	Likely Impact on crop	Advisory
Red & orange alert in Amreli Dwarka, Jamnagar, Rajkot due to heavy rainfall forecast	Cotton	Germination to early establishment stage	 Infestation of fungal diseases may occurs. Burning or dying of plants due to contimous saturated condition 	drainage facility during spells of heavy rainfall.
			•	•
	Ground	Germination, growing & flowering	 Infestation of fungal diseases may occurs. Yeallowing of crops due to long period 	drainage facility during spells of heavy rainfall.

		soil moisture saturation condition.	Ammoiium sulphate and murate of post fertilizers 30 kg/ha each unde vapsa condition. • Keep the field in vapsa condition. • To prevent leaf spot disease infestation spray Tebuconazole 18.3 % SC 10 in 10 liters of water as precautionary measure under clear sky.
Vegetable nursery	Seedling stage	 Burning or dying of seedling due to contimous saturated condition Infestation of fungal diseases may occurs. 	 Arrange for extensive drainage facility during spells of heavy rainfall. After cessation of wet spell immediately apply Ammoitum sulphate and murate of post fertilizers 30 kg/ha each unde vapsa condition. Keep the field in vapsa condition. To prevent soil borne disease drenching of nursery bed should be done with Mencozeb 75 % WP @ 2.5 gm/ litre water.
All vegetable crops	Fruiting and fruit ripening	 Inferior the quality of fruits fungal disease infestation may increase. 	drainage facility during spells of heavy rainfall.

Regional language

કમોસમી વરસાદની આગાહી : તા.૧૨.૦૭.૨૦૨૨

તારીખ	ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગના ગુજરાત કેન્દ્ર દ્વારા પ્રસારિત આગાહી				
92-95	અનુસાર તા.૧૨ થી ૧૬ જુલાઈ ૨૦૨૨ દરમ્યાન સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, રાજકોટ				
જુલાઈ	દેવભૂમિ દ્વારકા,અને જામનગર જીલ્લાઓમાં વિસ્તારમાં મધ્યમ, ભારે અને અતિ ભારે				
5055	વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ઉપરોક્ત વરસાદની આગાઠીને ધ્યાનમાં રાખીને • ખેતરના નીચાણ વાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાચેલ પાણીનો તત્કાલ નિકાલ કરવાની વ્યવસ્થા કરવી. • પાણીનો ભરાવો થતો હોય તેવા વિસ્તારમાં જવાનું ટાળો. • તૈયાર ખેતપેદાશ અને પશુઓને સલામત જગ્યાએ રાખવા. • આ સમય દરમ્યાન ઉભાપાકમાં કોઇપણ પ્રકારની દવાઓ તેમજ ખાતરોનો છંટકાવ કરવો નિહે. • આ સમય દરમ્યાન ખેત પેદાશ વેચાણ માટે માર્કેટિંગ ચાર્ડમાં વેચાણ માટે				
	લઇ જવી નહિ.				
	 મરધા ધરમાં વરસાદનું પાણી પડે નિહ તેની તકેદારી રાખવી. માછીમાર ભાઈઓએ દરિયામાં જવું નિહ. પ્રભાવિત વિસ્તારમાં નાગરીકોએ ઘરની બહાર નીકળવું નિહ. નીયાણવાળા વિસ્તારમાં અને કાચા મકાનમાંથી લોકોએ સલામત્સ્થળે ખસી જવું. 				
	• નદીના પટમાં જવું નિહ .				

હવામાન આગાહી આધારિત કૃષિ સલાહ :

જીલ્લો	પાક	પાક અવસ્થા	પાક ઉપર સંભવિત	કૃષિસલાહ
સૌરાષ્ટ્ર ના	કપાસ	ઉગાવો અને	• કૂગ જન્ય રોગનો	•વરસાદના પાણીના નિકાલની
દ્રારકા,		શરૂઆતનો વિકાસ	ઉપદ્રવ થવાની	
અમરેલી			સંભાવના	• વરસાદનો રાઉન્ડ પૂરો થયા
રાજકોટ,			• પાલાંબો ણી ભરાય	પછી કપાસમાં એમોનિયમ
જામનગર,			રહેવાના કારણે છોડ	સલ્ફ્રેટ અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ દરેક ૩૦ કી.ગ્રા./હે.
દેવભૂમિ			સુકાય શકે.	પુરતી ખાતર તરીકે આપવું.
હ્રા૨ક <u>ા</u>			• ધીમો વિકાસ થાય	• અલ્ટરનેરઆ ફૂગનો રોગ
જીલ્લાઓમાં				લાગે નહિ તે માટે મેન્કોઝેબ
રેડ અને				૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીઅતા પાણીમાં મિશ્ર કરી
ઓરેન્જ				પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
એલર્ટ				
	મગફળી	ઉગાવો/વૃદ્ધિ/ફૂલ	●ઉભા પાકમાં ફૂગ જન્ય રોગના ઉપદ્રવની સંભાવના •સતત પાણી ભરવાના કારણે મગફળી પીળી પડવાની શક્યતા રફે.	 વરસાદનો રાઉન્ડ પૂરો થયા પછી મગફળીમાં માં એમોનિયમ સલ્ફેટ અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ દરેક
	શાકભાજી ધરું	ધરું કે રોપ અવસ્થા	•ઉભા પાકમાં ક્રૂગ જન્ય રોગના ઉપદ્રવની સંભાવના •સતત પાણી ભરાવાના કારણે રોપ પીળો પડી સુકાવા લાગે.	વ્યવસ્થા કરવી. વરસાદનો રાઉન્ડ પૂરો થયા પછી રોપમાં માં એમોનિયમ સલ્ફેટ અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ દરેક ૩૦

		• રોપનો વૃદ્ધિ અને વિકાસ રૂંધાય	માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીઅતા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો અને ડ્રેનર્યીંગ કરવું .
શાકભાજી પાકો	ફૂલ અને ફળ	• ઉભા પાકમાં ફૂગ જન્ય રોગના ઉપદ્રવની સંભાવના • સતત પાણી ભરાવાના કારણે છોડ પીળો પડી સુકાવા લાગે. • વૃદ્ધિ અને વિકાસ રૂંધાય	વરસાદના પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરવી. વરસાદનો રાઉન્ડ પૂરો થયા પછી એમોનિયમ સલ્ફેટ અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ દરેક ૩૦ કી.ગ્રા./હે. આપવું. તળછારાની ફૂગનો રોગ લાગે નહિ તે માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો .

V.D. Vora & M.H.Ghadia

AMFU-JAU-Targhadia







