



હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૦૬-૦૮-૨૦૧૪ થી તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૪



(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, સૂકી ખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરઘડીયા અને ભારત મૈસમ વિભાગ દ્વારા સંપદ્ન)

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૩૭/૨૦૧૪

પાછળા અઠવાડીયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિબળો	ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર
	રાજકોટ
વરસાદ (મી.મી)	23.1
મહત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	30.0-32.5
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	25-25.2
ભેજ (%) સવાર	85-92
બપોરબાદ	82-87
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	7.5-10.5

હવામાન આગાહી: પત્રક-ક

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી
(તા. ૦૬-૦૮-૨૦૧૪ થી તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૪)

કૃષિ સલાહ :

સામાન્ય	> ભારત સરકારશીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા વિભાગ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરઘડીયા તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના
	> ૧.૨ રાજકોટ: જીલ્લામાં આગામી તા. ૦૬-૦૮-૨૦૧૪ થી તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૪ દરમ્યાન હવામાન મુખ્યત્વે વાદળણાયું રહેવાની અને વરસાથી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. પવનની દિશા નૈઝેત્ય અને પણ્યમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૨૧ થી ૨૪ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૧ થી ૩૨ દીશી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્વમાન રાત્રિ દરમ્યાન ૨૪ થી ૨૫ દીશી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૦૬-૦૮-૧૪	૦૭-૦૮-૧૪	૦૮-૦૮-૧૪	૦૯-૦૮-૧૪	૧૦-૦૮-૧૪
વરસાદ (મી.મી)	3	8	6	5	7
મહત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	31	31	31	32	32
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	25	24	24	24	24
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો)	6	6	5	4	4

મહત્વાની ગતિ (%)	86	86	85	84	83
લઘુત્તમ ભેજ (%)	73	68	64	62	62
બપોરબાદ					
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	24	22	21	21	21

➢ **રાજામનગર** જીલ્લામાં આગામી તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૪ થી તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૪ દરમ્યાન હવામાન મુખ્યત્વે વાદળછાયું અને વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. પવનની દિશા નૈઝેત્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૨૪ થી ૨૫ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૦ થી ૩૧ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રિ દરમ્યાન ૨૫ થી ૨૫ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૦૬-૦૮-૧૪	૦૭-૦૮-૧૪	૦૮-૦૮-૧૪	૦૯-૦૮-૧૪	૧૦-૦૮-૧૪
વરસાદ (મી.મી)	0	5	3	3	3
મહત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	30	30	30	31	31
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.શે)	25	25	25	25	25
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	7	6	4	5	4
મહત્વમાન ભેજ (%)	84	85	83	83	82
લઘુત્તમ ભેજ (%)	74	71	68	67	67
બપોરબાદ					
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	25	25	24	25	24
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	250	240	230	230	230

➢ **અમરેલી** જીલ્લામાં આગામી તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૪ થી તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૪ દરમ્યાન હવામાન વાદળછાયું રહેશે અને હળવા વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. પવનની દિશા નૈઝેત્ય અને પણ્યમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૮ થી ૨૪ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૦ થી ૩૧ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રિ દરમ્યાન ૨૪ થી ૨૫ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૦૬-૦૮-૧૪	૦૭-૦૮-૧૪	૦૮-૦૮-૧૪	૦૯-૦૮-૧૪	૧૦-૦૮-૧૪
વરસાદ (મી.મી)	3	8	6	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	30	30	30	31	31
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.શે)	25	24	24	24	24
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	6	6	4	4	5
મહત્વમાન ભેજ (%)	86	86	84	83	83
લઘુત્તમ ભેજ (%)	74	69	63	61	62
બપોરબાદ					
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	24	22	20	19	20
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	250	230	230	230	230

➢ **સુરેન્દ્રગઢ** જીલ્લામાં આગામી તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૪ થી તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૪ દરમ્યાન હવામાન મહદુમેંશે વાદળછાયું રહેશે અને હળવા વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. પવનની દિશા નૈઝેત્ય અને પણ્યમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૮ થી ૨૦ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૧ થી ૩૨ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રિ દરમ્યાન ૨૪ થી ૨૫ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

તारीખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૦૫-૦૮-૧૪	૦૭-૦૮-૧૪	૦૮-૦૮-૧૪	૦૯-૦૮-૧૪	૧૦-૦૮-૧૪
વરસાદ (મી.મી)	3	12	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	31	31	31	31	32
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	24	24	25	25	25
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	7	6	5	4	3
મહત્વમાન ભેજ (%) સવાર	84	86	83	81	80
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	66	69	57	56	54
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	20	19	18	18	19
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	250	230	220	220	230

- ચોમાસુ પાકોમાં વરાપ થયે આંતર ખેડ અને નિંદામણ કરવુ.
- ખેતરમાં નિયાષવાળા વિસ્તારમાં વરસાદના પાણી ભરાય રહે નહી અને નીકાલ થાય તેવી વ્યવસ્થા કરવી જેથી પાકને જરૂરી હવા ઉજાસ મળી રહે. તેમજ વરસાદના વધારાના વહી જતા પાણીનો ખેતતથાવી, ચેકડેમ, બોરકુવા રીચાર્જિંગથી સંગ્રહ કરવો. ખેતરની ફરતે બંધપાળા બાંધી વહુ પાણી જમીનમાં સંગ્રહ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવો.

મુખ્ય પાક	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિ સલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભવામણ કરેલ દવા છાંટવી)
ચોમાસુ મગફળી	વૃદ્ધિ	 આંતર ખેડ અને 	વહુ વરસાદના કારણે મગફળી પીળી પડી ગયેલ હોય તો ફેરસ સલ્ફેટ (હીરાકસી) ૧૦૦ ગ્રામ અને સાયટ્રીક એચીડ (લીલુના ફુલ) ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર છાંટકાવ કરવો. સફેદ કુગનો ઉપદ્રવ અટકાવવા ૨.૫ કિ. ગ્રામ/હેક્ટાર ટ્રોયકોડર્મા કુગનો પાવડર છાંટાયા ખાતરમાં મીશ્ર કરી ચાસમાં ભેજ હોય ત્યારે વેરવો અથવા ૪૦ ગ્રામ ટ્રોયકોડર્મા કુગનો પાવડર ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી જમીનમાં થડની ફરતે મુળ વિસ્તારમાં નિતારવો. આગોત્તર વાવેતર કરેલ મગફળીમાં પાનના ટપકાના રોગના આગોત્તરા નિયંત્રણ માટે ડેકાંકોનાંગોલ ૧૫ મી.લી. અથવા ટેબ્યુકોનાંગોલ ૧૦ મી.લી. નો અને મોલોના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ ટકા ૫ મી.લી. નો છાંટકાવ વરાપ હોય ત્યારે કરવો.
કપાસ	વૃદ્ધિ	આંતર ખેડ અને નિંદામણ	આગોત્તર વાવેતર કરેલ કપાસમાં યુરિયા ૨૫ કિ.ગ્રા. અને એમોનિયમ સલ્ફેટ ખાતર ૨૫ કિ.ગ્રા./હેક્ટાર ભેજ હોય ત્યારે આપવુ.
તાંક	વૃદ્ધિ	પાન વાળનારી ઈયણ	આંતર ખેડ, પારવણી અને નિંદામણ કરવુ. તેમજ પાન વાળનારી ઈયણના નિયંત્રણ માટે કવીનાલફોસ ૨૦ મીલી અથવા ડિડીવીપી ૭ મીલી નો છાંટકાવ વરાપ હોય ત્યારે કરવો.
બાજરી	વૃદ્ધિ	આંતર ખેડ, પારવણી અને નિંદામણ કરવુ	
કઠોળ પાકો	વૃદ્ધિ	આંતર ખેડ, પારવણી અને નિંદામણ કરવુ	
એરંડા	વૃદ્ધિ /ઉગાવો	ઘોડીયા અને લીલી ઈયણ	તેના નિયંત્રણ માટે કવીનાલફોસ ૨૦ મીલી ૧૦ લી પાણીમાં મિશ્ર કરી છાંટકાવ કરવો.

	/વાવેતર	ઓરંડા જીઅયુસીઅચ્-૧ , જીસીઅચ્-૪, ૬, ૭ અને જીસીઅચ્-૩ જાતો નું પ્રમાણીત બીજ જરૂર મુજબ મેળવી વાવેતર કરવુ.	
ઘાસચારાની જુવાર	વૃદ્ધિ	સાંદાની માખી	તેના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૧૦ મીલી અથવા સાયપરમેશ્વીન પ મીલી નો છંટકાવ વરાપ હોય ત્યારે કરવો.
શાકભાજી	ધર(રોપ) ઉછેર /રોપણી	ધરુવાડિયામાં ધરુનો કોહવારો અઠકાવવા ૫૦ ગ્રામ મોરથુથ અને ૫૦ ગ્રામ ચુનો લઈ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી ૦.૬ ટકાનું મિશ્રણ તૈયાર કરી એક ચો.મી. ધરુવાડિયાના વિસ્તાર માટે ૨ થી ૩ લિ. પર ચો.મી. પ્રમાણે જારાથી છંટકાવ કરવો. જો રોપ/ધર તૈયાર હોય તો મરચી, ટમેટો, રીગણ અને કોખીળની રોપણી કરવી.	
રીગણી અને ટમેટી	કુલ/ફળ	સફેદ માખી દૂંખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ	<p>➢ લીલોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીલોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ટ્રોયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૧૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p> <p>➢ દૂંખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે નુકશાન થયેલ દૂંખ અને ફળને તોડીને દર અઠવારીથે નિયમીત જમીનમાં દાટી દેવા અને જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પેનોસેડ ૪૮ ઈસી ઉ મીલી /૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. દવા છંટકાવ બાદ ૮ દિવસ સુધી ફળ ઉતારવા નહીં.</p>
મરચી	કુલ/ફળ	શ્રીપસ	પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી.અને લીલોળીનું તેલ ૫૦ મીલી/૧૦ લી પાણીમાં મિશ્ર કરી અથવા લીલોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણકરી છંટકાવ કરવો. 
ભીડા	કુલ/ફળ	ચુંચીયા તથા દૂંખ અનેફળ કોરી ખાનાર ઈયળ—	દૂંખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે નુકશાન થયેલ દૂંખ અને ફળને તોડીને જમીનમાં દાટી દેવા અનેલીલોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ અથવા લીલોળીનું તેલ ૫૦ મીલી/૧૦ લી અને ઈથીયેન દવા ૨૦ મી.લી. પાણીમાં મિશ્રનો છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે ચાર વખત કરવો.
ગુવાર	વૃદ્ધિ/કુલ /શીંગ	શ્રીપસ, સફેદ માખી	➢ તેના નિયંત્રણ માટે એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા પ ગ્રામ અને લીલોળીનું તેલ ૫૦ મીલી /૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી અથવા લીલોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.
વેલાવાળા શાકભાજી	વૃદ્ધિ/ કુલ	પાન કોરીયુ શ્રીપસ, સફેદ માખી— તળાધારો —	તેના નિયંત્રણ માટે એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા પ ગ્રામ અને લીલોળીનું તેલ ૫૦ મીલી /૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી અથવા લીલોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો. મેન્કોરેન ૨૭ ગ્રામ અથવા કલોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોરેટાઇલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ દિવસના અંતરે નષ્ટ છંટકાવ કરવા.
સીતાફળ	વૃદ્ધિ/ કુલ અને ફળ બંધાવવા	કુલનું ખરણ	સીતાફળમાં કુલનું ખરણ અને વધુ ફળ બંધાવવા માટે ૩૦ પીપીઅેમ નેથેલીન એસીટીક એસીડ (૩ ગ્રામ ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળવુ) ના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.
પશુ/મરધા	પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેશ્વીન અથવા એમીટાળ ૨ મી.લી. એક લિટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. કરયિમયાની દવા તથા ઉછરતા પશુઓમાં બુસેલ્વા કાફ્ફુડનું રસીકરણ કરવુ. કરયિમયાની દવા આપવી. વરસાદના સમયે પશુઓને સુરક્ષિત જગ્યાએ રાખવા. ચોમાસા દરમ્યાન		



જાનવરોની રહેઠાણની જગ્યાની વ્યવસ્થિત સફાઈ રાખવી તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફિનાઈલ છાંટવું.

જા.ન.જુ.કૃ.યુ/ સંવૈ(સૂખે)/એગ્રોમેટ/બુલેટીન/ /૨૦૧૪
તરઘડીયા (રાજકોટ). તારીખ: ૦૫-૦૮-૨૦૧૪

પ્રતિ,
તંગીશ્રી/ ડાયરેક્ટરશ્રી,
રાજકોટ.

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દેનિક સમાચાર પત્રોમાં, રેડિયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિદ્ધ કરવા નમ વિનંતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (સૂકી ખેતી)
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
તરઘડીયા



**Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
Targhadia (Rajkot) - 360 003
Phone: (0281)2784260(O), 2331686(R)
Fax : (0281)2784722, Cell :94277 28523**



Agro met Advisory Service bulletin no.-37 for the Rajkot district

(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department)
(Period 6th To 10th August- 2014)

Significant past weather for the preceding week of Rajkot

Rainfall (mm)	23.1
Maximum temperature (°C)	30.0-32.5
Minimum temperature (°C)	25-25.2
Relative Humidity (%) I	85-92
Relative Humidity (%) II	82-87
Wind speed (Kmph)	7.5-10.5

Weather forecast until 08-30 hrs of 10/08/2014

(1) RAJKOT DISTRICT:

	06/08/14	07/08/14	08/08/14	09/08/14	10/08/14
Rainfall (mm)	3	8	6	5	7
Max.Temp.(°C)	31	31	31	32	32
Min.Temp.(°C)	25	24	24	24	24
Total CC (octa)	6	6	5	4	4
RH-I (%)	86	86	85	84	83
RH-II (%)	73	68	64	62	62
Wind Speed (kmph)	24	22	21	21	21
Wind Direction(deg.)	250	240	230	230	230

Agro meteorological Advisories:

General Advice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rain fall: Light (1-10) mm rainfall and partly to generally cloudy weather forecasted for the next five days. Total 45 mm rain fall forecasted. ➤ Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-32°C and 24-25°C, respectively. ➤ Relative Humidity: The RH is likely to be in the range of 62-86 % ➤ Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be SW, W and 21-24 km/h, respectively. ➤ Interculturing and weeding should be done at vapsa condition. ➤ Remove excess water from field to facilitate root growth, harvest and store it in reservoir. 			
Crops	Stage	Insect/Pest/Variety	Advisory	
Kharif groundnut	Growth	Yellowing	Yellowing due to excess rain spray ferrous sulphate 100 gram and 10 ml citric acid in 10 liters of water.	

			Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungi powder mixing in well decompost FYM or with castor cake or by drenching 40 gm powder in 10 litres of water to prevent infestation of sclerotium rolfsii (white fungi). For prevention of leaf spot disease spray Hexzaconazole 10 ml OR Tebuconazole 10 ml and for control of aphid spray imidacloprid 17.8 % 5 ml in 10 liters of water when there is no rain in premonsoon sown groundnut .
Cotton	Growth		Apply urea 25 kg and ammonium sulphate fertilizer 25 kg/ha to premonsoon sown cotton crop..
Sesame	Growth		To control damage of Leaf webber in sesame spray DDVP 7 ml or QUINALPHOS 20 ml in 10 liters of water.
Pearl millet	Growth	-	-
Pulses	Growth	-	-
Castor	Sowing/ Germination /growing	GAUCH-1,GC-3, GCH-4, GCH-6, GCH-7. Semi looper and Heliothis	To control damage of Semi looper and heliothis in castor spray QUINALPHOS 20 ml in 10 liters of water. 
Fodder Sorghum & Maize	Growing	Shoot fly	To control damage of shoot fly in sorghum spray Dimethoate 10 ml or cypermethrin 25 EC 5 ml in 10 liters of water.
Vegetables	Transplantin g	Carry out transplanting of seedling of brinjal, chili, tomato, cabbage etc. under drizzling rain.	
Lady finger	Flowering /fruiting	Sucking pest thrips, white fly & Shoot and fruit borer	To control them spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and Trizophos 40 % EC@ 20 gm/10 lit of water at 15 days interval. Collect damaged fruits and buried deep in soil.

Ridge gourd/ Bottle gourd/ Sponge gourd / Bitter gourd	Flowering	Leaf minor, white fly Downy mildew & Alternaria blight 	Sparyneem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval(4 spray) or Thiomethoxam 25 WG@ 3.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. Alternate three spray of Mancozeb 27 g or chlorothalonil 27 g or fosatyl 20 g/10 lit of water at 15 days interval. 
Brinjal	Flowering/ fruiting	Sucking pest & Fruit borer	To control them spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and 20 ml Trizophos in 10 liters of water at 15 days interval. Collect damaged fruits and buried deep in soil. If pest population is high, spraying of renaxypyre @ 3 ml /10 liters of water is advised when sky will be clear.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips →  	In present weather conditions severe attack of thrips has been reported. Spray 20 ml Ethion in 20 litres of water.
Custard apple	Flowering and fruir setting	Dropping of Flower	Spray 30 ppm naphthalene acetic acid (3 gm in 100 liters of water) for prevention of dropping of flower.
Livestock & poultry 			Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/liters of water for the control of tick. Deworming, , Brucellosis calfwood vaccination should be done. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Ensure regarding vaccination of animals for different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly's and mosquitoes.

GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia



**Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
Targhadia (Rajkot) - 360 003
Phone: (0281)2784260(O), 2331686(R)
Fax : (0281)2784722, Cell :94277 28523**



Agro met Advisory Service bulletin for the Jamnagar district

(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department)

(Period 6th to 10th August- 2014)

Weather forecast until 08-30 hrs of 10/08/2014

(2) JAMNAGAR DISTRICT:

	06/08/14	07/08/14	08/08/14	09/08/14	10/08/14
Rainfall (mm)	0	5	3	3	3
Max.Temp.(°C)	30	30	30	31	31
Min.Temp.(°C)	25	25	25	25	25
Total CC (octa)	7	6	4	5	4
RH-I (%)	84	85	83	83	82
RH-II (%)	74	71	68	67	67
Wind Speed (kmph)	25	25	24	25	24
Wind Direction(deg.)	240	240	230	230	230

Agro meteorological Advisories:-

General Advice	<p>➤ Rain fall: Light (1-10 mm) rainfall (11-28 mm)and partly to generally cloudy weather forecasted for the next five days.</p> <p>➤ Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-31 and 25-25°C, respectively.</p> <p>➤ Relative Humidity: The RH is likely to be in the range of 67-85 %</p> <p>➤ Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be SW and 24-25 km/h, respectively.</p> <p>➤ Interculturing and weeding should be done at vapsa condition. Thinning should be done in pulses, sesame and pearl millet crops at proper stage and in time.</p> <p>➤ Remove excess water from field, harvest and store it in reservoir.</p>
-----------------------	--

Crops	Stage	Insect/Pest/Variety	Advisory
Kharif groundnut	Growth	Yellowing 	<p>Yellowing due to excess rain spray ferrous sulphate 100 gram and 10 ml citric acid in 10 liters of water.</p> <p>Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungi powder mixing in well decompost FYM or with castor cake or by drenching 40 gm powder in 10 litres of water to prevent infestation of sclerotium rolfsii (white fungi).</p> <p>For prevention of leaf spot disease spray Hexzaconazole 10 ml OR Tebuconazole 10 ml and for control of aphid spray imidacloprid</p>

			17.8 % 5 ml in 10 liters of water when there is no rain in premonsoon sown groundnut .
Cotton	Growth		Apply urea 25 kg and ammonium sulphate fertilizer 25 kg/ha to premonsoon sown cotton crop..
Sesame	Growth		To control damage of Leaf webber in sesame spray DDVP 7 ml or QUINALPHOS 20 ml in 10 liters of water.
Pearl millet	Growth	-	-
Pulses	Growth	-	-
Castor	Sowing/Germination/growing	GAUCH-1,GC-3, GCH-4, GCH-6, GCH-7. Semi looper and Heliothis	To control damage of Semi looper and heliothis in castor spray QUINALPHOS 20 ml in 10 liters of water. 
Fodder Sorghum & Maize	Growing	Shoot fly	To control damage of shoot fly in sorghum spray Dimethoate 10 ml or cypermethrin 25 EC 5 ml in 10 liters of water.
Vegetables	Transplanting	Carry out transplanting of seedling of brinjal, chili, tomato, cabbage etc. under drizzling rain.	
Lady finger	Flowering/fruiting	Sucking pest thrips, white fly & Shoot and fruit borer	To control them spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and Trizophos 40 % EC@ 20 gm/10 lit of water at 15 days interval. Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Ridge gourd/ Bottle gourd/ Sponge gourd / Bitter gourd	Flowering	Leaf minor, white fly Downy mildew &Alternaria blight 	Sparyneem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval(4 spray) or Thiomethoxam 25 WG@ 3.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. Alternate three spray of Mancozeb 27 g or chlorothalonil 27 g or fosatyl 20 g/10 lit of water at 15 days interval. 

Brinjal	Flowering / fruiting	Sucking pest & Fruit borer	To control them spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and 20 ml Trizophos in 10 liters of water at 15 days interval. Collect damaged fruits and buried deep in soil. If pest population is high, spraying of renaxypyre @ 3 ml /10 liters of water is advised when sky will be clear.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips → 	In present weather conditions severe attack of thrips has been reported. Spray 20 ml Ethion in 20 litres of water.
Custard apple	Flowering and fruit setting	Dropping of Flower	Spray 30 ppm naphthalene acetic acid (3 gm in 100 liters of water) for prevention of dropping of flower.
Livestock & poultry 			Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/liters of water for the control of tick. Deworming, , Brucellosis calfwood vaccination should be done. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Ensure regarding vaccination of animals for different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly's and mosquitoes.

GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia



**Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
Targhadia (Rajkot) - 360 003**
Phone: (0281)2784260(O), 2331686(R)
Fax : (0281)2784722, Cell :94277 28523



Agro met Advisory Service bulletin for the Amreli district

(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department)
(Period 6th to 10th August- 2014)

Weather forecast until 08-30 hrs of 10/08/2014

(3) AMRELI DISTRICT:

	06/08/14	07/08/14	08/08/14	09/08/14	10/08/14
Rainfall (mm)	3	8	6	0	0
Max.Temp.(°C)	30	30	30	31	31
Min.Temp.(°C)	25	24	24	24	24
Total CC (octa)	6	6	4	4	5
RH-I (%)	86	86	84	83	83
RH-II (%)	74	69	63	61	62
Wind Speed (kmph)	24	22	20	19	20
Wind Direction(deg.)	250	230	230	230	230

Agro meteorological Advisories:

General Advice	<p>➤ Rain fall: Light RAIN FALL (1-8 mm) and partly to generally cloudy weather forecasted for the next five days.</p> <p>➤ Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-31°C and 24-25°C, respectively.</p> <p>➤ Relative Humidity: The RH is likely to be in the range of 61-86 %</p> <p>➤ Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be SW,W and 20-23 km/h, respectively.</p> <p>➤ Interculturing and weeding should be done at vapsa condition. Thinning should be done in pulses, sesame and pearl millet crops at proper stage and in time.</p> <p>➤ Remove excess water from field, harvest and store it in reservoir.</p>
-----------------------	--

Crops	Stage	Insect/Pest/Variety	Advisory
Kharif groundnut	Growth	Yellowing	<p>Yellowing due to excess rain spray ferrous sulphate 100 gram and 10 ml citric acid in 10 liters of water.</p> <p>Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungi powder mixing in well decompost FYM or with castor cake or by drenching 40 gm powder in 10 litres of water to prevent infestation of sclerotium rolfsii (white fungi).</p> <p>For prevention of leaf spot disease spray Hexaconazole 10 ml OR Tebuconazole 10 ml and for control of aphid spray imidacloprid 17.8 % 5 ml in 10 liters of water when there is no rain in premonsoon sown groundnut .</p> 

Cotton	Growth		Apply urea 25 kg and ammonium sulphate fertilizer 25 kg/ha to premonsoon sown cotton crop..
Sesame	Growth	Leaf webber 	To control damage of Leaf webber in sesame spray DDVP 7 ml or QUINALPHOS 20 ml in 10 liters of water.
Pearl millet	Growth	-	-
Pulses	Growth	-	-
Castor	Sowing/ Germination/growing	GAUCH-1,GC-3, GCH-4, GCH-6, GCH-7. Semi looper and Heliothis	To control damage of Semi looper and heliothis in castor spray QUINALPHOS 20 ml in 10 liters of water. 
Fodder Sorghum & Maize	Growing	Shoot fly	To control damage of shoot fly in sorghum spray Dimethoate 10 ml or cypermethrin 25 EC 5 ml in 10 liters of water.
Vegetables	Transplanting	Carry out transplanting of seedling of brinjal, chili, tomato, cabbage etc. under drizzling rain.	
Lady finger	Flowering /fruiting	Sucking pest thrips, white fly & Shoot and fruit borer	To control them spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and Trizophos 40 % EC@ 20 gm/10 lit of water at 15 days interval. Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Ridge gourd/ Bottle gourd/ Sponge gourd / Bitter gourd	Flowering	Leaf minor, white fly Downy mildew &Alternaria blight 	Sparyneem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval(4 spray) or Thiomethoxam 25 WG@ 3.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. Alternate three spray of Mancozeb 27 g or chlorothalonil 27 g or fosatyl 20 g/10 lit of water at 15 days interval. 

Brinjal	Flowering/ fruiting	Sucking pest & Fruit borer	To control them spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and 20 ml Trizophos in 10 liters of water at 15 days interval. Collect damaged fruits and buried deep in soil. If pest population is high, spraying of renaxypyre @ 3 ml /10 liters of water is advised when sky will be clear.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips → 	In present weather conditions severe attack of thrips has been reported. Spray 20 ml Ethion in 20 litres of water.
Custard apple	Flowering and fruit setting	Dropping of Flower	Spray 30 ppm naphthalene acetic acid (3 gm in 100 liters of water) for prevention of dropping of flower.
Livestock & poultry 			Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/liters of water for the control of tick. Deworming, , Brucellosis calfwood vaccination should be done. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Ensure regarding vaccination of animals for different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly's and mosquitoes.

GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia



**Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
Targhadia (Rajkot) - 360 003
Phone: (0281)2784260(O), 2331686(R)
Fax : (0281)2784722, Cell :94277 28523**



Agro met Advisory Service bulletin for the Surendranagar district

(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department)
(Period 6th to 10th August- 2014)

Weather forecast until 08-30 hrs of 10/08/2014

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	06/08/14	07/08/14	08/08/14	09/08/14	10/08/14
Rainfall (mm)	3	12	0	0	0
Max.Temp.(°C)	31	31	31	31	32
Min.Temp.(°C)	24	24	25	25	25
Total CC (octa)	7	6	5	4	3
RH-I (%)	84	86	83	81	80
RH-II (%)	66	69	57	56	54
Wind Speed (kmph)	20	19	18	18	19
Wind Direction(deg.)	250	230	220	220	230

Agro meteorological Advisories:

General Advice	<p>➤ Rain fall: Light (1-10 mm) rainfall and partly to generally cloudy weather forecasted for the next five days.</p> <p>➤ Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-32°C and 24-25°C, respectively.</p> <p>➤ Relative Humidity: The RH is likely to be in the range of 54-86 %</p> <p>➤ Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to SW,W and 19-20 km/h, respectively.</p> <p>➤ Interculturing and weeding should be done at vapsa condition. Thinning should be done in pulses, sesame and pearl millet crops at proper stage and in time.</p> <p>➤ Remove excess water from field, harvest and store it in reservoir.</p>
-----------------------	---

Crops	Stage	Insect/Pest/Variety	Advisory
Kharif groundnut	Growth	Yellowing 	Yellowing due to excess rain spray ferrous sulphate 100 gram and 10 ml citric acid in 10 liters of water. Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungi powder mixing in well decompost FYM or with castor cake or by drenching 40 gm powder in 10 litres of water to prevent infestation of sclerotium rolfsii (white fungi). For prevention of leaf spot disease spray Hexaconazole 10 ml OR Tebuconazole 10 ml and for control of aphid spray imidacloprid 17.8 % 5 ml in 10 liters of water when there is

			no rain in premonsoon sown groundnut .
Cotton	Growth		Apply urea 25 kg and ammonium sulphate fertilizer 25 kg/ha to premonsoon sown cotton crop..
Sesame	Growth		To control damage of Leaf webber in sesame spray DDVP 7 ml or QUINALPHOS 20 ml in 10 liters of water.
Pearl millet	Growth	-	-
Pulses	Growth	-	-
Castor	Sowing/Germination/growing	GAUCH-1,GC-3, GCH-4, GCH-6, GCH-7. Semi looper and Heliothis	To control damage of Semi looper and heliothis in castor spray QUINALPHOS 20 ml in 10 liters of water. 
Fodder Sorghum & Maize	Growing	Shoot fly	To control damage of shoot fly in sorghum spray Dimethoate 10 ml or cypermethrin 25 EC 5 ml in 10 liters of water.
Vegetables	Transplanting	Carry out transplanting of seedling of brinjal, chili, tomato, cabbage etc. under drizzling rain.	
Lady finger	Flowering /fruiting	Sucking pest thrips, white fly & Shoot and fruit borer	To control them spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and Trizophos 40 % EC@ 20 gm/10 lit of water at 15 days interval. Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Ridge gourd/ Bottle gourd/ Sponge gourd / Bitter gourd	Flowering	Leaf minor, white fly Downy mildew &Alternaria blight	Sparyneem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval(4 spray) or Thiomethoxam 25 WG@ 3.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. Alternate three spray of Mancozeb 27 g or chlorothalonil 27 g or fosatyl 20 g/10 lit of water at 15 days interval. 

			
Brinjal	Flowering/ fruiting	Sucking pest & Fruit borer	To control them spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and 20 ml Trizophos in 10 liters of water at 15 days interval. Collect damaged fruits and buried deep in soil. If pest population is high, spraying of renaxypyre @ 3 ml /10 liters of water is advised when sky will be clear.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips → 	In present weather conditions severe attack of thrips has been reported. Spray 20 ml Ethion in 20 litres of water.
Custard apple	Flowering and fruir setting	Dropping of Flower	Spray 30 ppm naphthalene acetic acid (3 gm in 100 liters of water) for prevention of dropping of flower.
Livestock & poultry	 Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/liters of water for the control of tick. Deworming, , Brucellosis calfwood vaccination should be done. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Ensure regarding vaccination of animals for different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly's and mosquitoes.		

GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia