



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમસેવા
 હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
 ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતરાભોહવાકીય વિભાગ
 જુનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી, તરદદિયા-૩૬૦૦૦૨૩
 મો.નં. ૮૪૨૬૬૩૮૨૩૫
 તા. ૧૨-૦૧-૨૦૨૨ થી તા. ૧૬-૦૧-૨૦૨૨



(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સૂકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જી.ક્રિ.યુ., તરદદિયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)
 ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓનું કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૮૧/૨૦૨૧

પાછળા અઠવાડીયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિષ્ઠળો	
વરસાદ(મી.મી)	૦.૦
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૨૨.૪-૨૪.૮
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૬.૪-૧૩.૨
ભેજ (%)સવાર	૮૦-૯૩
ભેજ (%)બપોરબાદ	૪૭-૬૯
પવનનીગતિ (કિમી/કલાક)	૧.૩-૨.૧

હવામાન આગાહી :પત્રક-૫

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતરાભોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી ૧૬-૦૧-૨૦૨૨ સવારના ૮.૩૦ સુધી

તા. ૧૨-૦૧-૨૦૨૨ થી ૧૬-૦૧-૨૦૨૨

કૃષિસલાહ :

- ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ ફૃષ્ટી મૌસમ સેવા વિભાગ ,જુનાગઢ ફૃષ્ટી યુનિવર્સિટી ,તરધડીયા તરફથી જાણાવવામાં આવેછે કે ,ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

રાજકોટ :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૨-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૩-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન(સે.ગ્રે)	24	25	25	26	27
લઘુત્વમાન(સે.ગ્રે)	10	10	11	11	11
મહત્વમાન (%) સવાર	50	47	45	50	53
લઘુત્વમાન (%) બપોરબાદ	23	23	23	26	27
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	21	19	20	19	18
પવનની દિશા(ડીગ્રી)	22	32	22	45	45
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	0	0	0	0	0

- રાજકોટ જીલ્લામાં અગામી તા.૧૨-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૧૬-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડ અને ચોખ્યું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન **૨૪-૨૭** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્વમાન રાત્રી દરમ્યાન **૧૦-૧૧** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્વમાન ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે **૪૫-૫૩** અને **૨૩-૨૭** ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા **ઉત્તર** અને ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૮ થી ૨૧ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે

મોરબી:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૨-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૩-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન(સે.ગ્રે)	24	25	25	26	27
લઘુત્વમાન(સે.ગ્રે)	10	10	11	11	11
મહત્વમાન (%) સવાર	53	47	49	52	58
લઘુત્વમાન (%) બપોરબાદ	28	27	25	28	29
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	21	18	19	18	18
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	22	25	25	56	56
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	0	1	0	0	0
• મોરબી જીલ્લામાં અગામી તા.૧૨-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૧૬-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડ અને ચોખ્યું					

હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.

- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૪-૨૭ ડિગ્રી સેલ્ચીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૦-૧૧ ડિગ્રી સેલ્ચીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ બેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૪૭-૫૮ અને ૨૫-૨૮ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા ઉત્તર અને ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૮ થી ૨૧ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

દેવભૂમિદ્વારકા:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૨-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૩-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	24	24	25	26	27
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	13	13	13	14	15
મહત્વમાન બેજ (%) સવાર	54	49	50	53	54
લઘુત્તમ બેજ (%) બપોરબાદ	36	34	31	32	34
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	25	24	25	24	24
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	22	22	22	27	45
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	0	0	0	0	0

- દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં અગામી તા. ૧૨-૦૧-૨૦૨૨ થી તા. ૧૬-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડુ અને ચોખ્યું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૪-૨૭ ડિગ્રી સેલ્ચીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૩-૧૫ ડિગ્રી સેલ્ચીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ બેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૪૮-૫૪ અને ૩૧-૩૬ રહેશે.
- પવનની દિશા ઉત્તર અને ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૨૪ થી ૨૫ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

સુરેન્દ્રનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૨-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૩-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	24	25	25	26	27
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	9	9	9	10	11
મહત્વમાન બેજ (%) સવાર	52	47	50	52	60
લઘુત્તમ બેજ (%) બપોરબાદ	27	27	27	32	31

પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	21	18	19	18	17
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	22	28	45	45	64
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	0	1	0	0	0
• સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં અગામી તા.૧૨-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૧૬-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડુ અને ચોઘ્યું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.					
• આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૪-૨૭ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લધુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૮-૧૧ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.					
• આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લધુતમ લેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૪૭-૬૦ અને ૨૭-૩૨ રહેશે.					
• પવનની દિશા ઉત્તર અને ઇશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૭-૨૧ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.					

અમરેલી :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૨-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૩-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	24	24	25	26	27
લધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	10	10	11	11	12
મહત્વમાન ભેજ (%)સવાર	47	45	45	51	54
લધુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	26	25	28	29	30
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	21	19	19	18	18
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	25	22	25	25	32
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	0	0	0	0	0

- અમરેલી જીલ્લામાં અગામી તા.૧૨-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૧૬-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડુ અને ચોઘ્યું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન **૨૪-૨૭** ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લધુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન **૧૦-૧૨** ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લધુતમ લેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે **૪૫-૫૪** અને **૨૫-૩૦** રહેશે.
- પવનની દિશા **ઇશાન** અને **ઉત્તરની** રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૧૮** થી **૨૧** કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

જીમનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૨-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૩-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	26	26	26	27	27
લધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	11	11	12	13	14

મહત્વ ભેજ (%) સવાર	53	48	49	51	51
લઘુત્વ ભેજ (%) બપોરબાદ	29	28	26	27	29
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	24	22	23	22	21
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	22	24	22	24	32
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	0	0	0	0	0

- જામનગર જીલ્લામાં અગામી તા. ૧૨-૦૧-૨૦૨૨ થી તા. ૧૬-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડુ અને ચોખ્યું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૬-૨૭ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્વ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૧-૧૪ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્વમાન ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૪૮-૫૩ અને ૨૬-૨૮ રહેશે.
- પવનની દિશા ઉત્તર અને ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૨૧ થી ૧૪ કોમી/કલા રહેવાની શક્યતા છે.
- કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા એતીકાર્યો અને એતપેદાશના વેચાણ અને બીજ, ખાતર અને દવાઓની ખરીદી દરમ્યાન મોં પર કપડું (માસ્ક) બાંધી રાખવું અને બે વ્યક્તિ વચ્ચે ૬ થી ૭ ફૂટ અંતર જાળવવું.
- પ્રવર્તમાન ઠંડા હવામાનના કારણે શિયાળું શાકભાજુ અને એત પાકોને હિમની અસર થાય નહિ તે માટે સાંજના સમયે પિયત આપવું.
- તા. ૧૬ થી ૨૧-જાન્યુઆરી-૨૦૨૨: હવામાન આગોતર વરતારો : તા. ૧૬ થી ૨૧-જાન્યુઆરી-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડુ અને મોટા ભાગે ચોખ્યું રહેવાની સંભાવના છે.

હવામાન ચેતવણી: નથી

- મોબાઇલ સેટેશન:** ચણાના પાકમાં લીલી અને લશકરી ઈયળના કુદરતી નિયંત્રણ માટે પક્ષીઓને બેસવા માટે 'T' આકારના બેલાખડા મુકવા.

મુખ્યપાક	પાકઅવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	ફુષિસલાઈ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી)
લસણ	વૃદ્ધ/વિકાસ	પાનનો સુકારો પીળિયો 	<ul style="list-style-type: none"> લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગ આવે નહિ તે માટે વધુ પડતું પિયત આપવું નહિ. લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગના નિયંત્રણ માટે એઝોક્ષ્યિસ્ટ્રોબીન ૧૧.૪ ટકા + ટેબ્યુંકોનાઝોલ ૧૮.૩ ટકા એસ.સી. ૧૦ મીલી/૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છાંટવી. લસણના પાકમાં શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોક્લોસ ૨૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

		શ્રીપ્સ		
ચણા	કૂલ અને પોપટા અવસ્થા	લીલી/લશ્કરી ઈયળ 	<ul style="list-style-type: none"> ચણાના પાકમાં લીલી અને લશ્કરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે પક્ષીઓને બેસવા માટે 'T' આકારના બેલાખડા મુકવા. જો વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો સ્પીનોસાએ ૪૫ એસ.સી ૪ મિલી અથવા ઇન્ડોક્ઝાકાર્બ ૭ મિલિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. તેમજ લીબોળીનું તેલ પ૦મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં કરીને છંટકાવ કરવો. કૂલ અને પોપટા બંધાવાની અવસ્થાએ પિયત આપવું. ચણામાં સ્ટેટ રોગનો ઉપદ્રવ ફેલાય નહિ તે માટે ચુસીયા જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા છસી ૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 	
રાયડો	કૂલ/શીંગ બેસવી	મોલો, શ્રીપ્સ	<ul style="list-style-type: none"> ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોકઝામ ૨૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીબોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. રાયડામાં ભુકીછારો/રાખોડી અને તળછારોના નિયંત્રણ માટે હેકઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંકાવ કરવો. 	
ધાણા	કાળી અને કૂલ	મોલો, શ્રીપ્સ	<ul style="list-style-type: none"> ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોકઝામ ૨૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીબોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ધાણાના પાકમાં ભુકીછારો/રાખોડી અને કાળી ચરમી નો ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે હેકઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ધાણાનો વધુ પડતો વાનસ્પતિક વિકાસ ના થાય તે માટે પિયત નિયંત્રિત આપવું. 	

જીરું	વૃક્ષ	મોલો, શ્રીપ્સ ભૂકી છારો અને કાળી ચરમી	<ul style="list-style-type: none"> ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોકઝામ રૂપ ટકા મમરી પ ગ્રામ સાથે લીંબોળીનું તેલ પોભિલિ અથવા લીંબોળીના મીજનું પ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. જૂમાં ભૂકી છારો અને કાળી ચાર્મિના રોગના નિયંત્રણ માટે પ્રોપીકોનાઓલ રૂપ ટકા છસી ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
ધઉ	ગાભા નીધલ અવસ્થા	-	<ul style="list-style-type: none"> ગાભા નીધલ અવસ્થાએ પિયત આપવું. ધઉમાં ગેડુના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ રૂપ ટકા વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
કપાસ	કપાસની વીણી અને સાંઠી કાઢવી	ગુલાબી ઇયળ	<p>ગુલાબી ઇયળનાં નિયંત્રણ માટે તેમજ પિયત આપવું નહિ. બીજો ફાલ લેવો નહિ. છેલ્લી વીણી પછી ઘેટા બકરા ચરાવવા. જેથી ખુલ્લા વગરના ગુલાબી ઇયળના નુકશાન વાળા જુંડવા અને અન્ય કચરો નાશ પામે. ત્યારબાદ કરાંઠી સળગાવવી નહિ પરંતુ રોટાવેટર/મોબાઇલ ચોપરથી નાના ટુકડા કરી જમીનમાં દાંટી દેવા જેથી જમીન સેન્ટ્રિય તત્વનો ઉમેરો થવાથી સુંક્ષમ જીવની સંઘાની વધશે અને જમીનના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અથવા કરાંઠી ભેગી કરી શ્રેદરથી નાના ટુકડા કરીને છાણા, યુરીયા, કમ્પોસ્ટ કલ્યર ઉમેરો દેશી(સેન્ટ્રિય) ખાતર બનાવવું.</p> 
તુવેર	શીંગ	શીંગ માખી અને શીંગ કોરીખાનાર ઇયળ	<ul style="list-style-type: none"> તુવેરમાં શીંગ માખી વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો કવીનાલફોસ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. તુવેરમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળનો વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સ્પીનોસાદ ૪ મી.લી. અથવા એમામેક્ટીન બેન્જોએટ ૭ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
દિવેલા	ડોડવા અવસ્થા	ડોડવા કોરી ખાનાર ઇયળ	<ul style="list-style-type: none"> ડોડવા કોરી ખાનાર ઇયળનો વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સ્પીનોસાદ ૪ મી.લી. અથવા એમામેક્ટીન બેન્જોએટ ૭ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. પાકી ગયેલ એરંડાની લુમો સમયસર ઉતારી લેવી.

કુંગળી	ફેર ચોપણી અને વૃદ્ધિ અવસ્થા	પર્પલ બ્લોચ અથવા જાંબલી ધાબાના  શ્રીપસ	<ul style="list-style-type: none"> કુંગળીના પાકમાં જાંબલી ધાબાના રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્જોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામના ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા. કુંગળીના પાકમાં શ્રીપસના નિયત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. વરસાદની આગાહી સમય સુધી પિયત આપવાનું મુલત્વી રાખો.
રોગણી	કુલ/ફળ	સફેદ માખી કુંખ અને → ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> રોગણી અને ટામેટોમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ડાયફેન્નાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ મિ.લી. દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં ઢાંટી દેવા અને ક્લોરાનટાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ત્રણ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
મરચી	વૃદ્ધિ/કુલ/ફળ	શ્રીપસ, સફેદ માખી  કાલવ્રણ → 	<ul style="list-style-type: none"> પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અને લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મિલી ૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. શ્રીપસનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા ૫ મિલી. પ્રતિ ૫૫ છાંટવી. કાલવ્રણ રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્જોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઇલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા.
લીધુ	-	પાન કથીરી  સાયલા અને શ્રીપસ	<ul style="list-style-type: none"> લીધુના બગીચામાં પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ વધુ હોય તો તેના નિયંત્રણ માટે પ્રોપરગાઇટ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી અને લીભોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ લિટર

			<p>પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p> 
		<p>બદામી ટપકાં પાનકોરીયુ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • બદામી ટપકાના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઇડ ૪૦ ગ્રામ અને ૧.૫ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન/૧૦ લીટર પાણીમાં બે છંટકાવ ૧૫ દિવસના ગળે કરવા. • પાનકોરીયુના નિયંત્રણ માટે ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મિલી ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાંટવી.
આંબો	કૂલ	<p>મધીયો અને મગાયાની ઈયળ</p> <p>ભુકીછારો/રાખોડી</p>	<ul style="list-style-type: none"> • આંબામાં મધીયો અને મગાયાની ઈયળના નિયંત્રણ માટે ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. • આંબામાં ભુકીછારો/રાખોડીના નિયંત્રણ માટે હેક્ઝાકોનાઓલ ૧૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

				
પશુ/ મરધા	<p>પજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટ્રાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. કરમિયાની દવા આપવી તથા ઉછરતા પશુઓમાં બૃસેલ્વા કાફ્વુંડનું રસીકરણ કરાવવું. નાના પશુઓને રાત્રી દરમ્યાન ઠંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા. પશુને દુંધ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને પ્રતિ લીટર દુધની ઊપજ હોય તેમને નિયમિત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્ત્વોનું મિશ્રણ આપવું. તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચાવા ફીનાઈલ છાંટવું.</p> <ul style="list-style-type: none"> • પશુઓને ગરમ હુંફાળું પીવાનું પાણી આપવું. • નાના પશુઓને રાત્રી દરમ્યાન ઠંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા. • મરધા ઘરમાં જરૂરી હવા ઉજાસ રાખી દીવાલ પર કંતાન અથવા પ્લાસ્ટીક કપડું બાંધવું. તેમજ ઇલેક્ટ્રીક બલ્બ ચાલુ રાખવા. 			
નોંધ	<p>નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો</p> <ul style="list-style-type: none"> • મૌસમ એપ જીલ્વા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે. • મેધદૂત એપ હવામાન આધારિત ફુષિસલાઇ બુલેટીન માટે. • દામીની એપ વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે. 			

જા.ન.જુફ્યુ/સૂ.ઘ./એગ્રોમેટ/બુલેટીન/
તરધડીયા(રાજકોટ), તારીખ:૦૭/૦૧/૨૦૨૨.


/ ૨૦૨૨,

તંત્રીશ્રી/ડાયરેક્ટરશ્રી,
રાજકોટ,

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં, રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ય કરાવવા નમ્ર વિનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

ટેકનીકલ ઓફિસર
સુકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર
જુનાગઢ ફુષિ યુનિવર્સિટી
તરધડીયા

**NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 01
(31.12.2021 to 07.01.2022) over Agricultural region**



Agricultural vigour is good over isolated pockets of the state.



**Gramin Krushi Mausam Seva
Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023**

Cell :94269 38235



Agromet Advisory Service bulletin No. 81 for North Saurashtra districts(Gujarat)

(Issued jointly by AMFU-DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)

(Period 12 to 16-January-2022)

Significant past weather for the preceding week of Rajkot

Rainfall (mm)	0.0
Maximum temperature (°C)	22.4-24.8
Minimum temperature (°C)	6.4-13.2
Relative Humidity (%) I	80-93
Relative Humidity (%) II	47-69
Wind speed (Kmph)	1.3-2.1

Weather forecast until 08-30 hrs. of 16/01/2022

(1) RAJKOT DISTRICT:

	12/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	24	25	25	26	27
Min.Temp.(°C)	10	10	11	11	11
RH-I (%)	50	47	45	50	53
RH-II (%)	23	23	23	26	27
Wind Speed (kmph)	21	19	20	19	18
Wind Direction(deg.)	22	32	22	45	45
Total CC (octa)	0	0	0	0	0
• Rainfall:	Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.				

- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 24-27°C and 10-11°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 45-53 % & 23-27, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be N, NE and 18-21 km/h, respectively.

(2) MORBI DISTRICT:

	12/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	24	25	25	26	27
Min.Temp.(°C)	10	10	11	11	11
RH-I (%)	53	47	49	52	58
RH-II (%)	28	27	25	28	29
Wind Speed (kmph)	21	18	19	18	18
Wind Direction(deg.)	22	25	25	56	56
Total CC (octa)	0	1	0	0	0

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 24-27°C and 10-11°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 47-58 % & 25-29, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be N, NE and 18-21 km/h, respectively.

(3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	12/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	24	24	25	26	27
Min.Temp.(°C)	13	13	13	14	15
RH-I (%)	54	49	50	53	54
RH-II (%)	36	34	31	32	34
Wind Speed (kmph)	25	24	25	24	24
Wind Direction(deg.)	22	22	22	27	45
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 24-27°C and 13-15°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 49-54 % & 31-36, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be N, NE and 24-25 km/h, respectively.

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	12/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	24	25	25	26	27
Min.Temp.(°C)	9	9	9	10	11
RH-I (%)	52	47	50	52	60
RH-II (%)	27	27	27	32	31
Wind Speed (kmph)	21	18	19	18	17
Wind Direction(deg.)	22	28	45	45	64
Total CC (octa)	0	1	0	0	0

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 24-27°C and 9-11°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 47-60 % & 27-32, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be N, NE and 17-21 km/h, respectively.

(5) AMRELI DISTRICT:

	12/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	24	24	25	26	27
Min.Temp.(°C)	10	10	11	11	12
RH-I (%)	47	45	45	51	54
RH-II (%)	26	25	28	29	30
Wind Speed (kmph)	21	19	19	18	18
Wind Direction(deg.)	25	22	25	25	32
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 24-27°C and 10-12°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 45-54 % & 25-30, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, N and 18-21 km/h, respectively.

(6) JAMNAGAR DISTRICT:

	12/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	26	26	26	27	27
Min.Temp.(°C)	11	11	12	13	14
RH-I (%)	53	48	49	51	51
RH-II (%)	29	28	26	27	29
Wind Speed (kmph)	24	22	23	22	21
Wind Direction(deg.)	22	24	22	24	32
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 26-27°C and 11-14°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 48-53 % & 26-29, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be N, NE and 21-24 km/h, respectively.

Agro meteorological Advisories:

General Advice	<p>Keeping in view of threat of COVID-19 spread farmers are advised to follow the government guidelines, personal hygiene, use mask, ensure hand washing with soap at reasonable interval, social distancing of 6 feet during harvesting and other agricultural operation in all crops.</p> <p>Due to prevailing cold weather apply irrigation during evening hours to protect the crops & vegetables from chilling injury.</p> <p>Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast dry, cool and clear weather likely to observe during 16 to 21-January-2022.</p> <p>Alerts & Warning: NIL</p> <p>Sms.: “T” shaped bird perches in and around chickpea crop field to be installed for natural controlling the insect population.</p>		
Crops	Stage	Insect/Pest/Variety	Advisory
Garlic	Growing	Alternaria leaf blight	<ul style="list-style-type: none"> • Do not over irrigate to prevent leaf blight (yellowing) disease in garlic. • To prevent blight disease incidence in garlic, Spray Azoxystrobin 11.4 % + Tebuconazole 18.3 % SC 10 ml in 10 liters of water under clear

		 Thrips	<p>weather.</p> <ul style="list-style-type: none"> Heavy infestation of thrips observed in garlic. For the control of thrips in garlic spray profenofos 20 ml in 10 lit of water under clear weather.
Chick pea	Flowering/pod formation	 Heliothis  Stunt virus	<ul style="list-style-type: none"> "T" shaped bird perches in and around crop field to be installed for natural controlling the insect population. If infestation of Heliothis found above ETL, spray Spinosad 45 SC 4 ml or Indoxacarb 7ml in 10 litres of water under clear weather. To prevent infestation of stunt virus disease in chickpea spray Imidacloprid 30.5 % EC 5 ml per 10 lit. of water under clear weather for the control of vector. To prevent blight disease infestation spray Mencozeb 75 % WP 27 gm in 10 liters of water as precautionary measure under clear sky.
Mustard	Flowering/ Pod formation	Aphid, Thrips Powdery mildew & white rust 	<ul style="list-style-type: none"> Monitor the crop for infestation of Aphid, if infestation observe above ETL then carry out spraying of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water under clear weather. Spray 15 ml hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew and white rust diseases in mustard.
Coriander	Flowering	Aphid/thrips Powdery mildew/blight	<ul style="list-style-type: none"> Monitor the crop for infestation of Aphid & thrips, if infestation observe above ETL then carry out spraying of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water under clear weather. To prevent excessive growth apply control irrigation and not to apply excess urea fertilizer in coriander. Spray 15 ml Hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew/ blight disease in

			coriander under clear weather.
Cumin	Flowering	Aphid/thrips Powdery mildew and blight	<ul style="list-style-type: none"> Monitor the crop for infestation of Aphid & thrips, if infestation observe above ETL then carry out spraying of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water under clear weather. Spray 15 ml Propiconazole 25 % EC in 10 liters of water to prevent powdery mildew and blight disease in cumin under clear weather.
Wheat	Jointing/booting/heading	-	<ul style="list-style-type: none"> To prevent rust disease incidence spray Mencozeb 75 % WP 27 gm in 10 liters of water as precautionary measure under clear sky.
Cotton	Plucking & pulling of cotton stalk	<p>Heavy attack of pink boll worm observed in cotton field. Carry out picking in time.</p> <p>Animals like goats, sheep among others, should be allowed to graze on unopened bolls and plant debris in the cotton fields after the last picking to prevent infestation of pink boll worm in subsequent year. After grazing don't burn cotton stalks but, recycle the stalk by the doing situ chopping & burying of cotton stalk in soil by mobile chopper and rotavator or make compost from the cotton residues to improve soil biomass and health.</p> 	
Pigeon pea	Pod development/Maturity	Pod fly 	<ul style="list-style-type: none"> Monitor the crop for infestation of pod fly and pod borers due to cloudy weather if infestation observed spray quinalphos or profenofos 20 ml/10 litre of water for control of pod fly and Spinosad 4 ml or emamectin benzoate 7 gm/10 litre of water for the control of pod borer complex under clear sky. Harvest the mature pods.
Castor	Capsule formation & development, maturity	Capsule borer	<ul style="list-style-type: none"> Spray Spinosad 45 SC @ 4.0 ml/ 10 lit of water. Give irrigation as per crop need under clear sky. Harvest mature spike in time to prevent shedding of mature capsule.


Onion	Transplanting	Purple Blotch Thrips	<ul style="list-style-type: none"> For the control of purple blotch in onion spray mancozeb 27 gm or Chlorothalonil 75% WP 27 gm in 10 liters of water at 15 days interval under clear sky. Heavy infestation of thrips observed in onion. For the control of thrips in onion spray profenofos 20 ml in 10 lit of water under clear sky.
Brinjal	Flowering/ fruiting	Sucking pest → Shoot &Fruit borer	<ul style="list-style-type: none"> For minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of water under clear weather condition under clear sky. In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato crops, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If insect population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole18.5 % SC 3.0 ml ml/10 litre of water under clear weather condition is advised.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips →  Anthracnose →  Leaf curling Virus → 	<ul style="list-style-type: none"> Under present weather conditions, severe attack of thrips has been reported. Spray Profenofos 20 ml with 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of heavy attack make spray of spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of water under clear sky. For the control of Anthracnose spray Mancozeb 27gm OR Chlorothalonil 27 gram OR Fosetyl 20 gm in 10 liters of water at 15 days interval under clear sky. In present weather conditions, rouging of viral infested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Hostathion 20 ml per 10 litre of water is advised for control the vector white fly under clear sky. 
Lemon	Fruit development	Psylla and thrips	

		Citrus canker Leaf minor	<ul style="list-style-type: none"> To prevent damage of psylla & thrips spray imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of water under clear sky. For the control of citrus canker spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclin1.5 gm in 10 litre of water under clear sky. Spray Imidacloprid 17.8 % SL 5 ml or Quinalphos 20 ml in 10 litres of water for control of leaf minor in lemon under clear sky.
Mango	Flowering	Blossom midge and Leaf hopper→  Powdery Mildew→ 	<ul style="list-style-type: none"> To prevent damage spray imidacloprid 5 ml/10 litres of water under clear sky. . For the control of powdery mildew in mango spray 15 ml Hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew disease in mango.
Livestock & poultry 		<p>Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. Carry out Brucella and other infectious& reproductive diseases evaluation. Spray phenyl in the animal shed to avoid flys and mosquitoes.</p> <p>Provide ad lib warm water to lactating animals. Keep young calves indoors during night time to avoid cold stress. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Provide ad lib warm water to lactating animals. Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed.</p> <ul style="list-style-type: none"> In poultry house gunny bags or plastic sheet curtains can be installed on the side walls of shed with require ventilation. Provision to switch on light bulbs in the laying hen sheds to maintain temperature. 	
Note	Kindly download <ul style="list-style-type: none"> MAUSAM App for location specific forecast & warning. 		

- [MEGHDOOT](#) App for Agromet advisory.
- [DAMINI App](#) for lighting warning.

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia.

**NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 01
(31.12.2021 to 07.01.2022) over Agricultural region**



Agricultural vigour is good over isolated pockets of the state.