



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમસેવા  
 હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
 ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતરાભોહવાકીય વિભાગ  
 જુનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી, તરદદિયા-૩૬૦૦૦૨૩  
 મો.નં. ૮૪૨૬૬૩૮૨૩૫  
 તા. ૧૪-૦૧-૨૦૨૨ થી તા. ૧૮-૦૧-૨૦૨૨



(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સૂકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જુ.ક્ર.યુ., તરદદિયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)  
 ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓનું કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૮૨/૨૦૨૧

#### પાછળા અઠવાડીયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિષ્ઠળો	
વરસાદ(મી.મી)	0.0-0.0
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	22.1-24.0
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	6.4-7.0
ભેજ (%)સવાર	80-90
ભેજ (%)બપોરબાદ	47-69
પવનનીગતિ (કિમી/કલાક)	1.3-1.9

હવામાન આગાહી :પત્રક-૫

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતરાભોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી ૧૮-૦૧-૨૦૨૨ સવારના ૮.૩૦ સુધી

તા. ૧૪-૦૧-૨૦૨૨ થી ૧૮-૦૧-૨૦૨૨

કૃષિસલાહ :

- ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ ફુલી મૌસમ સેવા વિભાગ ,જુનાગઢ ફુલી યુનિવર્સિટી ,તરધડીયા તરફથી જાણાવવામાં આવેછે કે ,ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

રાજકોટ :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૭-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૮-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન( સે.ગ્રે)	25	26	27	28	29
લઘુત્વમાન તાપમાન( સે.ગ્રે)	9	9	11	13	14
મહત્વમાન લઘુત્વમાન (%) સવાર	45	46	49	61	63
લઘુત્વમાન (%) બપોરબાદ	22	22	28	34	28
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	20	19	19	15	11
પવનની દિશા(ડીગ્રી)	32	45	58	66	225
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	0	0	0	0	1

- રાજકોટ જીલ્લામાં અગામી તા.૧૪-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૧૮-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડ અને ચોખ્યું રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન **૨૫-૨૮** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્વમાન રાત્રી દરમ્યાન **૮-૧૪** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્વમાન લેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે **૪૫-૬૩** અને **૨૨-૩૪** ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા **ઉત્તર** અને **નૈऋત્યની** રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૧૧** થી **૨૦** કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે

મોરબી:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૭-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૮-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન( સે.ગ્રે)	25	26	27	28	29
લઘુત્વમાન તાપમાન( સે.ગ્રે)	9	9	11	13	10
મહત્વમાન લઘુત્વમાન (%) સવાર	50	50	51	63	64
લઘુત્વમાન લઘુત્વમાન (%) બપોરબાદ	25	23	27	34	31
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	18	18	19	19	11
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	28	56	45	32	112
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	0	0	0	0	1

- મોરબી જીલ્લામાં અગામી તા.૧૪-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૧૮-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડ અને ચોખ્યું

રહેવાની શક્યતા છે.

- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૫-૨૬ ડિગ્રી સેલ્ચુયિસ જેટલું તેમજ લધુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૮-૧૩ ડિગ્રી સેલ્ચુયિસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લધુતમ બેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૫૦-૬૪ અને ૨૩-૩૪ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન અને પૂર્વની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૧ થી ૧૮ ક્રિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

#### દેવભૂમિદ્વારકા:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૭-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૮-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	24	25	26	27	28
લધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	13	14	15	16	16
મહત્વમાન બેજ (%) સવાર	51	52	53	61	69
લધુતમ બેજ (%) બપોરબાદ	31	30	30	41	41
પવનની ગતિ(ક્રિમી/કલાક)	24	25	25	23	11
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	27	58	58	27	45
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	0	0	0	0	0

- દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં અગામી તા. ૧૪-૦૧-૨૦૨૨ થી તા. ૧૮-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડુ અને ચોઘ્યું રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૪-૨૮ ડિગ્રી સેલ્ચુયિસ જેટલું તેમજ લધુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૩-૧૬ ડિગ્રી સેલ્ચુયિસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લધુતમ બેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૫૧-૬૮ અને ૩૦-૪૧ રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૧ થી ૨૫ ક્રિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

#### સુરેન્દ્રનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૭-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૮-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	25	26	27	28	29
લધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	9	9	11	13	14
મહત્વમાન બેજ (%) સવાર	47	49	51	63	63
લધુતમ બેજ (%) બપોરબાદ	26	26	33	39	36
પવનની ગતિ(ક્રિમી/કલાક)	18	18	18	16	11

પવનની દિશા (ડીગ્રી)	45	36	58	45	153
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	0	0	0	0	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં અગામી તા. ૧૪-૦૧-૨૦૨૨ થી તા. ૧૮-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્ણ, ઠંડુ અને ચોઘ્યું રહેવાની શક્યતા છે.</li> <li>આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન <b>૨૫-૨૬</b> ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન <b>૮-૧૪</b> ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.</li> <li>આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ લેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે <b>૪૭-૬૩</b> અને <b>૨૬-૩૮</b> રહેશે.</li> <li>પવનની દિશા ઈશાન અને અગ્રિની રહેવાની અને પવનની ઝડપ <b>૧૧-૧૮</b> કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.</li> </ul>					
વાદળની દિશા (ડીગ્રી)	0	0	0	0	0

અમરેલી :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૭-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૮-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	25	26	27	28	29
લઘુત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	10	11	12	13	13
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	42	48	53	68	73
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	27	28	33	37	33
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	20	20	18	12	11
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	24	22	32	90	288
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	0	0	0	0	0

- અમરેલી જીલ્લામાં અગામી તા. ૧૪-૦૧-૨૦૨૨ થી તા. ૧૮-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્ણ, ઠંડુ અને ચોઘ્યું રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન **૨૫-૨૬** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન **૧૦-૧૩** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ લેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે **૪૨-૭૩** અને **૨૭-૩૭** રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન, ઉત્તર, પૂર્વ અને પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૧૧** થી **૨૦** કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

જામનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૪-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૧૫-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૧૬-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૧૭-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૧૮-૦૧-૨૦૨૨
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	26	27	27	28	28
લઘુત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	12	13	14	15	15
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	49	51	50	61	66

લધુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	26	24	28	37	34
પવનની ગતિ( કિમી/કલાક)	22	22	22	19	13
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	27	32	58	58	105
વાઢળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	0	0	0	0	0

- જામનગર જીલ્લામાં અગામી તા. ૧૪-૦૧-૨૦૨૨ થી તા. ૧૮-૦૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂકું, ઠંડું અને ચોખ્યું રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન **૨૬-૨૮** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લધુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન **૧૨-૧૫** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લધુતમ બેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે **૪૮-૬૬** અને **૨૪-૩૭** રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન અને પૂર્વની રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૧૩** થી **૨૨** કિમી/કલા રહેવાની શક્યતા છે.
- કોરોના વાયરસના સંકમણને અટકાવવા એતીકાર્યો અને એતપેદાશના વેચાણ અને બીજ, ખાતર અને દવાઓની ખરીદી દરમ્યાન મોં પર કપડું (માસ્ક) બાંધી રાખવું અને બે વ્યક્તિ વચ્ચે ૬ થી ૭ ફૂટ અંતર જાળવવું.
- પ્રવર્તમાન ઠંડા હવામાનના કારણે શિયાળું શાકભાજુ અને એત પાકોને હિમની અસર થાય નહિ તે માટે સાંજના સમયે પિયત આપવું.
- તા. ૧૮ થી **૨૩-જાન્યુઆરી-૨૦૨૨**: હવામાન આગોતર વરતારો : તા. ૧૮ થી **૨૩-જાન્યુઆરી-૨૦૨૨** દરમ્યાન હવામાન સૂકું, ઠંડું અને મોટા ભાગે ચોખ્યું રહેવાની સંભાવના છે.


**હવામાન ચેતવણી:** નથી

**મોખાઈલ સેંટેશન:** અંબામાં ભુકીછારાના નિયંત્રણ માટે હેક્કાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

મુખ્યપાક	પાકઅવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિસલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી )
લસણ	વૃદ્ધ/વિકાસ	પાનનો સુકારો પીળિયો  થીપ્સ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગ આવે નહિ તે માટે વધુ પડતું પિયત આપવું નહિ.</li> <li>લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગના નિયંત્રણ માટે એઝોક્ષીસ્ટ્રોઝીન ૧૧.૪ ટકા + ટેબ્યુંકોનાઝોલ ૧૮.૩ ટકા એસ.સી. ૧૦ મિલી/૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છાંટવી.</li> <li>લસણના પાકમાં થીપ્સના નિયંત્રણ માટે લેમ્બડા સાયહેલોથીન ૧૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>

ચણા	કૂલ અને પોપટા અવસ્થા	<b>લીલી/લશ્કરી ઈયળ</b>  <b>સ્ટંટ વાઇરસ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ચણાના પાકમાં લીલી અને લશ્કરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે પક્ષીઓને બેસવા માટે 'T' આકારના બેલાખડા મુકવા. જો વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો સ્પીનોસાએ ૪૫ એસ.સી ૪ મિલી અથવા ઇન્ડોક્લાકાર્બ ૭ મિલિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>• તેમજ લીલોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીલોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>• કૂલ અને પોપટા બંધાવાની અવસ્થાએ પિયત આપવું.</li> <li>• ચણામાં સ્ટંટ રોગનો ઉપદ્રવ ફેલાય નહિ તે માટે ચુસીયા જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ઇસી ૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
રાયડો	કૂલ/શીંગ બેસવી	<b>મોલો, થ્રીપ્સ</b>  <b>ભૂકી છારો અને સફેદ ગેરુ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોક્ઝામ ૨૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીલોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીલોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>• રાયડોમાં ભૂકીછારો/રાખોડી અને તજછારોના નિયંત્રણ માટે હેકાકોનાઓલ ૧૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
ધાણા	ડાળી અને કૂલ	<b>મોલો, થ્રીપ્સ</b>  <b>રાખોડી/ભૂકી છારો અને કાળી ચરમી</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોક્ઝામ ૨૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીલોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીલોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>• ધાણાના પાકમાં ભૂકીછારો/રાખોડી અને કાળી ચરમી નો ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે હેકાકોનાઓલ ૧૫ મિલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>• ધાણાનો વધુ પડતો વાનસ્પતિક વિકાસ ના થાય તે માટે પિયત નિયંત્રિત આપવું.</li> </ul>
જુદુ	વૃક્ષી	<b>મોલો, થ્રીપ્સ</b>  <b>ભૂકી છારો અને કાળી ચરમી</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોક્ઝામ ૨૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીલોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીલોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>• જૂમાં ભૂકી છારો અને કાળી ચરમીના રોગના નિયંત્રણ માટે પ્રોપીકોનાઓલ ૨૫ ટકા ઇસી ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>

ધર્તે	કૂલ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>કૂલ અવસ્થાએ પિયત આપવું.</li> <li>ધર્તેમાં ગેરુના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ રૂપ ટકા વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
કપાસ	કપાસની વીજી અને કાઢવી સાંઠી	ગુલાબી ઇયળ ગુલાબી ઇયળનાં નિયંત્રણ માટે તેમજ પિયત આપવું નહિ. બીજી ફાલ લેવો નહિ. છેલ્લી વીજી પછી ઘેટા બકરા ચરાવવા. જેથી ખુલ્લા વગરના ગુલાબી ઇયળના નુકશાન વાળા જુંડવા અને અન્ય કચરો નાશ પામે. ત્યારબાદ કરાંઠી સણગાવવી નહિ પરંતુ રોટાવેટર/મોબાઇલ ચોપરથી નાના ટકડા કરી જમીનમાં દાંટી દેવા જેથી જમીન સેન્ટ્રિય તત્વનો ઉમેરો થવાથી સુંક્ષમ જીવોની સંઘાન વધશે અને જમીનના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અથવા કરાંઠી ભેગી કરી શ્રેદરથી નાના ટકડા કરીને છાણ, યુરીયા, કમ્પોસ્ટ કલ્યર ઉમેરી દેશી(સેન્ટ્રિય) ખાતર બનાવવું.	
તુવેર	શીંગ પરિપક્વતા	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>સમયસર પરિપક્વ શીંગોની કાપણી કરવી.</li> </ul>
દિવેલા	ડોડવા અવસ્થા	ડોડવા કોરી ખાનાર ઇયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ડોડવા કોરી ખાનાર ઇયળનો વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સ્પીનોસાદ ૪ મી.લી. અથવા એમામેક્ટોન બેન્જોએટ ૭ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>પાકી ગયેલ એરંડાની લુમો સમયસર ઉતારી લેવી.</li> </ul>
કુંગળી	ફેર રોપણી અને વૃદ્ધિ અવસ્થા	ફેર રોપણી	<ul style="list-style-type: none"> <li>કુંગળીની ફેર રોપણી કરવી. છ અઠવાડીયાથી મોટું ધરું રોપણી માટે ઉપયોગમાં લેવું નહિ. જમીન તૈયાર કરતી વાખતે હેક્ટરે ૨૦ ટન સંપૂર્ણ કોહવાયેલ છાણીયું ખાતર, ૨૫ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન (૧૨ કી.ગ્રા. યુરિઅા), ૫૦ કી.ગ્રા. ફોસ્ફોરસ (૧૦૮ કી.ગ્રા. ડી.એ.પી.) અને ૫૦ કી.ગ્રા. પોટાશ (૮૪ કી.ગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ) આપવું.</li> <li>કુંગળીના પાકમાં જંબલી ધાબાના રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા કલોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામના ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા.</li> </ul> <p>કુંગળીના પાકમાં થ્રીપ્સના નિયત્રણ માટે પ્રોફેનોફ્લોસ ૨૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>વરસાદની આગાહી સમય સુધી પિયત આપવાનું મુલત્વી રાખો.</li> </ul>

<b>રોગણી</b>	<b>કૂલ/ફળ</b>	<b>સફેદ માખી</b>  <span style="color: blue; font-size: 1.5em;">કુંઘ અને → ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ રોગણી અને ટામેટોમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ડાયફેન્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ મિ.લી. દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>➤ ફળ અને ડોકાની ઇયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં ઢાંટી દેવા અને ક્લોરાનટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
<b>મરચી</b>	<b>વૃધ્ઘા/કૂલ/ફળ</b>	<b>થ્રીપ્સ, સફેદ માખી</b>   <span style="color: blue; font-size: 1.5em;">કાલવ્રણ →</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અને લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મિલી ૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. થ્રીપ્સનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા પ મિલી. પ્રતિ પંપ છાંટવી.</li> <li>➤ કાલવ્રણ રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ર૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા.</li> </ul>
<b>લીખુ</b>	-	<b>સાયલા અને થ્રીપ્સ</b>  <span style="color: blue; font-size: 1.5em;">બદામી ટપકાં</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• તેના નિયંત્રણ માટે ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા પ મીલી અને લીભોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>• બદામી ટપકાના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઈડ ૪૦ ગ્રામ અને ૧.૫ ગ્રામ સ્ટ્રેટ્ઝોસાયક્લીન/૧૦ લીટર પાણીમાં બે છંટકાવ ૧૫ દિવસના ગળે કરવા.</li> </ul>   

		પાનકોરીયુ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• પાનકોરીયુના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મિલી ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાંટવી.</li> </ul>
આંબો	કૂલ	મધીયો અને મગીયાની ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• આંબામાં મધીયો અને મગીયાની ઈયળના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul> 
		ભુકીછારો/રાખોડી	<ul style="list-style-type: none"> <li>• આંબામાં ભુકીછારો/રાખોડીના નિયંત્રણ માટે હેકાકોનાઓલ ૧૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul> 
પશુ/મરધા	<p>પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટ્રાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. કરમિયાની દવા આપવી તથા ઉદ્ધરતા પશુઓમાં બૃસેલ્વા કાફ્વંડની ચકાસણી કરાવવી. નાના પશુઓને રાત્રી દરમ્યાન ઠંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા. પશુને દુંધ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને પ્રતિ લીટર દુધની ઉપજ હોય તેમને નિયમિત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્ત્વોનું મિશ્રણ આપવું. તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચાવવા ફીનાઈલ છાંટવું.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• પશુઓને ગરમ હુંકારું પીવાનું પાણી આપવું.</li> <li>• નાના પશુઓને રાત્રી દરમ્યાન ઠંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા.</li> <li>• મરધા ઘરમાં જરૂરી હવા ઉજાસ રાખી દીવાલ પર કંતાન અથવા પ્લાસ્ટીક કપડું બાંધવું. તેમજ ઇલેક્ટ્રીક બલ્બ ચાલુ રાખવા.</li> </ul>		
નોંધ	નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો		

- મૌસમ એપ જુલ્યા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે.
- મેધદૂત એપ હવામાન આધારિત ફુસિસલાઇ બુલેટીન માટે.
- દામીની એપ વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે.

જા.નં.જુફ્યુ/સૂ.ઘ./એગ્રોમેટ/બુલેટીન/  
તરધડીયા(રાજકોટ), તારીખ: ૧૩/૦૧/૨૦૨૨.


/ ૨૦૨૨,

તંત્રીશ્રી/ડાયરેક્ટરશ્રી,  
રાજકોટ,

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં, રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ય કરાવવા નમ્ર વિનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

ટેક્નીકલ ઓફિસર  
સુકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર  
જુનાગઢ ફુસિ યુનિવર્સિટી  
તરધડીયા

### NOAA/VIIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 01 (31.12.2021 to 07.01.2022) over Agricultural region



Agricultural vigour is good over isolated pockets of the state.



**Gramin Krushi Mausam Seva  
Main Dry Farming Research Station  
Junagadh Agricultural University  
AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023**

Cell :94269 38235



**Agromet Advisory Service bulletin No. 82 for North Saurashtra districts(Gujarat)**

**(Issued jointly by AMFU-DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)**

(Period 14 to 18-January-2022)

**Significant past weather for the preceding week of Rajkot**

Rainfall (mm)	0.0-0.0
Maximum temperature (°C )	22.1-24.0
Minimum temperature (°C )	6.4-7.0
Relative Humidity (%) I	80-90
Relative Humidity (%) II	47-69
Wind speed (Kmph)	1.3-1.9

**Weather forecast until 08-30 hrs. of 18/01/2022**

**(1) RAJKOT DISTRICT:**

	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	25	26	27	28	29
Min.Temp.(°C)	9	9	11	13	14
RH-I (%)	45	46	49	61	63
RH-II (%)	22	22	28	34	28
Wind Speed (kmph)	20	19	19	15	11
Wind Direction(deg.)	32	45	58	66	225
Total CC (octa)	0	0	0	0	1
• Rainfall:	Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.				
• Temperature:	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 25-29°C and 9-14°C, respectively.				

- Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 45-63 % & 22-34, respectively.
- Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, SW and 11-20 km/h, respectively.

## (2) MORBI DISTRICT:

	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	25	26	27	28	29
Min.Temp.(°C)	9	9	11	13	10
RH-I (%)	50	50	51	63	64
RH-II (%)	25	23	27	34	31
Wind Speed (kmph)	18	18	19	19	11
Wind Direction(deg.)	28	56	45	32	112
Total CC (octa)	0	0	0	0	1

- Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 25-29°C and 9-13°C, respectively.
- Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 50-64 % & 23-34, respectively.
- Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, E and 11-19 km/h, respectively.

## (3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	24	25	26	27	28
Min.Temp.(°C)	13	14	15	16	16
RH-I (%)	51	52	53	61	69
RH-II (%)	31	30	30	41	41
Wind Speed (kmph)	24	25	25	23	11
Wind Direction(deg.)	27	58	58	27	45
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 24-28°C and 13-16°C, respectively.
- Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 51-69 % & 30-41, respectively.
- Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE and 11-25 km/h, respectively.

#### (4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	25	26	27	28	29
Min.Temp.(°C)	9	9	11	13	14
RH-I (%)	47	49	51	63	63
RH-II (%)	26	26	33	39	36
Wind Speed (kmph)	18	18	18	16	11
Wind Direction(deg.)	45	36	58	45	153
Total CC (octa)	0	0	0	0	1

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 25-29°C and 9-14°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 47-63 % & 26-39, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, SE and 11-18 km/h, respectively.

#### (5) AMRELI DISTRICT:

	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	25	26	27	28	29
Min.Temp.(°C)	10	11	12	13	13
RH-I (%)	42	48	53	68	73
RH-II (%)	27	28	33	37	33
Wind Speed (kmph)	20	20	18	12	11
Wind Direction(deg.)	24	22	32	90	288
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 25-29°C and 10-13°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 42-73 % & 27-37, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, N, E, W and 11-20 km/h, respectively.

#### (6) JAMNAGAR DISTRICT:

	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	26	27	27	28	28
Min.Temp.(°C)	12	13	14	15	15
RH-I (%)	49	51	50	61	66

RH-II (%)	26	24	28	37	34
Wind Speed (kmph)	22	22	22	19	13
Wind Direction(deg.)	27	32	58	58	105
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 26-28°C and 12-15°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 49-66 % & 24-37, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, E and 13-22 km/h, respectively.

## Agro meteorological Advisories:

<b>General Advice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keeping in view of threat of COVID-19 spread farmers are advised to follow the government guidelines, personal hygiene, use mask, ensure hand washing with soap at reasonable interval, social distancing of 6 feet during harvesting and other agricultural operation in all crops.</b></li> <li>• <b>Due to prevailing cold weather apply irrigation during evening hours to protect the crops &amp; vegetables from chilling injury.</b></li> </ul> <p><b>Weather outlook for subsequent week:</b> As per extended range forecast dry, cool and clear weather likely to observe during 18 to 23-January-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alerts &amp; Warning:</b> <b>NIL</b></li> <li>• <b>Sms.: For the control of powdery mildew in mango spray 15 ml Hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew disease.</b></li> </ul>
-----------------------	---

Crops	Stage	Insect/Pest/Variety	Advisory
Garlic	Growing	Alternaria leaf blight  Thrips 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not over irrigate to prevent leaf blight (yellowing) disease in garlic.</li> <li>• To prevent blight disease incidence in garlic, Spray Azoxystrobin 11.4 % + Tebuconazole 18.3 % SC 10 ml in 10 liters of water under clear weather.</li> <li>• Heavy infestation of thrips observed in garlic. For the control of thrips in garlic spray Lambda-cyhalothrin 5% EC 15 ml in 10 lit of water under clear weather.</li> </ul>

<b>Chick pea</b>	Flowering/pod formation	<p>Heliothis</p>  <p>Stunt virus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For monitoring of the pod borer in the gram crop, installation of Pheromone trap @ 3-4 traps per acre is advised. "T" shaped bird perches in and around crop field to be installed for natural controlling the insect population. If infestation of Heliothis found above ETL, spray <b>Spinosad 45 SC 4 ml or Indoxacarb 7ml in 10 litres of water</b> under clear weather.</li> <li>To prevent infestation of stunt virus disease in chickpea spray Imidacloprid 30.5 % EC 5 ml per 10 lit. of water under clear weather for the control of vector.</li> <li>To prevent blight disease infestation spray <b>Mencozeb 75 % WP 27 gm in 10 liters of water</b> as precautionary measure under clear sky.</li> <li>Irrigate gram crop at flowering and pod formation stages.</li> </ul>
<b>Mustard</b>	Flowering/ Pod formation	<p>Aphid, Thrips</p> <p>Powdery mildew &amp; white rust</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor the crop for infestation of Aphid, if infestation observe above ETL then carry out spraying of <b>500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water</b> under clear weather.</li> <li>Spray 15 ml <b>hexaconazole</b> in 10 liters of water to prevent powdery mildew and white rust diseases in mustard.</li> <li>Irrigate mustard crop at flowering and pod formation stages.</li> </ul>
<b>Coriander</b>	Flowering/ seed formation	<p>Aphid/thrips</p> <p>Powdery mildew/blight</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor the crop for infestation of Aphid &amp; thrips, if infestation observe above ETL then carry out spraying of <b>500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water</b> under clear weather.</li> <li>To prevent excessive growth apply control irrigation and not to apply excess urea fertilizer in coriander.</li> <li>Spray 15 ml <b>Hexaconazole</b> in 10 liters of water to prevent powdery mildew/ blight disease in coriander under clear weather.</li> </ul>
<b>Cumin</b>	Flowering	Aphid/thrips	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor the crop for infestation of Aphid &amp; thrips, if infestation observe above ETL then carry out spraying of <b>500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml with Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water</b> under clear weather.</li> </ul>


		Powdery mildew and blight	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spray 15 ml <b>Propiconazole 25 % EC</b> in 10 liters of water to prevent powdery mildew and blight disease in cumin under clear weather.</li> </ul>
<b>Wheat</b>	Jointing/booting/heading	-	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Irrigate wheat crop at flowering and milking stages.</b></li> </ul>
<b>Cotton</b>	Plucking & pulling of cotton stalk	<p>Heavy tattack of pink boll worm observed in cotton field. Carry out picking in time.</p> <p><b>Animals like goats, sheep among others, should be allowed to graze on unopened bolls and plant debris in the cotton fields after the last picking to prevent infestation of pink boll worm in subsequent year. After grazing don't burn cotton stalksbut, recycle the stalk by thedoin situ chopping &amp; burying of cotton stalk in soil by mobile chopper and rotavator or make compost from the cotton residues to improve soil biomass and health.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Heavy tattack of pink boll worm observed in cotton field. Carry out picking in time.</li> <li><b>Animals like goats, sheep among others, should be allowed to graze on unopened bolls and plant debris in the cotton fields after the last picking to prevent infestation of pink boll worm in subsequent year. After grazing don't burn cotton stalksbut, recycle the stalk by thedoin situ chopping &amp; burying of cotton stalk in soil by mobile chopper and rotavator or make compost from the cotton residues to improve soil biomass and health.</b></li> </ul>
<b>Pigeon pea</b>	Pod Maturity	-	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Harvest the mature pods.</b></li> </ul>
<b>Castor</b>	Capsule formation & development, maturity	Capsule borer	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Spray Spinosad 45 SC @ 4.0 ml/ 10 lit of water.</b></li> <li>Give irrigation as per crop need under clear sky.</li> <li>Harvest mature spike in time to prevent shedding of mature capsule.</li> </ul>
<b>Onion</b>	Transplanting	<p>Purple Blotch</p> <p>Thrips</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keeping in view of optimum weather conditions, Farmers are advised for transplantation of onion seedling in this week. Seedling should not be older than six weeks. Ten to fifteen days before transplanting, apply 20 ton well decomposed FYM with 25 kg nitrogen, 50-60 kg phosphorus and 50 kg potash at the time of last ploughing.</li> <li>For the control of purple blotch in onion spray mancozeb 27 gm or Chlorothalonil 75% WP 27 gm in 10 liters of water at 15 days interval under clear sky.</li> <li>Heavy infestation of thrips observed in onion. For the control of thrips in onion spray profenofos 20 ml in 10 lit of water under clear sky.</li> </ul>

Brinjal	Flowering/ fruiting	<p style="color: red; font-weight: bold;">Sucking pest →</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">Shoot &amp;Fruit borer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of water under clear weather condition under clear sky.</li> <li>In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato crops, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If insect population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml/ml/10 litre of water under clear weather condition is advised.</li> </ul>
Chili	Flowering & fruiting	<p style="color: red; font-weight: bold;">Thrips →</p>  <p style="color: blue; font-weight: bold;">Anthracnose →</p>  <p style="color: blue; font-weight: bold;">Leaf curling Virus →</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Under present weather conditions, severe attack of thrips has been reported. Spray Profenofos 20 ml with 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of heavy attack make spray of spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of water under clear sky.</li> <li>For the control of Anthracnose spray Mancozeb 27gm OR Chlorothalonil 27 gram OR Fosetyl 20 gm in 10 liters of water at 15 days interval under clear sky.</li> <li>In present weather conditions, rouging of viral infested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Hostathion 20 ml per 10 litre of water is advised for control the vector white fly under clear sky.</li> </ul> 
Lemon	Fruit development	<p style="color: red; font-weight: bold;">Psylla and thrips</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">Citrus canker</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>To prevent damage of psylla &amp; thrips spray imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of water under clear sky.</li> <li>For the control of citrus canker spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclin 1.5 gm in</li> </ul>

		<b>Leaf minor</b>	<p><b>10 litre of water</b> under clear sky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spray Imidacloprid 17.8 % SL 5 ml or Quinalphos 20 ml in 10 litres of water for control of leaf minor in lemon</b> under clear sky.</li> </ul>
<b>Mango</b>	Flowering	<b>Blossom midge and Leaf hopper→</b>  <b>Powdery Mildew→</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To prevent damage spray <b>imidacloprid 5 ml/10 litres of water</b> under clear sky.</li> <li>• For the control of powdery mildew in mango spray 15 ml <b>Hexaconazole</b> in 10 liters of water to prevent powdery mildew disease.</li> </ul>
<b>Livestock &amp; poultry</b> 	<p>Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. Carry out Brucella and other infectious &amp; reproductive diseases evaluation. Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.</p> <p>Provide ad lib warm water to lactating animals. <b>Keep young calves indoors during night time to avoid cold stress.</b> Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Provide ad lib warm water to lactating animals. Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In poultry house gunny bags or plastic sheet curtains can be installed on the side walls of shed with require ventilation.</li> <li>• Provision to switch on light bulbs in the laying hen sheds to maintain temperature.</li> </ul>		
<b>Note</b>	<p>Kindly download</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MAUSAM App</b> for location specific forecast &amp; warning.</li> <li>• <b>MEGHDOOT App</b> for Agromet advisory.</li> <li>• <b>DAMINI App</b> for lighting warning.</li> </ul>		

**Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia.**

**NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 01  
(31.12.2021 to 07.01.2022) over Agricultural region**



Agricultural vigour is good over isolated pockets of the state.