



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતઆબોહવાકીય વિભાગ
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરઘડિયા-૩૬૦૦૨૩
તા. ૧૪-૦૩-૨૦૨૫ થી તા.૧૮-૦૩-૨૦૨૫



(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સૂકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જી.કૃ.યુ.તરઘડિયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)
 ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓનું કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૧૦૦/૨૦૨૫

પાછલા અઠવાડિયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિબળો	
વરસાદ(મી.મી)	0.0
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	37.4-41.9
લઘુતમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	18.5-21.4
ભેજ (%)સવાર	38-74
ભેજ (%)બપોરબાદ	17-23
પવનનીગતિ (કિમી/કલાક)	1.8-3.0

હવામાન આગાહી :પત્રક-ક

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી ૧૮-૦૩-૨૦૨૫ સવારના ૮.૩૦ સુધી

તા.૧૪-૦૩-૨૦૨૫ થી ૧૮-૦૩-૨૦૨૫

કૃષિસલાહ :

- ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા વિભાગ ,જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ,તરઘડીયા તરફથી જણાવવામાં આવેછે કે ,ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

રાજકોટ :

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૪	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૧૪-૦૩-૨૦૨૫	૧૫-૦૩-૨૦૨૫	૧૬-૦૩-૨૦૨૫	૧૭-૦૩-૨૦૨૫	૧૮-૦૩-૨૦૨૫
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	39	38	37	38	39
લઘુતમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	22	21	21	22	23
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	45	50	45	25	30
લઘુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	20	20	20	15	15
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	9	10	10	12	12
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	295	281	298	301	308
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	0	0	0	2	0

- રાજકોટ જિલ્લામાં આગામી તા.૧૪-૦૩-૨૦૨૫ થી તા.૧૮-૦૩-૨૦૨૫ દરમિયાન સુકું અને ચોપ્પું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૩૭-૩૯ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન

રાત્રી દરમ્યાન ૨૧-૨૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૨૫-૫૦ અને ૧૫-૨૦ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા વાયવ્ય અને પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૯ થી ૧૨ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

મોરબી:

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૪	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૧૪-૦૩-૨૦૨૫	૧૫-૦૩-૨૦૨૫	૧૬-૦૩-૨૦૨૫	૧૭-૦૩-૨૦૨૫	૧૮-૦૩-૨૦૨૫
વરસાદ(મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૩૯	૩૮	૩૭	૩૮	૩૯
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૨૨	૨૧	૨૧	૨૨	૨૩
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	૪૫	૫૦	૪૫	૨૫	૩૦
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૨૦	૨૦	૨૦	૧૫	૧૫
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૧	૧૪	૧૧	૧૧	૯
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૫૭	૨૫૩	૨૭૪	૨૭૮	૨૮૪
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૦	૦	૦	૨	૦

- મોરબી જીલ્લામાં આગામી તા.૧૪-૦૩-૨૦૨૫ થી તા.૧૮-૦૩-૨૦૨૫ દરમ્યાન સુકું અને ચોખ્ખું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૭-૩૯ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૧-૨૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૨૫-૫૦ અને ૧૫-૨૦ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૯ થી ૧૪ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

દેવભૂમિદ્વારકા :

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૪	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૧૪-૦૩-૨૦૨૫	૧૫-૦૩-૨૦૨૫	૧૬-૦૩-૨૦૨૫	૧૭-૦૩-૨૦૨૫	૧૮-૦૩-૨૦૨૫
વરસાદ(મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૩૧	૨૯	૨૯	૩૧	૩૩
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૨૩	૨૧	૨૨	૨૩	૨૩
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	૮૫	૯૫	૮૦	૬૦	૬૫
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૭૦	૭૦	૭૦	૬૦	૬૦
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	૧૧	૧૧	૧૨	૧૩	૧૩
પવનનીદિશા (ડીગ્રી)	૨૯૨	૨૭૬	૨૯૦	૨૯૯	૩૧૨
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૦	૩	૦	૦	૦

- દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં આગામી તા.૧૪-૦૩-૨૦૨૫ થી તા.૧૮-૦૩-૨૦૨૫ દરમ્યાન સુકું અને ચોખ્ખું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૯-૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૧-૨૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૬૦-૯૫ અને ૬૦-૭૦ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમ અને વાયવ્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૧ થી ૧૩ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

સુરેન્દ્રનગર :

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૪	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૧૪-૦૩-૨૦૨૫	૧૫-૦૩-૨૦૨૫	૧૬-૦૩-૨૦૨૫	૧૭-૦૩-૨૦૨૫	૧૮-૦૩-૨૦૨૫
વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	૩૯	૩૮	૩૭	૩૮	૩૯

લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	22	21	21	22	23
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	45	50	45	25	30
લઘુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	20	20	20	15	15
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	13	15	14	15	13
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	278	274	288	288	294
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	0	0	0	2	0
- સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૧૪-૦૩-૨૦૨૫ થી તા.૧૮-૦૩-૨૦૨૫ દરમિયાન સુકું અને ચોખ્ખું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે. - આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૩૭-૩૮ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૨૧-૨૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. - આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૨૫-૫૦ અને ૧૫-૨૦ ટકા રહેશે. - પવનની દિશા પશ્ચિમ અને વાયવ્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૩ થી ૧૫ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.					

અમરેલી :

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૪	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૧૪-૦૩-૨૦૨૫	૧૫-૦૩-૨૦૨૫	૧૬-૦૩-૨૦૨૫	૧૭-૦૩-૨૦૨૫	૧૮-૦૩-૨૦૨૫
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	38	37	37	38	38
લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	22	22	21	23	23
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	40	45	50	30	30
લઘુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	25	25	30	25	20
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	12	12	12	14	16
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	310	302	307	312	318
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	0	0	2	2	0
- અમરેલી જીલ્લામાં આગામી તા.૧૪-૦૩-૨૦૨૫ થી તા.૧૮-૦૩-૨૦૨૫ દરમિયાન સુકું અને ચોખ્ખું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે. - આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૩૭-૩૮ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૨૧-૨૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. - આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૩૦-૫૦ અને ૨૦-૩૦ ટકા રહેશે. - પવનની દિશા વાયવ્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૨ થી ૧૬ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.					

જામનગર :

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૪	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૧૪-૦૩-૨૦૨૫	૧૫-૦૩-૨૦૨૫	૧૬-૦૩-૨૦૨૫	૧૭-૦૩-૨૦૨૫	૧૮-૦૩-૨૦૨૫
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	36	35	34	38	37
લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	19	18	19	21	21
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	60	60	50	45	45
લઘુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	20	15	15	10	10
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	11	12	12	13	12
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	278	266	285	289	300
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	0	3	0	0	0
જામનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૧૪-૦૩-૨૦૨૫ થી તા.૧૮-૦૩-૨૦૨૫ દરમિયાન સુકું અને ચોખ્ખું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.					

- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૪-૩૮ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૮-૨૧ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૪૫-૬૦ અને ૧૦-૨૦ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમ અને વાયવ્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૧ થી ૧૩ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

સામાન્ય કૃષિ સલાહ :

હાલના ગરમ અને સુકા હવામાનના કારણે

- શાકભાજી પાકોને સાંજના અથવા સવારના સમયે હળવું પિયત આપવું.
- શાકભાજી અને બાગાયતી પાકોને ગરમીની અસર ઓછી થાય એ માટે પાક અવશેષોનું અથવા પ્લાસ્ટિક આવરણ કરવું જેથી જમીનમાં ભેજ પણ જળવાય રહે.
- શાકભાજી અને બાગાયતી પાકોને શણના કંતાનથી અથવા જુવાર-બાજરી જેવા પાકોની કડબની આડશ કરવી.
- શિયાળું પાકોને સંગ્રહ કરતા પહેલા તેના દાણાને વ્યવસ્થિત સફાઈ કરી, દાણામાં ૮ ટકા કરતા ઓછો ભેજ રહે ત્યાં સુધી સૂર્ય તાપમાં સુકવી પછી સંગ્રહ કરવો. તેમજ જે ગોડાઉનમાં સંગ્રહ કરવાનો હોય તે ગોડાઉનમાંથી સંગ્રહેલ જુના દાણાઓ બહાર કાઢી વ્યવસ્થિત સફાઈ કરવી. તેમજ દીવાલોમાં પડેલ તિરાડોનું રીપેરીંગ કરી પૂરી દેવી અને ગોડાઉનમાં ૦.૫ ટકા મેલાથીયોન દવાના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો. દવાના છંટકાવ પછી ૭ થી ૮ દિવસ ગોડાઉન હવાયુસ્ત રીતે બંધ રાખવું. તેમજ દાણા ભરવા માટેના કોથળા સુર્યતાપમાં સૂકવવા જેથી જીવાતોના ઈંડા અને કોશેટાનો નાશ થાય.
- ઉનાળુ મગફળી, તલ, મગ, અડદ અને શાકભાજીના વાવેતર માટે ખાલી થયેલ જમીન ખેડીને તૈયાર કરવી અને પસંદગીના પાકનું સારી જાતનું પ્રમાણિત બિયારણ મેળવી વાવેતર પૂર્ણ કરવું.
- તા. ૧૮ થી ૨૩-માર્ચ-૨૦૨૫ : હવામાન આગોતરો વરતારો : તા. ૧૮ થી ૨૩-માર્ચ-૨૦૨૫ દરમ્યાન સુકું, ચોખ્ખું રહેવાની સંભાવના છે.
- હવામાન ચેતવણી : નથી

મોબાઈલ સંદેશ : તાપમાન વધારે રહેવાના કારણે પશુઓને દિવસના સમયે છાયડામાં રાખવા અને મિનરલ મિક્શર યુક્ત પીવાના સ્વચ્છ પાણીની વ્યવસ્થા કરવી.

મુખ્યપાક	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિસલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી)
ઉનાળુ મગફળી	વૃદ્ધિ	શ્રીપ્ત	• મગફળીમાં શ્રીપ્તના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને એસીફેટ ૧૫ ગ્રામ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મિલી અથવા લેમ્ડા-સાયહેલોથ્રીન ૧૪ મિલી દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વારાફરતી છંટકાવ કરવો.
ઉનાળુ તલ	ઉગાવો/વૃદ્ધિ	ગુજરાત તલ-૨ ગુજરાત તલ-૩ ગુજરાત તલ-૫	• તલના ઉગાવા બાદ તલનો પાક ૪-૬ પાનનો થાય ત્યાં સુધી પિયત આપવું નહિ જેથી છોડ બળે નહિ. • તલમાં શ્રીપ્તના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને એસીફેટ ૧૫ ગ્રામ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મિલી અથવા લેમ્ડા-સાયહેલોથ્રીન ૧૪ મિલી દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વારાફરતી છંટકાવ કરવો.
ઉનાળુ મગ	વાવેતર/ઉગાવો	ગુજ. મગ-૪, ગુજ. આણંદ મગ-૫	• ઉનાળુ મગના સારી જાતના પ્રમાણિત બીજનું વાવેતર કરવું. બિયારણને ૨-૩ ગ્રામ/કિલો મુજબ થાયરમ-કાર્બોક્સીન(વાયટાવેક્સ), મેન્ડોઝેબ અથવા કર્બેન્ડાઝીમ દવાનો

			પટ આપવો. પાયામાં ડી.એ.પી. ૧૪ કી.ગ્રા. અને યુરિયા ૧.૬ કી.ગ્રા./વીઘા અથવા સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૪૦ કી.ગ્રા. અને યુરિયા ૭ કી.ગ્રા./વીઘા મુજબ આપવું.
ઉનાળુ અડદ	વાવેતર/ઉગાવો	ગુજ. અડદ-૧ અને ૨	ઉનાળુ અડદના સારી જાતના પ્રમાણિત બીજનું વાવેતર કરવું. બિયારણને ૨-૩ ગ્રામ/કિલ્લો મુજબ થાયરમ-કાર્બોક્સીન(વાયટાવેક્ષ), મેન્કોઝેબ અથવા કર્બેન્ડાઝીમ દવાનો પટ આપવો. પાયામાં ડી.એ.પી. ૧૪ કી.ગ્રા. અને યુરિયા ૧.૬ કી.ગ્રા./વીઘા અથવા સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૪૦ કી.ગ્રા. અને યુરિયા ૭ કી.ગ્રા./વીઘા મુજબ આપવું.
રીંગણ	ફેર રોપણી/વૃદ્ધિ	જુનાગઢ લંબગોળ, ગુજરાત જુનાગઢ લાંબા રીંગણ ૪, ગુજરાત જુનાગઢ રીંગણ-૨ & ૩, ગુજરાત રીંગણ-૫	વાવેતર અંતર ૮૦ x ૬૦ સે.મી. રાખવું તથા યુરીયા ૧૦૮, સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૩૧૨ કિ.ગ્રા., અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૮૩ કિ.ગ્રા./ હેક્ટર પાયામાં આપવો.
ભીંડા	વૃદ્ધિ વિકાસ	મોલો, થ્રીપ્સ અને સફેદ માખી	ઉનાળુ વેલાવાળા શાકભાજીમાં મોલો, થ્રીપ્સ અને સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૪૦ મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને થાયોમેથોક્ઝામ ૨૫ % ૫ ગ્રામ અથવા ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મિલી દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
તુરીયા			
દૂધી			
ગલકા			
કારેલા			
ગુવાર			
કાકડી			
તરબુચ			
ડુંગળી	વૃદ્ધિ વિકાસ	થ્રીપ્સ, પાનનો સુકારો જાંબલી ઘાબા 	- થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને પ્રોફેનોફોસ ૩૦ મિલી અથવા લેમ્બડા સાયહેલોથ્રીન ૧૫ મિલી દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. અતિ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ ૪ મિલી/૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. - ડુંગળીના પાકમાં જાંબલી ઘાબાના રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલર ૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા. - નાઈટ્રોજન યુક્ત એમોનિયમ સલ્ફેટ ખાતરનો પુરતી ડોઝ ૩૦ કીલો ગ્રામ પ્રતિ હે. આપવો.
રીંગણી	ફુલ/ફળ	સફેદમાખી	- રીંગણીમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ડાયફેન્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. - ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
		ડુંખ અને → ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ	


		ભુકીછારો/રાખોડી	 - આંબામાં ભુકીછારો/રાખોડીના નિયંત્રણ માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.  - કેરી લખોટી જેવડા કદની થાય ત્યારે ૨ ગ્રામ નેપ્થેલીન એસેટીક એસીડ અને ૨ કી.ગ્રામ યુરીયાને ૧૦૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો અને પિયત આપવું જેથી કેરીનું ખરણ ઓછું થાય.
પશુ/ મરઘા 	તાપમાન વધારે રહેવાના કારણે પશુઓને દિવસના સમયે છાયડામાં રાખવા અને મિનરલ મિક્ચર યુક્ત પીવાના સ્વચ્છ પાણીની વ્યવસ્થા કરવી. દુધાળા પશુઓને ઉનાળામાં ઠંડક આપવા પાણીનો છંટકાવ કરવો. ખોરાકમાં લીલા ચારાનું પ્રમાણ વધારવું. દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરિક પવડરથી બરાબર સાફ કરવું. પશુઓમાં કાળીયા તાવના રોગના નિયંત્રણ માટે રસીકરણ કરાવવું. પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટ્રાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. કરમિયાની દવા આપવી તથા પશુને ૬ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને પ્રતિ લીટર દુધની ઊપજ હોય તેમને નિયમિત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્વોનું મિશ્રણ આપવું. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. લીલુધાસ , સુકું ઘાસ અને ખનીજ તત્વોનું મિશ્રણ ખોરાકમાં આપવું. લીલા ચારા માટે મકાઈનું વાવેતર કરવું. તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફીનાઈલ છાંટવું. કરમિયાની દવા આપવી. - મરઘા ઘરની ફરતે ભીના કંતાન બાંધવા. - મરઘાઓને રાનીખેત/ન્યુકેસ્ટલ રોગ સામે રસીકરણ કરવું. ૧૫ અઠવાડીયાથી નાના મરઘાઓની ચાંચનું કટિંગ કરવું.		
નોંધ	નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો મૌસમ એપ જીલ્લા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે. મેઘદ્રૂત એપ હવામાન આધારિત કૃષિસલાહ બુલેટીન માટે. દામીની એપ વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે.		

જા.નં.જુકૃયુ/સૂ.ખે./એગ્રોમેટ/બુલેટીન/ / ૨૦૨૫,
તરઘડિયા(રાજકોટ), તારીખ: ૧૩/૦૩/૨૦૨૫.

તંત્રીશ્રી/ડાયરેક્ટરશ્રી,
રાજકોટ,

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં ,રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ધ કરાવવા નમ્ર વિનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

ટેક્નીકલ ઓફિસર
સુકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
તરઘડીયા



આગાહી નિર્દેશ ચિન્હો

કોઈ ચેતવણી નથી

ધ્યાન આપો

સતર્ક રહો

ચેતવણી



ઉપજી થયેર ની ચેતવણી



નીચ ઉપજી થયેર ની ચેતવણી



ગરમ રાત્રિની ચેતવણી



દરિયાકાંઠા નાં વિસ્તારો માં ગરમ અને બિજવાનું હવામાન



ગરમ દિવસ ની ચેતવણી



સપાટી પર નો નીચ પવન



પૂજ ની આપો



પૂજ ની ડમરી ઉડે તેવો પવન



GraminKrushiMausamSeva
Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023



Agromet Advisory Service bulletin No. 100 for North Saurashtra districts (Gujarat)

(Issued jointly by AMFU-DERS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)

(Period for 14 to 18-March-2025)

Significant past weather for the preceding week of Rajkot

Rainfall (mm)	0.0
Maximum temperature (°C)	37.4-41.9
Minimum temperature (°C)	18.5-21.4
Relative Humidity (%) I	38-74
Relative Humidity (%) II	17-23
Wind speed (Kmph)	1.8-3.0

Weather forecast until 08-30 hrs. of 18/03/2025

(1) RAJKOT DISTRICT:

	14/03/2025	15/03/2025	16/03/2025	17/03/2025	18/03/2025
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	39	38	37	38	39
Min.Temp.(°C)	22	21	21	22	23
RH-I (%)	45	50	45	25	30
RH-II (%)	20	20	20	15	15
Wind Speed (kmph)	9	10	10	12	12
Wind Direction(deg.)	295	281	298	301	308
Total CC (octa)	0	0	0	2	0
General weather: Dry and clear weather forecasted for next five. Rainfall: No rainfall forecasted. Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 37-39 °c and 21-23°c, respectively. Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 25-50 & 15-20, respectively. Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NW, W and 9-12 km/h, respectively.					

(2) MORBI DISTRICT:

	14/03/2025	15/03/2025	16/03/2025	17/03/2025	18/03/2025
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	39	38	37	38	39
Min.Temp.(°C)	22	21	21	22	23
RH-I (%)	45	50	45	25	30
RH-II (%)	20	20	20	15	15
Wind Speed (kmph)	11	14	11	11	9
Wind Direction(deg.)	257	253	274	278	284
Total CC (octa)	0	0	0	2	0
• General weather: Dry and clear weather forecasted for next five days. • Rainfall: No rainfall forecasted. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 37-39 °c and 21-23°c, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 25-50 & 15-20, respectively. • Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W and 9-14 km/h, respectively.					

(3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	14/03/2025	15/03/2025	16/03/2025	17/03/2025	18/03/2025
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	31	29	29	31	33
Min.Temp.(°C)	23	21	22	23	23
RH-I (%)	85	95	80	60	65
RH-II (%)	70	70	70	60	60
Wind Speed (kmph)	11	11	12	13	13
Wind Direction(deg.)	292	276	290	299	312
Total CC (octa)	0	3	0	0	0
• General weather: Dry and clear weather forecasted for next five days. • Rainfall: No rainfall forecasted. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 29-33 °c and 21-23°c, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 60-95 & 60-70, respectively. • Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W, NW and 11-13 km/h, respectively.					

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	14/03/2025	15/03/2025	16/03/2025	17/03/2025	18/03/2025
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	39	38	37	38	39

Min.Temp.(°C)	22	21	21	22	23
RH-I (%)	45	50	45	25	30
RH-II (%)	20	20	20	15	15
Wind Speed (kmph)	13	15	14	15	13
Wind Direction(deg.)	278	274	288	288	294
Total CC (octa)	0	0	0	2	0
• General weather: Dry and clear weather forecasted for next five days. • Rainfall: No rainfall forecasted. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 37-39 °c and 21-23°c, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 25-50 & 15-20, respectively. • Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W, NW and 13-15 km/h, respectively.					

(5) AMRELI DISTRICT:

	14/03/2025	15/03/2025	16/03/2025	17/03/2025	18/03/2025
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	38	37	37	38	38
Min.Temp.(°C)	22	22	21	23	23
RH-I (%)	40	45	50	30	30
RH-II (%)	25	25	30	25	20
Wind Speed (kmph)	12	12	12	14	16
Wind Direction(deg.)	310	302	307	312	318
Total CC (octa)	0	0	2	2	0
• General weather: Dry and clear weather forecasted for next five days. • Rainfall: No rainfall forecasted. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 37-38 °c and 21-23°c, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 30-50 & 20-30, respectively. • Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NW and 12-16 km/h, respectively.					

(6) JAMNAGAR DISTRICT:

	14/03/2025	15/03/2025	16/03/2025	17/03/2025	18/03/2025
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	36	35	34	38	37
Min.Temp.(°C)	19	18	19	21	21
RH-I (%)	60	60	50	45	45
RH-II (%)	20	15	15	10	10
Wind Speed (kmph)	11	12	12	13	12
Wind Direction(deg.)	278	266	285	289	300
Total CC (octa)	0	3	0	0	0
• General Weather: Dry and clear weather forecasted for next five days. • Rainfall: No rainfall forecasted.					

- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 34-38 °c and 18-21°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 45-60 & 10-20, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W, NW and 11-13 km/h, respectively.

Agro meteorological Advisories:


General Advice	General Advisory • Due to prevailing dry and hot weather conditions, farmers are recommended for light and frequent irrigation in all vegetable crops. Irrigation should be done in the morning hours or in the evening hours. • Farmers are also advised to protect vegetables nurseries and orchards against hot winds by physical barrier like wet gunny bag barrier/sorghum, pearl millet hay barriers. • Before storage of rabi crops produce, grains should be properly cleaned and it should be dried properly to the recommended level of moisture content. Godowns should be properly cleaned by removing all the grains and other storage matter of previous crop. Cracks and crevices of the walls should be cleaned and repaired and whitewashing should be done. Those who can afford are advised to spray 0.5 % malathion solution and keep the chamber closed for 7-8 days. The gunny bags should be dried in the sun so that eggs and pupating stages of insects as well as inoculum of diseases get destroyed. • Complete the sowing of summer crops i.e. green gram, black gram in time. • Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast dry, clear weather likely to observe during 18 to 22-March-2025. • Weather Alerts & Warning: NIL Sms : Due to hot weather keep the animal under tree shade or shed during noon hours. Provide plenty of cool water mixed with minerals for drinking and shower the animals with cold water two to three times in a day.		
Crops	Stage	Insect/Pest/Variety	Advisory
Summer groundnut	Growth	Thrips	• For thrips control in groundnut spray neem seed extract 5% and make alternative sprays of acephate 75 % SP 15 gm or profenofos 20 ml or lambda-cyhalothrin 14 ml in 10 liters of water.
Summer Sesame	Growth	G.Til-2, G.Til-3, , G.Til-5	• Do not apply irrigation after germination before 4-6 leaf stage. • For thrips control in sesame spray neem seed extract 5% and make alternative sprays of acephate 75 % SP 15 gm or profenofos 20 ml or lambda-cyhalothrin 14 ml in 10 liters of water.

Green gram	Sowing/ germination	GM-4, GAM-5	• Procure good quality seeds of green gram and carry out sowing as minimum and maximum temperature rises up to 19 °C and 30°C, respectively and give seed treatment of vitavax (Carboxin 37.5% + Thiram 37.5%) or mencozeb or carbendazim 2-3 gm/1 kg seed. DAP 87 kg and 9.5 kg urea/ha, as basal.
Black gram	Sowing/ germination	Guj. Adad-1	• Procure good quality seeds of Black gram and carry out sowing as minimum and maximum temperature rises up to 19 °C and 30°C, respectively and give seed treatment of vitavax (Carboxin 37.5% + Thiram 37.5%) or mencozeb or carbendazim 2-3 gm/1 kg seed. DAP 87 kg and 9.5 kg urea/ha, as basal.
Brinjal	Transplanting / growing	Junagadh oblong, Junagadh long, JBGR 1,GJB 2& 3, GJLB 4, GRB 5	• Keep planting distance 90 X 60 cm² and apply urea 108, single super phosphate 312 and murret of potash 83 kg/ha at sowing time.
Lady finger	Growth	Aphid & white fly	• For aphid, white fly and leaf roller control in vegetables spray neem seed extract 5% or 40 ml neem oil with thiamethoxam 25 % WG 5 gm or imidacloprid 30.5 % SC 5 ml in 10 liters of water.
Ridge gourd			
Bottle gourd			
Sponge guard			
Bitter guard			
Cluster bean			
Cucumber			
Water melon			
Onion	Growth	Thrips Leaf blight/ Purple blotch→ 	• For thrips control spray neem seed extract 5% and Make alternative sprays of profenofos 20 ml and lambda-cyhalothrin 14 ml in 10 liters of water at 10 days interval. • Make alternate spray of Mencozeb 27 gm OR Chlorothalonil 27 gm Or fozetyl 10gm in 10 liters of water at 10 days interval to control leaf blight.
Brinjal	Flowering/ fruiting	White fly→ Shoot & Fruit borer	• To minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml with Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of water. • In brinjal, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For

			control of shoot and fruit borer in brinjal, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If fruits and shoot borer population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml /10 litre of water is advised.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips→  Anthracnose →  Leaf curling Virus → 	- Under present weather conditions, severe attack of thrips has been reported. Spray Profenofos 20 ml with 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of heavy attack make spray of spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of water. - For the control of Anthracnose spray Mencozeb 27gm OR Chlorothalonil 27 gram OR Fosetyl 20 gm in 10 liters of water at 15 days interval. - In present weather conditions, rouging of viral infested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Hostathion 20 ml per 10 litre of water is advised for control the vector white fly. 
Lemon	Fruit development/ripening	Psylla and thrips  Citrus canker Leaf minor	- To prevent damage of psylla&thrips spray imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of water under clear weather. - Spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclin 1.5 gm in 10 litre of water under clear sky. - Spray Quinalphos 20 ml in 10 litres of water for control of leafminor under clear sky.
Mango	Flowering	Blossom midge and Leaf hopper →	To prevent damage spray imidacloprid 3 ml/10 litres of water.

		 Powdery Mildew→ 	• Spray 15 ml Hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew disease in mango. • To prevent dropping of immature fruits in mango spray 2 gm NAA and 2 kg Urea in 100 litres of water. • Apply irrigation as fruits become pea size.
Livestock & poultry 	Due to hot weather keep the animal under tree shade or shed during noon hours. Provide plenty of cool water mixed with minerals for drinking and shower the animals with cold water two to three times in a day. Keep the poultry shed cool by using wet gunny bags around the structure. Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. Provide ad lib warm water to lactating animals. For prevention of Anthrax disease in animals do vaccination with anthrax vaccine. Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder. Also give deworming tablet to younger animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed. Carry out sowing of maize for fodder purpose. For prevention of New castle disease/Ranikhet disease do vaccination in poultry. The beaks of birds in the poultry under age of 15 Week should be cut. Entry of visitors in poultry should be prevented.		
Note	Kindly download • MAUSAM App for location specific forecast & warning. • MEGHDOOT App for Agromet advisory. • DAMINI App for lighting warning.		

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia.



આગાહી નિર્દેશ ચિન્હો

કોઈ ચેતવણી નથી	ધ્યાન આપો
સતર્ક રહો	ચેતવણી

ઉપજી થયેર ની ચેતવણી	નીચ ઉપજી થયેર ની ચેતવણી
ગરમ રાત્રિની ચેતવણી	દરિયાકાંઠા નાં વિસ્તારો માં ગરમ અને બેજવાનુ હવામાન
ગરમ દિવસ ની ચેતવણી	સપાટી પર નો નીચ પવન
પૂજ ની આપો	પૂજ ની ડમરી ઉડે તેવો પવન