



**ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમસેવા**  
**હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન**  
**ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતખાંબોહવાકીય વિભાગ**  
**જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરધડિયા-૩૬૦૦૦૨૩**  
**મો.નં. ૮૪૨૬૬૩૮૨૩૫**  
**તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૧ થી તા.૨૨-૦૬-૨૦૨૧**



(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સૂકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જી.ક્યુ.તરધડિયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)  
ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓનું કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૪૬/૨૦૨૧  
પાછલા અઠવાડીયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિબળો	
વરસાદ(મી.મી)	294.2
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	25.5-32.4
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	22.4-24.4
ભેજ (%) સવાર	86-97
ભેજ (%) બપોરબાદ	69-98
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	3.6-5.3

### હવામાન આગાહી :પત્રક-૫

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતખાંબોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી ૨૨-૦૬-૨૦૨૧ સવારના ૮.૩૦સુધી

તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૧ થી ૨૨-૦૬-૨૦૨૧

### કૃષિસલાહ :

- ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા વિભાગ ,જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ,તરધડીયા તરફથી જણાવવામાં આવેછે કે ,ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત ખાંબોહવાકીય વિસ્તારના

### રાજકોટ :

તારીખ પેરામોટર	દિવસ-૧ ૧૮-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૧૯-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૦-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૧-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૨-૦૬-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	28	19	24	25	22
મહત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	31	32	32	32	32
લઘુત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	25	25	25	25	25
મહત્તમભેજ (%) સવાર	92	92	91	89	86
લઘુત્તમભેજ (%) બપોરબાદ	72	68	65	69	73
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	17	17	18	22	27
પવનની દિશા(ડીગ્રી)	248	248	248	252	249
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	5	3	7	7	8

- રજકોટ જીલ્લામાં આગામી તા. ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ થી તા. ૨૨-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૧૮ થી ૧૯ ના રોજ મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૧-૩૨ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૫ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૬-૮૨ અને ૬૫-૭૩ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૭ થી ૨૭ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

#### મોરબી:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	9	10	10	15	15
મહત્વમાન તાપમાન(સે.ગ્રે)	31	32	32	32	32
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	25	25	25	25	25
મહત્વમાન ભેજ (%) સવાર	86	85	84	82	80
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	62	59	58	57	67
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	19	21	21	26	34
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	246	248	249	249	249
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	4	4	6	7	8

- મોરબી જીલ્લામાં આગામી તા. ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ થી તા. ૨૨-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૧૮ થી ૨૨ ના રોજ હળવો વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૧-૩૨ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૫ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૬-૮૨ અને ૬૫-૭૩ રહેશે.
- પવનની દિશા નૈऋત્ય અને પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૭ થી ૨૭ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

#### દેવભૂમિદ્વારકા:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	23	7	11	12	10
મહત્વમાન તાપમાન(સે.ગ્રે)	33	33	33	33	32
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	26	26	26	27	27
મહત્વમાન ભેજ (%) સવાર	88	88	87	84	83
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	71	70	68	71	71
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	19	19	19	26	32
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	248	248	248	249	249
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	6	2	5	7	8

- દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં આગામી તા. ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ થી તા. ૨૨-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૧૮ થી ૨૨ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૨-૩૩ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૬-૨૭ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૩-૮૮ અને ૬૮-૭૧ રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૮ થી ૩૨ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

### સુરેન્દ્રનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ (મી.મી.)	15	17	33	65	65
મહત્વમાન (સે.ગ્રે)	31	32	32	32	32
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	25	25	25	25	25
મહત્વમાન (%) સવાર	86	85	84	84	83
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	63	62	58	62	70
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	18	19	20	22	29
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	243	252	252	257	249
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	5	6	7	8	8

- સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૧૮-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.૨૨-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૧૮ થી ૨૨ ના રોજ મધ્યમ થી ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૧-૩૨ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૫ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૩-૮૬ અને ૫૮-૭૦ રહેશે.
- પવનની દિશા નૈત્રત્ય અને પણ્ણિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૮-૨૫ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

### અમરેલી :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ (મી.મી.)	31	30	65	65	65
મહત્વમાન (સે.ગ્રે)	32	33	33	32	32
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	24	24	25	25	25
મહત્વમાન (%) સવાર	93	94	93	92	89
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	77	73	70	72	75
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	17	16	17	20	23
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	248	248	248	248	249
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	6	4	8	7	8

- અમરેલી જીલ્લામાં આગામી તા.૧૮-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.૨૨-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૧૮ થી ૨૨ ના મધ્યમ થી ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૨-૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૫ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૮-૮૪ અને ૭૦-૭૭ રહેશે.
- પવનની દિશા પણ્ણિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૬ થી ૨૩ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

### જામનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ (મી.મી.)	32	8	11	19	10
મહત્વમાન (સે.ગ્રે)	31	32	32	32	31
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	26	26	27	27	27
મહત્વમાન (%) સવાર	89	89	88	86	84
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	72	69	67	70	71
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	18	19	19	25	31

પવનની દિશા (ડીગ્રી)	248	248	248	252	249
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	5	2	6	7	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>આમનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૧૮-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.૨૨-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૧૮ થી રૂ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.</li> <li>આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૧-૩૨ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૬-૨૭ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.</li> <li>આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્ત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૪-૮૮ અને ૬૭-૭૨ રહેશે.</li> <li>પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૮ થી ૩૧ કીમી/કલા રહેવાની શક્યતા છે.</li> </ul>					

- કોરોના વાયરસ ના સંક્રમણને અટકાવવા ખેતી કાર્યો અને ખેત પેદાશના વેચાણ અને બીજ, ખાતર અને દવાઓની ખરીદી દરમ્યાન મો પર કપડું (માસ્ક) બાંધી રાખવું અને બે વ્યક્તિ વચ્ચે ઇ થી ૭ ફૂટ અંતર જાળવવું.
  - તા. ૨૨ થી ૨૭-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૧: હવામાન આગોતરો વરતારો : તા.૨૨ થી ૨૭ સપ્ટેમ્બર -૨૦૨૧ દરમ્યાન ગરમ, ભેજવાળું અને મોટાભાગે વાદળછાયું રહેશે અને હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
  - સતત વરસાદના કારણે ખેતરના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ભરાયેલ પાણીનો નિકાલ કરવો જેથી ઉભો પાક સુકાય નહીં.
  - સતત વરસાદના કારણે કપાસ, મરયી અને શાકભાજી પાકોમાં સુકારો નાં આવે અને ફરી સારી વૃદ્ધિ માટે યુદ્ધિષ્ઠિત એમોનિયમ સલેક્ટ અને મયુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર દરેક ૩૦ કી.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર આપવું અને મિક્સ માયકોન્યુટ્રીયન્ટ ૧૦૦ ગ્રામ/પ્રતિ પંપ છાંટવું.
  - જે ખેતરોમાં વધુ વરસાદના કારણે પાકને ખુબજ નુકશાન થયું હોય અથવા બળી ગયેલ હોય અને ફરી વાવેતર કરવાની જરૂરીયાત હોય ત્યાં અજમા, સુવા, તલ, દિવેલા અને ચણા (ઝીજારા માટે) જેવા પાકોનું વાવેતર કરી શકાય.
  - આગામી પાંચ દિવસ હળવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી ઉભા પાકમાં દવા કે ખાતરનો છંટકાવ આ સમય દરમ્યાન મુલત્વી રાખવો.
  - ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી ખેતરમાંથી વરસાદના પાણીના નિકાલની વ્યસ્થા રાખવી અને તેનો ચેકડેમ, કુવા અને બીર રીયાર્જિન્ગમાં સંગ્રહ કરવો.
  - પવન સાથે વરસાદની શક્યતા હોવાથી ઉભડી મગફળી હાલ પુરતી ઉપાડવી નહિ અને બાજરી લાણીને કુંડા સલામત સ્થળે ઢાંકી દેવા અને મગ-અડનની શીંગો વીણી લેવી.
  - જે વિસ્તારમાં અપૂરતા વરસાદને કારણે આગલો પાક નિષ્ફળ ગયો હોય અને હવે વરસાદ થયો હોય તો અજમા (ગુજરાત-૧ & ૨), તલ ( ગુજરાત-૩ & ૪, પૂર્વ-૧), દિવેલા (જુસીએચ-૪, ૭), ચારાની જીવાર (ગુંધી, જીએફ્સ-૩ , જીએએફ્સ-૧૧, એસ-૪૮), તુવેર (બીડએન-૨, વૈશાલી), ચણા (ઝીજારા માટે) જેવા પાકોનું વાવેતર કરી શકાય.
  - હવામાન ચેતવણી:-
- મોબાઇલ સંદેશ :** બી.ટી. કપાસમાં ૪.૫ થી ૫ ફૂટની ઊંચાઈએ ઉપરની ટોચ કાપવી, જેથી સારો ફાલ લાગે.

મુખ્યપાક	પાકઅવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિસલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી )
ચોમાસું મગફળી	ફૂલ/સુયા બેસવા/ડોડવા બંધાવા	સફેદ ફૂગ	<ul style="list-style-type: none"> <li>મગફળીમાં નિદામણ કરવું.</li> <li>મગફળીમાં સફેદ ફૂગનો ઉપદ્રવ અટકાવવા ટ્રાયકોડર્મા ફૂગ ર.૫ કી.ગ્રા./છે. મુજબ ગળતીયા દેશી ખાતર અથવા દિવેલાના ખોળ</li> </ul>

		 <p>पानां टપકा/ घીતરી</p>	<p><b>૫૦૦ કી.ગ્રા./હે. મિશ્ર કરીને જમીનમાં આપવું.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>મગફળીમાં પાનનાં ટપકા અને ગેરુ રોગનો ઉપદ્રવ નાં થાય તે માટે હેકાકોનાઝોલ અથવા ટેચ્યુન્કોનાઝોલ ૧૬ મિલી દવા ૧ પચ્ચમાં નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
કપાસ	ચાપવા, બેસવા, કૂલ ખીલવા, ઝીન્કવા બંધાવા	તડતડીયા, સફેદ માખી અને થ્રીપ્સ	<ul style="list-style-type: none"> <li>તડતડીયા, સફેદ માખી અને થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ફ્લોનીકામીડ ૫૦ ટકા વે.પા. ૪ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો.</li> <li>કપાસમાં ગુલાબી ઈયળના નર ફૂદાને એકત્રીત કરવા માટે હેકટરે ૪૦ ની સંખ્યામાં ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવવાથી ઈયળોનું શરણાતની અવસ્થાથી જ નિયંત્રણ કરી શકાય. કપાસમાં ગુલાબી ઈયળથી નુકશાન પામેલ કૂલ અને ચાપવા તોડીને જમીનમાં ઢાટી દેવા. વધુ નુકશાન હોય તો પ્રોફેનોફોસ ૫૦% છ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા સાયપરમેશ્વીન ૧૦ મિલી બીવેરીયા બાસીઆના ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો.</li> <li>બી.ટી. કપાસમાં યુરીયા અને એમોનિયમ સલેક્ટ અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ દરેક ૩૦ કી.ગ્રા./હે. પુરતી ખાતર તરીકે વરાપે આપવું.</li> <li>બી.ટી. કપાસમાં કૂલ ભમરી, ઝીન્કવા બંધાવા અને ઝીન્કવાના વિકાસની અવસ્થાએ ૨ ટકા પોટેશિયમ નાયટ્રેટના દ્રાવણનો (૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૦૦ ગ્રામ) વરાપે છંટકાવ કરવો.</li> <li>બી.ટી. કપાસમાં વાવેતર બાદ ૬૦, ૭૫ અને ૯૦ દિવસે ૧ ટકા મલ્ટી માયકોન્યુટ્રીયન્ટના દ્રાવણનો (૧૦ લીટર પાણીમાં ૧૦૦ ગ્રામ) છંટકાવ કરવો.</li> <li><b>બી.ટી. કપાસમાં ૪.૫ થી ૫ કૂટની ઊંચાઈએ ઉપરની ટોય કાપવી, જેથી સારો ફાલ લાગે. તેમજ</b></li> <li><b>કપાસના પાકમાં કૂલ ભમરીખરતી અટકાવવા અને સારો ફાલ માટે નેણ્ણોલીન એસેટિક એસોઇનુ ૩૦ પીપીએમ દ્રાવણ છાન્ટવુ (ખાનોફિક્સ ૭.૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાટવું).</b></li> </ul>
તલ	દેહ ધાર્મિક પરિપક્વતા	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>તલ પીળા પાડીને પાન ખરી જાય એટલે સમયસર વરાપે કાપણી કરવી.</li> </ul>
બાજરી	દેહ ધાર્મિક પરિપક્વતા	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>પાકી ગયેલ બાજરીના કુંડા લખીને સલામત સ્થળે ઢાંકી દેવા.</li> </ul>
તુવેર	વૃદ્ધિ/ઉગાવો	તુવેર માટે બીડીએન-૨, ગુજરાત તુવેર – ૧૦૦, ગુજરાત તુવેર હાઈબ્રીડ-૧,	<ul style="list-style-type: none"> <li>વરાપે ઉભા પાકમાં આંતરખેડ અને નિદામણ કરવું.</li> </ul>
દિવેલા	ઉગાવો/વિકાસ	લીલી અને ધોડિયા ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>વરાપે ઉભા પાકમાં આંતરખેડ અને નિદામણ કરવું.</li> <li><b>દીવેલામાં લીલી અને ધોડિયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે</b></li> </ul>

			કલોરાનટાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ત્રણી અથવા ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
કુંગળી ચોમાસું	વૃદ્ધિ	રોગ વળી જવી અને જંબલી ધાખાનો રોગ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>કુંગળીમાં જંબલી ધાખા, ગુયળાવાળનારી કોલેટોટ્રાયકમ અને ફ્યુઝેરીયમ ફૂગનો રોગ લાગે નહિ તે માટે પ્રોપીકોનાઝોલ, મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અને કાર્બન્ડાજીમ ૧૫ ગ્રામ ૧ પણ્મમાં વારાફરતી કોઇપણ એક દવા નાખીને ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણી છંટકાવ કરવા.</li> </ul>
તુરીયા, દૂધી, ગલકા, કારેલા, ગુવાર, કાકડી	ફૂલ/ફળ	શ્રીપસ/ સફેદ માખી કથીરી તળછારો ફળ માખી	<ul style="list-style-type: none"> <li>વેલાવાળા શાકભાજુમાં સફેદમાખીના નિયંત્રણ માટે લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ પ૦૦ મીલી અને ઇમીડાકલોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ મિલી અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ છાંકાવ કરવો.</li> <li>વેલાવાળા શાકભાજુમાં તળછારાના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ પ્રતિ પંપમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>જો ફળ માખીનો ઉપદ્રવ જણાય તો ૫૦ ગ્રામ ગોળ અને ૩૦ મી.લી. મેલાથીઓન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરપે મોટા ફોરાએ છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
ભીડા	ફૂલ/ફળ	સફેદમાખી, પાનકથીરી	<ul style="list-style-type: none"> <li>ભીડામાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ પ૦૦ મીલી અને ઇમીડાકલોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ મિલી અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>ભીડામાં જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.</li> <li>વરસાદ ના હોય તો હળવું પિયત આપવું.</li> <li>ભીડાની શીગની વીજી બાદ ૨૦ કી.ગ્રા./હેક્ટર યુરીયા ખાતર આપવું.</li> </ul>
રોગણી	ફૂલ/ફળ	સફેદ માખી કુંખ અને → ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ	<p>➢ રોગણી અને ટામેટીમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ પ૦૦ મીલી અને ડાયફેન્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી રૂપ મી.લી. દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</p> <p>➢ ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને કલોરાનટાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ત્રણી અથવા ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં</p>

		પાન કથીરી	<p><b>મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ રોગણમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા છસી ૧૫ મિલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
મરચી	વૃધ્ય/કુલ/ફળ	<p>પાનની થ્રીખ્સ → કક્ક</p>  <p>કથીરી</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ મરચીના શરૂઆતના અડપી વિકાસ માટે એમોનિયમ સલેટ અને મયુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર દરેક ૨૫ કી.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર આપવું અને મિક્સ માયકોન્યુટ્રીયન્ટ ૧૦૦ ગ્રામ/પ્રતિ પંપ છાંટવું .</li> <li>➢ ટાયઝોફોસ ૪૦ ઈ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા એસીટેમાપ્રોડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. અને લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. ૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>➢ વાયરસના કારણે પીળા થઈ કુકડાય ગયેલ છોડ ઉપાડી તેનો જમીનમાં દાટો નાશ કરવો. તાં સફેદ માખીથી ફેલાતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે હોસ્ટાથીયોન દ્વારા ૨૦ મી.લી./૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>➢ જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઈથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
લીબુ	ફળનોવિકાસ	<p>સાયલા અને થ્રીખ્સ</p> <p>બદામી ટપકા</p>	<p>લીબુમાં સાયલા અને થ્રીખ્સના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રોડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી અને લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ પ્રોફેનોફોસ ૨૦/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ટાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p> 

		પાનકોરીયુ	<ul style="list-style-type: none"> <li>પાનકોરીયુના નિયંત્રણ માટે કવીનાલફોસ ૨૦ મી.લી. ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાંટવી.</li> </ul>
જમસૂખ	ફળનોવિકાસ	ફળમાખી	<ul style="list-style-type: none"> <li>જામફળીમાં ફળમાખી નિયંત્રણ માટે ફેરોમેન ટ્રેપ મુકવા અને મેલાથીઓન ૫૦ ઇસી ૧૦૦ મિલી. + ૧૫૦ ગોળ ૧૦૦ લીટર પાણીમાં ભેણવી મોટા ફોરાએ સાંજના સમયે છાંટવી.</li> </ul>
પપેયા	ફૂલ અને ફળ	<p>પાન કથીરી</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>હાલ ગરમ અને બેજ વાળા હવામાનના કારણે પપ્યામાં પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ જોવા મળેલ છે. જો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૫૦ ટકા ઇસી ૧૫ મિલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઇ.સી. ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
પશુ/ મરધા	 <p>પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી અને કરમિયાની દવા આપવી... ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટ્રાઝ ૨ મિ.લિ. એક લિટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. વરસાદના સમયે પશુઓને સુરક્ષીત જગ્યાએ રાખવા. ચોમાસા દરમ્યાન જાનવરોને રહેઠાણની જગ્યાની વ્યવસ્થિત સફાઈ તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફિનાઈલ છાંટવું. દુધાળા પ્રાણીઓને નિયમિત ૧ કિલ્લો ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ઘનીજ તત્વોનું મિશ્રણ પ્રતિ ૨ લીટર દુધની ઉપજના પ્રમાણમાં આપવું. તેમજ લીલું ધાસ + સૂકું ધાસ + ઘનીજ તત્વો ખોરાકમાં આપવા. ખુલ્લામાં રાખેલ ધાસસારો વરસાદથી બગડે નહિ તે માટે જરૂરી પગલા ભરવા.</p>		
નોંધ	<p><b>નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>મૌસમ એપ જીલ્લા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે.</li> <li>મેધદૂત એપ હવામાન આધારિત ફૃષ્ટસલાઇ બુલેટીન માટે.</li> <li>દામીની એપ વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે.</li> </ul>		

જા.નં.જુફ્યુ/સ્ક્રે.એગ્રોમેટ/બુવેટીન/ / ૨૦૨૧,  
તરધડીયા(રાજકોટ), તારીખ: ૧૭/૦૯/૨૦૨૧.


તંત્રીશ્રી/દાયરેક્ટરશ્રી,  
રાજકોટ,

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં, રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય  
કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ય કરાવવા નમ્ર વિનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

ટેકનીકલ ઓફિસર  
સુકીએતી સંશોધન કેન્દ્ર  
જનાગઢ ફૂષિ યુનિવર્સિટી  
તરધડીયા

**NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 36  
(03.09.2021 to 09.09.2021) over Agricultural region**

## Gujarat





**Gramin Krushi Mausam Seva  
Main Dry Farming Research Station  
Junagadh Agricultural University  
AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023**  
Cell :94269 38235



**Agromet Advisory Service bulletin No. 49 for North Saurashtra districts(Gujarat)**

(Issued jointly by AMFU-DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)

(Period 18 to 22-September- 2021)

**Significant past weather for the preceding week of Rajkot**

Rainfall (mm)	294.2
Maximum temperature (°C )	25.5-32.4
Minimum temperature (°C )	22.4-24.4
Relative Humidity (%) I	86-97
Relative Humidity (%) II	69-98
Wind speed (Kmph)	3.6-5.3

**Weather forecast until 08-30 hrs. of 22/09/2021**

**(1) RAJKOT DISTRICT:**

	18/09/2021	19/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	22/09/2021
Rainfall (mm)	28	19	24	25	22
Max.Temp.(°C)	31	32	32	32	32
Min.Temp.(°C)	25	25	25	25	25
RH-I (%)	92	92	91	89	86
RH-II (%)	72	68	65	69	73
Wind Speed (kmph)	17	17	18	22	27
Wind Direction(deg.)	248	248	248	252	249
Total CC (octa)	5	3	7	7	8

- Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and Moderate rainfall on 18 to 22-September forecasted.
- Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-32°C and 25-25°C, respectively.
- Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 86-92 % & 65-73,

respectively.

- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 17-27 km/h, respectively.

## (2) MORBI DISTRICT:

	<b>18/09/2021</b>	<b>19/09/2021</b>	<b>20/09/2021</b>	<b>21/09/2021</b>	<b>22/09/2021</b>
Rainfall (mm)	9	10	10	15	15
Max.Temp.(°C)	31	32	32	32	32
Min.Temp.(°C)	25	25	25	25	25
RH-I (%)	86	85	84	82	80
RH-II (%)	62	59	58	57	67
Wind Speed (kmph)	19	21	21	26	34
Wind Direction(deg.)	246	248	249	249	249
Total CC (octa)	4	4	6	7	8

- **Rainfall:** Warm, humid and Partly cloudy to generally cloudy weather and light rainfall on 18 to 22-September forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-32°C and 25-25°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 80-86 % & 57-67, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be SW, W and 19-34 km/h, respectively.

## (3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	<b>18/09/2021</b>	<b>19/09/2021</b>	<b>20/09/2021</b>	<b>21/09/2021</b>	<b>22/09/2021</b>
Rainfall (mm)	23	7	11	12	10
Max.Temp.(°C)	33	33	33	33	32
Min.Temp.(°C)	26	26	26	27	27
RH-I (%)	88	88	87	84	83
RH-II (%)	71	70	68	71	71
Wind Speed (kmph)	19	19	19	26	32
Wind Direction(deg.)	248	248	248	249	249
Total CC (octa)	6	2	5	7	8

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and Light to moderate rainfall on 18 to 22-September forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-33°C and 26-27°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 83-88 % & 68-71, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 19-32 km/h, respectively.

#### (4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	<b>18/09/2021</b>	<b>19/09/2021</b>	<b>20/09/2021</b>	<b>21/09/2021</b>	<b>22/09/2021</b>
Rainfall (mm)	15	17	33	65	65
Max.Temp.(°C)	31	32	32	32	32
Min.Temp.(°C)	25	25	25	25	25
RH-I (%)	86	85	84	84	83
RH-II (%)	63	62	58	62	70
Wind Speed (kmph)	18	19	20	22	29
Wind Direction(deg.)	243	252	252	257	249
Total CC (octa)	5	6	7	8	8

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and Moderate to heavy rainfall on 18 to 22-September forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-32°C and 25-25°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 83-86 % & 58-70, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be SW, W and 18-29 km/h, respectively.

#### (5) AMRELI DISTRICT:

	<b>18/09/2021</b>	<b>19/09/2021</b>	<b>20/09/2021</b>	<b>21/09/2021</b>	<b>22/09/2021</b>
Rainfall (mm)	31	30	65	65	65
Max.Temp.(°C)	32	33	33	32	32
Min.Temp.(°C)	24	24	25	25	25
RH-I (%)	93	94	93	92	89
RH-II (%)	77	73	70	72	75
Wind Speed (kmph)	17	16	17	20	23
Wind Direction(deg.)	248	248	248	248	249
Total CC (octa)	6	4	8	7	8

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and Moderate to heavy rainfall on 18 to 22-September forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-33°C and 24-25°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 89-94 % & 70-77, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 16-23 km/h, respectively.

## (6) JAMNAGAR DISTRICT:

	<b>18/09/2021</b>	<b>19/09/2021</b>	<b>20/09/2021</b>	<b>21/09/2021</b>	<b>22/09/2021</b>
Rainfall (mm)	32	8	11	19	10
Max.Temp.(°C)	31	32	32	32	31
Min.Temp.(°C)	26	26	27	27	27
RH-I (%)	89	89	88	86	84
RH-II (%)	72	69	67	70	71
Wind Speed (kmph)	18	19	19	25	31
Wind Direction(deg.)	248	248	248	252	249
Total CC (octa)	5	2	6	7	8

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and light to moderate rainfall on 18 to 22-September forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-32°C and 26-27°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 84-89 % & 67-72, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 18-31 km/h, respectively.

## Agro meteorological Advisories:

<b>General Advice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keeping in view of threat of COVID-19 spread farmers are advised to follow the government guidelines, personal hygiene, use mask, ensure hand washing with soap at reasonable interval, social distancing of 6 feet during harvesting and other agricultural operation in all crops.</b></li> <li>• <b>Weather outlook for subsequent week:</b> As per extended range forecast, humid and generally cloudy to cloudy weather and light to Moderate rainfall likely to observe during 22 to 27-September 2021.</li> <li>• <b>Due to forecast of heavy to very heavy rain fall during 18-22 September-2021 make provision to drain out excess rain water from field, harvest and store it in reservoir.</b></li> <li>• <b>Due to continuous rain and wet condition drain out excess runoff water from low-lying area in field immediately for prevention of wilting in all crops.</b></li> <li>• <b>Apply Urea, ammonium sulphate and murate of potash fertilizers each @ 30 kg/ha in cotton, chilli and other fruiting vegetables immediately to revive growth and to prevent wilting at vapsa condition.</b></li> <li>• <b>In the field where kharif crops wilted or damaged severely and need to resowing, then sowing of Ajwain, suwa, castor and sesame and chick pea for green pod are advise.</b></li> <li>• <b>Also make spray of Mencozeb fungicide @ 27 gm/10 litre of water for prevention Alternaria and other fungal diseases in cotton and vegetable crops under clear</b></li> </ul>
-----------------------	---

	<b>weather.</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postpone harvesting of bunch groundnut, sesame, pearl millet crops due to forecast of rain fall for next five days.</li> <li>• Under complete failure of timely sown crops due to prolong dry spell and then if sufficient rainfall received during this spell, carry out sowing of Ajwain (Guj.- Ajama-1 &amp; 2), Sesame (Guj. Sesame-3 &amp; 4, Purva-1), castor (GCH-4,7), Sorghum fodder ( Gundhari, GFS-3, GAES-11, CSV-21F, S-1049), Pigeon pea (BDN-2, Vaishali,GJP-1), chick pea (for green pod).</li> <li>• <b>Sms :</b> Detopping of cotton should be done in crop having 4.5-5 feet height.</li> </ul>		
Crops	Stage	Insect/Pest/ Variety	Advisory
<b>Kharif groundnut</b>	Pod formation/development	Stem rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Carry out weeding</b></li> <li>• <b>Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungus with well decopost FYM OR castor cake @ 500 kg/ha as preventive measures against Sclerotium rolfsii stem rot.</b></li> <li>• <b>Spray Tebuconazole 10 ml/10 lit of to prevent leaf spot infestation in groundnut under clear sky.</b></li> </ul>
<b>Cotton</b>	Squaring /flowering/ball formation & development	Thrips, white fly & Jassids	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Under present weather condition, infestation of Jassids, whitefly and thrips observe in cotton, for control the pest spray Flonicamid 50 % WG % 4gm/ 10 lit of water under clear sky..</b></li> <li>• <b>Farmers are advised to apply Urea, ammonium sulphate and murate of potash fertilizers each @ 30 kg/ha in cotton at vapsa condition.</b></li> <li>• For the monitoring of pink bollworm infestation in cotton crop farmers are advised to put pheromone traps 6-8/ha. <b>If infestation found,pick and burry the infested flowers/bolls in soil for control of pink bollworm infestation in cotton. Also make spray of profenofos 50 EC 20 ml in 10 liters of water.</b></li> <li>• <b>Farmers are advised to spray 3 % KNO<sub>3</sub> solution in at flowering, boll initiation and 50% boll formation to Bt. Cotton crop under irrigated condition under clear weather.</b></li> <li>• <b>Foliar spraying of multi-micronutrient formulation Grade IV (Fe-Mn-Zn-CuB, 4.0-1.0-6.0-0.5-0.5 %) @ 1% at 60, 75 and 90 DAS in Bt. cotton crop is advised under irrigated condition under clear</b></li> </ul>

			<p><b>weather.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detopping of cotton should be done in crop having 4.5-5 feet height.</li> <li>• Under present weather, farmers are advised to spray 30 ppm Naphthalene Acetic Acid solution ( planofix 7.5 ml/10 liter of water) under clear weather.</li> </ul>
Sesame	Physiological maturity	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harvest the crop in time after wet spell.</li> </ul>
Pearl millet	Physiological maturity	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harvest the crop in time.</li> </ul>
Pigeon pea	Growing	BDN-2, GT-100, GJP-1, Vaishali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carry out inter culturing and weeding.</li> </ul>
Castor	Germination/growing	Heliothis and semilooper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To control Heliothis &amp; semilooper in castor spray chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml or /10 litre of water is advised.</li> </ul>
Onion Kharif	Sowing/Growing	Purple blotch blight & Ring diseases 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To prevent purple blotch blight, colletrotrichum and fusarium fungus disease infestation in onion make 3 alternate spray of Propiconazole 15 ml, Mencozeb 25 gm and Carbendazim 10 gm in 10 litre of water at 15 days interval.</li> <li>• To control weed spray oxyflourfen 10 ml/10 litre of water.</li> </ul>
Ridge gourd, Bottle gourd, Sponge guard, Bittergourd, Cluster bean, Water melon	Flowering & fruiting	White flies/  Mites  Fruit fly  Downy mildew	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In all vegetable crops, whitefly infestation observed above ETL, for control of whitefly, spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml neem oil or acetamiprid 20 % SP@ 5.0 g or imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water.</li> <li>• If population of mite is observed, then to control it, do spraying of Ethion 50 EC 15 ml in 10 litre of water.</li> <li>• For the control of fruit fly make spray solution of 50 gm jaggery and 30 ml Malathion in 10 litre of water with large droplets.</li> <li>• For the control of downy mildew, Spray Mancozeb 75 WP 35 g mix in 10 litre of water.</li> </ul>
Ladyfinger	Flowering/fruiting	Mites	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constant monitoring of lady finger crop against</li> </ul>

	iting	White flies/Jassids	<p><b>attack of miteis advised. If population is found more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water is advised.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>For control of whitefly&amp;jassids in Okra, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml neem oil or acephate75 % SP@ 15 gm or imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water.</li> <li>After harvesting of mature okra, urea should be applied @ 15-20 kg/ha.</li> </ul>
Brinjal	Flowering/ fruiting	<p><b>Sucking pest</b>→</p> <p><b>Shoot &amp;Fruit borer</b></p> <p><b>Mites</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of water.</li> <li>In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato crops, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If insect population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole18.5 % SC 3.0 ml or DDVP 7 ml/10 litre of water is advised.</li> <li>If infestation of mite is observed in brinjal, then spraying of Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water.</li> </ul>
Chili	Flowering & fruiting	<p><b>Thrips</b>→</p>  <p>Leaf curling Virus→</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Under present weather condition in transplanted hybrid chili to push up growth make application of ammonium sulphate and murate of potash fertilizers each @ 25 kg/ha and make spraying of mix micronutrients 100 gm/10 lit. ofwater.</li> <li>For the control of thrips in chili make sparayof of profenofos 20 ml with 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of heavy attack, spray of spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of water.</li> <li>Under present weather conditions, rouging of viral infested plants should be done in chili. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Imidacloprid @ 5 ml per 10litre of water is advisedfor control the vector, when sky remains clear.</li> </ul>

		Mites	<ul style="list-style-type: none"> <li>Constant monitoring of the chilli crop against attack of mites is advised If population is found more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water.</li> </ul>
Lemon	Fruit development	<b>Psylla and thrips</b>  <b>Citrus canker</b>  <b>Leaf minor</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>To prevent damage of psylla &amp; thrips spray imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of water.</li> <li>Spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclin 1.5 gm in 10 litre of water</li> <li>Spray Quinalphos 20 ml in 10 litres of water for control of leafminor.</li> </ul>
Guava	Fruit development	Fruit fly	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of fruit fly in Guava put 5-6 Pheroman trap/ha and spray Malathion 50 % EC 100 ml + 150 gm jaggery solution in 100 litre water during evening hours with large spray droplets.</li> </ul>
Papaya	Flowering & fruiting	Mites 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Due to hot and humid weather mite infestation observed in papaya and if infestation observe above ETL then spray Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water.</li> </ul>
Livestock & poultry		Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. Deworming, Protozoan disease evaluation and its treatments should be done. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed. Ensure regarding vaccination of animals for different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly's and mosquitoes. Keep fodder in safe place to avoid spoilage due to rainfall.	
Note	<b>Kindly download</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>MAUSAM App</b> for location specific forecast &amp; warning.</li> <li><b>MEGHDOOT App</b> for Agromet advisory.</li> <li><b>DAMINI App</b> for lighting warning.</li> </ul>		

**NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 36  
(03.09.2021 to 09.09.2021) over Agricultural region**

**Gujarat**

