



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમસેવા
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતખાંબોહવાકીય વિભાગ
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરધડિયા-૩૬૦૦૦૨૩
મો.નં. ૮૪૨૬૬૩૮૨૩૫
તા.૨૦-૦૮-૨૦૨૧ થી તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૧



(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સૂકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જી.ક્યુ.તરધડિયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)
ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓનું કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૪૧/૨૦૨૧
પાછલા અઠવાડીયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિબળો	
વરસાદ(મી.મી)	0.0
મહત્વમાનાન(સે.ગ્રે)	33.0-35.5
લઘુત્વમાનાન(સે.ગ્રે)	22.0-23.4
ભેજ (%) સવાર	79-89
ભેજ (%) બપોરબાદ	47-62
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	4.1-6.7

હવામાન આગાહી :પત્રક-૫

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતખાંબોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી ૨૪-૦૮-૨૦૨૧ સવારના ૮.૩૦સુધી

તા.૨૦-૦૮-૨૦૨૧ થી ૨૪-૦૮-૨૦૨૧

કૃષિસલાહ :

- ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા વિભાગ ,જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ,તરધડીયા તરફથી જણાવવામાં આવેછે કે ,ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત ખાંબોહવાકીય વિસ્તારના

રાજકોટ :

તારીખ પેરામોટર	દિવસ-૧ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૧-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૨-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૩-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૪-૦૮-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	6	10	13	1	3
મહત્વમાનાન(સે.ગ્રે)	33	33	32	33	34
લઘુત્વમાનાન(સે.ગ્રે)	25	25	24	25	25
મહત્વમભેજ (%) સવાર	75	74	78	78	76
લઘુત્વમભેજ (%) બપોરબાદ	51	48	52	45	41
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	19	17	13	18	22
પવનની દિશા(ડીગ્રી)	270	283	270	248	248
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	5	7	8	5	6

- રજકોટ જીલ્લામાં આગામી તા.૨૦-૦૮-૨૦૨૧ થી તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૨૦ થી ૨૪ ના રોજ છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન **૩૨-૩૪** ડિગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્વમાન રાત્રી દરમ્યાન **૨૪-૨૫** ડિગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્વમાન ભેજનું પ્રમાણ અનુકૂળે **૭૪-૭૮** અને **૪૧-૫૨ ટકા** રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૧૩** થી **૨૨ કીમી/કલાક** રહેવાની શક્યતા છે.

મોરબી:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૧-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૨-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૩-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૪-૦૮-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	3	2	18	0	0
મહત્વમાન તાપમાન(સ.ગ્રે)	33	33	32	33	34
લઘુત્વમાન(સ.ગ્રે)	25	25	24	25	25
મહત્વમાન ભેજ (%) સવાર	75	71	76	72	74
લઘુત્વમાન ભેજ (%) બપોરબાદ	60	44	55	43	43
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	21	20	17	23	27
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	248	249	248	248	248
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	3	7	8	5	7

- મોરબી જીલ્લામાં આગામી તા.૨૦-૦૮-૨૦૨૧ થી તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૨૦ થી ૨૪ ના રોજ છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન **૩૨-૩૪** ડિગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્વમાન રાત્રી દરમ્યાન **૨૪-૨૫** ડિગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્વમાન ભેજનું પ્રમાણ અનુકૂળે **૭૧-૭૬** અને **૪૩-૬૦** રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૧૭** થી **૨૭ કીમી/કલાક** રહેવાની શક્યતા છે.

દેવભૂમિદ્વારકા:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૧-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૨-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૩-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૪-૦૮-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	5	0	1
મહત્વમાન તાપમાન(સ.ગ્રે)	32	32	31	30	32
લઘુત્વમાન(સ.ગ્રે)	26	26	25	25	26
મહત્વમાન ભેજ (%) સવાર	78	77	82	81	80
લઘુત્વમાન ભેજ (%) બપોરબાદ	60	61	63	56	59
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	23	20	16	19	24
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	257	270	257	248	248
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	2	5	8	4	5

- દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં આગામી તા.૨૦-૦૮-૨૦૨૧ થી તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૨૦ અને ૨૪ ના રોજ છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન **૩૦-૩૨** ડિગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્વમાન તાપમાન

રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુકૂળે ૭૭-૮૨ અને ૫૬-૬૩ રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૬ થી ૨૪ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

સુરેન્દ્રનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૧-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૨-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૩-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૪-૦૮-૨૦૨૧
વરસાદ (મી.મી.)	5	3	17	8	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	33	33	32	33	34
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	25	25	24	25	25
મહત્વમાન ભેજ (%) સવાર	73	73	73	70	72
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરખાદ	54	50	54	46	41
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	19	15	14	20	24
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	252	270	257	248	248
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	6	7	8	6	7

- સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૨૦-૦૮-૨૦૨૧ થી તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ૨૦ થી ૨૩ ના રોજ છુટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૨-૩૪ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૫ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુકૂળે ૭૦-૭૩ અને ૪૧-૫૪ રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૪-૨૪ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

અમરેલી :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૧-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૨-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૩-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૪-૦૮-૨૦૨૧
વરસાદ (મી.મી.)	39	15	12	13	11
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	31	32	30	32	33
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	25	25	24	24	25
મહત્વમાન ભેજ (%) સવાર	83	82	85	89	86
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરખાદ	65	52	61	56	50
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	15	14	11	16	19
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	257	283	252	248	248
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	7	7	8	5	6

- અમરેલી જીલ્લામાં આગામી તા.૨૦-૦૮-૨૦૨૧ થી તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા.૨૦ થી ૨૪ ના રોજ છુટાછવાયા વિસ્તારમાં મધ્યમ થી ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૦-૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૫ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુકૂળે ૮૨-૮૮ અને ૫૦-૬૫ રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૧ થી ૧૮ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

જામનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૧-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૨-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૩-૦૮-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૪-૦૮-૨૦૨૧

વરસાદ (મી.મી.)	0	0	15	0	1
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	31	32	32	33	33
લધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	27	27	27	28	28
મહત્તમ ભેજ (%) સવાર	75	74	79	78	78
લધુતમ ભેજ (%) બ્યૂરોબાદ	56	56	58	51	52
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	22	19	16	20	25
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	270	270	270	248	248
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	3	5	8	5	6

- જામનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૨૦-૦૮-૨૦૨૧ થી તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળાયું રહેશે અને તા. ૨૨ અને ૨૪ ના રોજ છુટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન **૩૧-૩૩** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લધુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન **૨૭-૨૮** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લધુતમ ભેજનું પ્રમાણ અનુકૂળે **૭૪-૭૮** અને **૫૧-૫૮** રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૧૬** થી **૨૫** કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

- કોરોના વાયરસ ના સંક્રમણને અટકાવવા એતી કાર્યો અને એત પેદાશના વેચાણ અને બીજ, ખાતર અને દવાઓની ખરીદી દરમ્યાન મો પર કપડું (માસ્ક) બાંધી રાખવું અને બે વ્યક્તિ વચ્ચે ૬ થી ૭ ફૂટ અંતર જાળવવું.
- તા.૨૪ થી **૨૮-ઓગસ્ટ-૨૦૨૧**: હવામાન આગોતરો વરતારો : તા.૨૪ થી ૨૮-ઓગસ્ટ-૨૦૨૧ દરમ્યાન ગરમ, ભેજવાળું અને મોટાભાગે વાદળાયું રહેશે, આટકા સાથેનો ભારે પવન (૨૫-૪૦ કી.મી./કલાક) અને માત્ર હળવા વરસાદની શક્યતા છે.
- ઉભા પાકમાં વરસાદના અભાવે ભેજની ખેંચ હોય તો નીચે મુજબના પગલા લેવા.
- ઉભા પાકમાં ભેજ જળવાય રહેતે માટે આંતરખેડ અને નિંદામણ કરવું.
- ઉભા પાકમાં યુસીયા જીવાતોનું નિયંત્રણ કરવા ઈમીડાકલોપ્રોડ ૩૦.૫ ટકા ૪ મી.લી. ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાંટવી.
- ભેજની ખેંચ હોય ત્યારે કોઇપણ પ્રકારના ખાતરનો છંટકાવ કરવો નહિ.
- ભેજની અધ્યતની સ્થિતિમાં કેઓલીન ૪૦૦ ગ્રામ ૧૦ લિટરે પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
- ઉભા પાકમાં ભેજ બચાવવા ઘઉંના કુંવર, મગફળીની ફોતરી તેમજ અન્ય હાથવગી એત આડપેદાશનું આવરણ કરવું.
- વરસાદને અભાવે જમીનમાં ભેજની ખેંચ હોય ત્યાં ઉભા પાકને ટીપા/સ્પ્રીન્કલર પદ્ધતિથી પિયત આપવું.
- જે વિસ્તારમાં અપૂરતા વરસાદને કારણો આગલો પાક નિષ્ફળ ગયો હોય તો હવે વરસાદ થાય તો અજમા (ગુજરાત-૧ & ૨), તલ (ગુજરાત-૩ & ૪, પૂર્વ-૧), દિવેલા (જુસીએચ-૪, ૭), ચારાની જીવાર (ગુંધી, જીએફ્સ-૩, જીએએફ્સ-૧૧, એસ-૪૮), તુવેર (બીડએન-૨, વૈશાલી), સોયાબીન (ગુજ. સોયાબીન ૧,૩), મગ (ગુજ. મગ-૪) અને અડદ (ગુ-૧, તી-૬) જેવા પાકો લઈ શકાય.
- હવામાન ચેતવણી:-
- મોબાઇલ સેટશા:** કપાસમાં થીપ્સ અને તડતડીયાના નિયંત્રણ માટે એસીફેટ ૭૫ ટકા ૧૫ ગ્રામ અને ૧૫૦૦ પીપીએમ લીમડાનું તેલ ૪૦ મીલી ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

મુખ્યપાક	પાકઅવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કષિસલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી)
ચોમાસું મગફળી	ફૂલ/સુયા બેસવા/ડોડવા બંધાવા	-	<ul style="list-style-type: none"> • મગફળીમાં આંતરખેડ અને નિદામણ કરવું. • મગફળીમાં સફેદ ફૂગનો ઉપદ્રવ અટકાવવા ટ્રાયકોડમાં ફૂગ ર.પ કી.ગ્રા./હે. મુજબ ગણતીયા દેશી ખાતર અથવા દિવેલાના ખોળ પ૊ંઠ કી.ગ્રા./હે. મિશ્ર કરીને જમીનમાં આપવું. • મગફળીમાં પાનનાં ટપકાના રોગનો ઉપદ્રવ નાં થાય તે માટે હેકાકોનાઝોલ અથવા ટેબ્યુંકોનાઝોલ ૧૬ મિલી દવા ૧ પચ્ચમાં નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો.
કપાસ	ચાપવા બેસવા, ફૂલ ખીલવા	થ્રીપ્સ અને તડતડીયા	<ul style="list-style-type: none"> • કપાસમાં થ્રીપ્સ અને તડતડીયાના નિયંત્રણ માટે એસીફેટ ૭૫ ટકા પાવડર ૧૫ ગ્રામ અને ૧૫૦૦ પીપીએમ લીમડાનું તેલ ૪૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. • કપાસમાં આંતરખેડ અને નિદામણ કરવું અને પાળા બાંધવા.
તલ	ફૂલ/બેઢાં	પાન કથીરી	<ul style="list-style-type: none"> • તલમાં જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. • તલમાં નિદામણ કરવું.
બાજરી	દાણા ભરાવા	-	<ul style="list-style-type: none"> • બાજરીમાં નિદામણ કરવું.
મગ	ફૂલ/શીંગ	-	<ul style="list-style-type: none"> • ઉભા પાકમાં નિદામણ કરવું. • પાકલી શીંગો સમયસર વીણા લેવી.
અડદ	ફૂલ/શીંગ	-	<ul style="list-style-type: none"> • ઉભા પાકમાં નિદામણ કરવું. • અડદમાં થડની માખીના ઉપદ્રવનું નિરિક્ષણ કરતા રહેવું, જો ઉપદ્રવ વધુ હોય તો ડોડીવીપી ૭ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
ચોળી	શીંગ પરીપક્વતા	-	<ul style="list-style-type: none"> • ઉભા પાકમાં નિદામણ કરવું. • ચોળીમાં વાયરસને કારણે પીળા પડેલ છોસ ઉપાડીને જમીનમાં દાટીદેવા. • પાકલી શીંગો સમયસર વીણા લેવી.
તુવેર	વૃદ્ધિ /ઉગાવો	તુવેર માટે બીડીએન-૨, ગુજરાત તુવેર – ૧૦૦, ગુજરાત તુવેર હાઇબ્રીડ-૧,	<ul style="list-style-type: none"> • ઉભા પાકમાં આંતરખેડ અને નિદામણ કરવું.
દિવેલા	વાવેતર/ઉગાવો	GC-3, GCH-4, અથવા ૭	<ul style="list-style-type: none"> • ઉભા પાકમાં આંતરખેડ અને નિદામણ કરવું.
ઘાસ ચારાના પાક	જીવાર	સાંઠાની માખી	<ul style="list-style-type: none"> • જીવારના પાકમાં સાંઠાની માખીનો ઉપદ્રવ ના થાય તે માટે સતત નિરિક્ષણ કરતા રહેવું, જો ઉપદ્રવ વધુ હોય તો ઇમીડાક્લોપ્રોડ ૧૭.૮ ટકા એસ.એલ. ૫ મિ.લી./૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
	મકાઈ	ફોલ આર્મા વર્મ	<ul style="list-style-type: none"> • મકાઈના પાકમાં ફોલ આર્મા વર્મનો ઉપદ્રવ ના થાય તે માટે માટે સતત નિરિક્ષણ કરતા રહેવું, જો ઉપદ્રવ વધુ હોય તો રીનક્ષીપાયર ૨૦ એસ.સી. ૪ મિ.લી./૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

કુંગળી ચોમાસું	સીધું બીજથી વાવેતર/ફેર રોપણી	રોગ વળી જવી અને જંબલી ધાબાનો રોગ	<ul style="list-style-type: none"> કુંગળીમાં જંબલી ધાબા, કોલેટોટ્રાયકમ અને ફ્યુઝેરીયમ ફૂગનો રોગ લાગે નહિ તે માટે પ્રોપીકોનાઝોલ, મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અને કાર્બન્ડાઝીમ ૧૫ ગ્રામ ૧ પમ્પમાં વારાફરતી કોઇપણ એક દવા નાખીને ૧૫ દિવસના અંતરે ૩ છંટકાવ કરવો.
તુરીયા, દૂધી, ગલકા, કારેલા, ગુવાર, કાકડી	ફૂલ/ફળ	તળારો	<ul style="list-style-type: none"> વેલાવાળા શાકભાજુમાં તળારાના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ પ્રતિ પંપમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
ભીડા	ફૂલ/ફળ	સફેદમાખી, પાનકથીરી	<ul style="list-style-type: none"> ભીડામાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીંબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ પ૦૦ મીલી અને ઇમીડાકલોપ્રૈટ ૩૦.૫ ટકા ૪ મિલી અથવા એસીટેમાપ્રૈટ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ભીડામાં જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. વરસાદ ના હોય તો હળવું પિયત આપવું. ભીડાની શીગની વીણી બાદ ૨૦ કી.ગ્રા./હેક્ટર યુરીયા ખાતર આપવું.
રોગણી	ફૂલ/ફળ	સફેદ માખી દુંખ અને → ફળ કોરી ખાનાર ઈયણ પાન કથીરી	<ul style="list-style-type: none"> સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીંબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ પ૦૦ મીલી અને ડાયેફેન્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ અથવા ટાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ મિ.લી. દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ફળ અને ડોકાની ઇયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને ક્લોરાનટાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા તુ મિલી અથવા ડિડીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. રોગણમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૫૦ ટકા ઈસી ૧૫ મિલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
મરચી	વૃધ્ઘા/ફૂલ/ફળ	પાનની શ્રીપસ→ 	<ul style="list-style-type: none"> ટાયઝોફોસ ૪૦ ઈ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા એસીટેમાપ્રૈટ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. અને લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીંબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ પ૦૦ મીલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. વાયરસના કારણે પીળા થઈ ફુકડાય ગયેલ છોડ ઉપાડી તેનો જમીનમાં દાંટી નાશ કરવો. ત્યાં સફેદ માખીથી ફેલાતો હોવાથી

		<p>પાનની કુકડ-</p>  <p>કથીરી</p>	<p>તેના નિયંત્રણ માટે હોસ્ટાથીઓન દવા ૨૦ મી.લી./૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p> <p>➢ જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો છથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ છાંકાવ કરવો.</p>
લીબુ	ફળનોવિકાસ	<p>પાનકોરીયુ</p> <p>કથીરી→</p>  <p>બળીઆ ટપકા અને ગુંદરિયો</p>	<ul style="list-style-type: none"> • પાનકોરીયુના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાકલોપ્રોડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મી.લી. ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાંટવી. • લીબુડીમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો પ્રોપરગાઈટપ્રે ઈ.સી. ૧૦ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટરપાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. <p>• લીબુમાં બળીઆ ટપકા અને ગુંદરિયો રોગના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્સી ક્લોરાઈટ ૪૦ ગ્રામ અને સ્ટ્રેપટોમાયસીન સલ્ફેટ ૧ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</p>
જમરૂખ	ફળનોવિકાસ	ફળમાખી	<ul style="list-style-type: none"> • જામફળીમાં ફળમાખી નિયંત્રણ માટે ફેરોમેન ટ્રેપ મુકવા અને મેલાથીઓન ૫૦ ઇસ્સી ૧૦૦ મિલી. + ૧૫૦ ગોળ ૧૦૦ લીટર પાણીમાં ભેણવી મોટા ફોરાએ સાંજના સમયે છાંટવી.
પશુ/ મરધા		<p>ઇતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટ્રોઝ ૨ મિ.લિ. એક લિટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. કરમિયાની દવા, ટી.બી. તથા જે.ડી ના રોગની પરખ કરાવવી. વરસાદના સમયે પશુઓને સુરક્ષીત જગ્યાએ રાખવા. ચોમાસા દરમ્યાન જાનવરોને રહેઠાણની જગ્યાની વ્યવસ્થિત સફાઈ તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફિનાઈલ છાંટવું, દુધાળા પ્રાણીઓને નિયમિત ૧ કિલ્લો ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ઘનીજ તત્વોનું મિશ્રણ પ્રતિ ૨ લીટર દુધની ઊપજના પ્રમાણમાં આપવું. તેમજ લીલું ધાસ + સૂકું ધાસ + ઘનીજ તત્વો ઘોરાકમાં આપવા.</p> <p>ખુલ્લામાં રાખેલ ધાસસારો વરસાદથી બગડે નહિ તે માટે જરૂરી પગલા ભરવા.</p>	
નોંધ	<p>નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો</p> <ul style="list-style-type: none"> • મૌસમ એપ જીલ્લા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે. • મેધદૂત એપ હવામાન આધારિત ફણિસલાહ બુલેટીન માટે. • દામીની એપ વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે. 		


જા.નં.જુફ્યુ/સ્ક્રે.એગ્રોમેટ/બુલેટીન/ / ૨૦૨૧,
તરધડિયા(રાજકોટ), તારીખ: ૧૬/૦૮/૨૦૨૧.

તંત્રીશ્રી/દાયરેકટરશ્રી,
રાજકોટ,

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય
કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ય કરાવવા નભ વિનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

ટેકનીકલ ઓફિસર
સુકીયેતી સંશોધન કેન્દ્ર
જુનાગઢ ફણ્ટ યુનિવર્સિટી
તરધડીયા

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 32
(06.08.2021 to 12.08.2021) over Agricultural region



Agricultural vigour is moderate over isolated places of the state.



Gramin Krushi Mausam Seva
Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023
Cell :94269 38235



Agromet Advisory Service bulletin No. 41 for North Saurashtra districts(Gujarat)

(Issued jointly by AMFU-DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)

(Period 20 to 24 -August- 2021)

Significant past weather for the preceding week of Rajkot

Rainfall (mm)	0.0
Maximum temperature (°C)	33.0-35.5
Minimum temperature (°C)	22.0-23.4
Relative Humidity (%) I	79-89
Relative Humidity (%) II	47-62
Wind speed (Kmph)	4.1-6.7

Weather forecast until 08-30 hrs. of 24/08/2021

(1) RAJKOT DISTRICT:

	20/08/2021	21/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
Rainfall (mm)	6	10	13	1	3
Max.Temp.(°C)	33	33	32	33	34
Min.Temp.(°C)	25	25	24	25	25
RH-I (%)	75	74	78	78	76
RH-II (%)	51	48	52	45	41
Wind Speed (kmph)	19	17	13	18	22
Wind Direction(deg.)	270	283	270	248	248
Total CC (octa)	5	7	8	5	6

- Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather forecasted for next five days and only light to moderate rainfall forecasted during 20 to 24-August forecasted, respectively.
- Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-34°C and 24-

25°C, respectively.

- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 74-78 % & 41-52, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 13-22 km/h, respectively.

(2) MORBI DISTRICT:

	20/08/2021	21/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
Rainfall (mm)	3	2	18	0	0
Max.Temp.(°C)	33	33	32	33	34
Min.Temp.(°C)	25	25	24	25	25
RH-I (%)	75	71	76	72	74
RH-II (%)	60	44	55	43	43
Wind Speed (kmph)	21	20	17	23	27
Wind Direction(deg.)	248	249	248	248	248
Total CC (octa)	3	7	8	5	7

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather forecasted for next five days and only light to moderate rainfall forecasted during 20 to 22-August forecasted, respectively.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-34°C and 24-25°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 71-76 % & 43-60, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 17-27 km/h, respectively.

(3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	20/08/2021	21/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
Rainfall (mm)	0	0	5	0	1
Max.Temp.(°C)	32	32	31	30	32
Min.Temp.(°C)	26	26	25	25	26
RH-I (%)	78	77	82	81	80
RH-II (%)	60	61	63	56	59
Wind Speed (kmph)	23	20	16	19	24
Wind Direction(deg.)	257	270	257	248	248
Total CC (octa)	2	5	8	4	5

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather forecasted for next five days and only light rainfall forecasted during 22 and 24-August forecasted, respectively.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-32°C and 25-26°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 77-82 % & 56-63, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 16-24 km/h, respectively.

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	20/08/2021	21/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
Rainfall (mm)	5	3	17	8	0
Max.Temp.(°C)	33	33	32	33	34
Min.Temp.(°C)	25	25	24	25	25
RH-I (%)	73	73	73	70	72
RH-II (%)	54	50	54	46	41
Wind Speed (kmph)	19	15	14	20	24
Wind Direction(deg.)	252	270	257	248	248
Total CC (octa)	6	7	8	6	7

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather forecasted for next five days and only light to moderate rainfall forecasted during 20 to 24-August forecasted, respectively.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-34°C and 24-25°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 70-73 % & 41-54, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 14-24 km/h, respectively.

(5) AMRELI DISTRICT:

	20/08/2021	21/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
Rainfall (mm)	39	15	12	13	11
Max.Temp.(°C)	31	32	30	32	33
Min.Temp.(°C)	25	25	24	24	25
RH-I (%)	83	82	85	89	86
RH-II (%)	65	52	61	56	50
Wind Speed (kmph)	15	14	11	16	19
Wind Direction(deg.)	257	283	252	248	248
Total CC (octa)	7	7	8	5	6

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather forecasted for next five days and only Moderate to heavy rainfall forecasted during 20 to 24-August forecasted, respectively.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-33°C and 24-25°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 82-89 % & 50-65, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 11-19 km/h, respectively.

(6) JAMNAGAR DISTRICT:

	20/08/2021	21/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
Rainfall (mm)	0	0	15	0	1
Max.Temp.(°C)	31	32	32	33	33
Min.Temp.(°C)	27	27	27	28	28
RH-I (%)	75	74	79	78	78
RH-II (%)	56	56	58	51	52
Wind Speed (kmph)	22	19	16	20	25
Wind Direction(deg.)	270	270	270	248	248
Total CC (octa)	3	5	8	5	6

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy weather forecasted for next five days and **only light to moderate rainfall forecasted during 22 and 24-August forecasted, respectively.**
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-33°C and 27-28°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 74-79 % & 51-58, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W and 16-25 km/h, respectively.

Agro meteorological Advisories:

General Advice	<ul style="list-style-type: none"> • Keeping in view of threat of COVID-19 spread farmers are advised to follow the government guidelines, personal hygiene, use mask, ensure hand washing with soap at reasonable interval, social distancing of 6 feet during harvesting and other agricultural operation in all crops. • Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast, humid and generally cloudy to cloudy weather, gusty wind (25-35 km/h) and light rainfall likely to observe during 29 to 29-August 2021. • Under moisture stress condition following activity should be taken to save crop • Carry out interculturing and weeding as per need in all kharif crops. • To protect crop against sucking pests like jassid, thrips and aphid spray imidachlopride 17.8 SL 5 ml/10 litre water. • Do not apply any kind fertilizer under moisture stress condition. • Spray Kaoline 4 % solution i.e 400 gm kaolin in 10 litre of water. • Straw, groundnut shell and agricultural waste mulching is advisable under moisture stress condition. • Due to continuous dry spell apply life saving irrigation through drip/sprinkler under moisture stress condition. • Under complete failure of timely sown crops due to prolong dry spell and then if monsoon revive, carry out sowing of Ajwain (Guj.-Ajama-1 & 2), Sesame (Guj. Sesame-3 & 4, Purva-1), castor (GCH-4,7), Sorghum fodder (Gundhari, GFS-3,
-----------------------	---

	<p>GAFS-11,CSV-21F, S-1049), Pigeon pea (BDN-2,Vaishali,GJP-1), Soybean (GS-1,3), Green gram (Variety GM-4)/ Black gram (GU 1, T-9).</p> <ul style="list-style-type: none"> Sms : Under present weather condition, thrips & jassids infestation observed in cotton, spray acephate 75 % SP 15 gm with 1500 ppm neem oil 40 ml /10 litre of water. 		
Crops	Stage	Insect/Pest/ Variety	Advisory
Kharif groundnut	Pod formation	-	<ul style="list-style-type: none"> Carry out interculturing to remove weeds Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungus with well decopost FYM OR castor cake @ 500 kg/ha as preventive measures against Sclerotium rolfsii stem rot. Spray Tebuconazole 10 ml/10 lit of to prevent leaf spot infestation in groundnut.
Cotton	Squaring /flowering	Thrips & Jassids	<ul style="list-style-type: none"> Under present weather condition, thrips & jassids infestation observed in cotton, at above ETL spray acephate 75 % SP 15 gm with 1500 ppm neem oil 40 ml /10 litre of water. Carry out interculturing & weeding to remove weed and conserve soil moisture. Do earthing up in timely sown cotton crop.
Sesame	Flowleirng & capsule formation		<ul style="list-style-type: none"> Carry out inter culturing and weeding. For mite control in sesame spray Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water.
Pearl millet	Grain fillling	-	<ul style="list-style-type: none"> Carry out weeding as per need.
Green gram	Pod formation/dev elopment	-	<ul style="list-style-type: none"> Carry out weeding as per need.
Black gram	Pod formation/dev elopment	-	<ul style="list-style-type: none"> Carry out weeding as per need. Monitor the crop against stem fly damage, if damage found above ETL then spray DDVP 7 ml/10 litre of water.
Cow pea	Pod development Ripening	Yellow mosaic viral disease	<ul style="list-style-type: none"> Carry out weeding as per need. Under present weather condition yellow mosaic virus infestation observed in cow pea, for control remove the infected plants and make spray of Triazophos 40 % EC @ 10 ml/10 litre of water. Mature pod should pick in time.


Pigeon pea	Growing	BDN-2, GT-100, GJP-1, Vaishali	<ul style="list-style-type: none"> • Carry out inter culturing and weeding.
Castor	Sowing/germination	GC-3,GCH-4, 7	<ul style="list-style-type: none"> • Procure good quality of seeds for kharif sowing. • Carry out sowing as sufficient rain occurs.
Fodder Sorghum & Maize	Growing	- Fall army worm	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor the fodder sorghum for shoot fly/borer infestation and if require spray cypermethrin 25 EC 5 ml in 10 liters of water. • Under present weather condition fall army worm infestation observed, for its control make spray of Emamectin Benzoate 7 gram or Chlorantraniliprole 3 ml /10 litre of water.
Onion Kharif	Sowing/Growing	Purple blotch blight & Ring diseases	<ul style="list-style-type: none"> • To prevent purple blotch blight, colletotrichum and fusarium fungus disease infestation in onion make 3 alternate spray of Propiconazole 15 ml, Mencozeb 25 gm and Carbendazim 10 gm in 10 litre of water at 15 days interval. • To control weed spray oxyflourfen 10 ml/10 litre of water.
Ridge gourd, Bottle gourd, Sponge guard, Bittergourd, Cluster bean, Water melon	Flowering & fruiting	Downy mildew	<ul style="list-style-type: none"> • For the control of downy mildew spray mencozeb 40 g/pump. • Apply light irrigation if sufficient rainfall not occurred.
Ladyfinger	Flowering/fruiting	White flies & Mites	<ul style="list-style-type: none"> • Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml with acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm or imidacloprid 30.5 SC4 ml/10 lit of water for whiteflies control in okra. • Constant monitoring of ladyfinger crop against attack of mite is advised. If population is found more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water is advised. • After harvesting of mature okra application of urea @ 20 kg/ acre should be done.

Brinjal	Flowering/ fruiting	White fly→ Shoot &Fruit borer	<ul style="list-style-type: none"> • To minimize population of whitefly in brinjal, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml with Difenthiuron 50 WP @ 16 gm or Trizophos 40 EC 25 ml / 10 lit of water. • In brinjal, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If fruits and shoot borer population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml /10 litre of water is advised. • Apply light irrigation if sufficient rainfall not occurred.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips→  Mites Viral leaf curling	<ul style="list-style-type: none"> • For control of thrips, spray Profenofos 20 ml with 500 m of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of severe attack, spray Spinosad or Spinetoram 3 ml per 10 liter of water. • If infestation of mite observed in chilli, then spray Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water. • Under weather conditions, rouging of viral infested plants should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Imidacloprid @ 3 ml per 10 litre of water is advised to control the vector. • Apply light irrigation to chili if sufficient rainfall not occurred.
Lemon	Fruit development	Citrus canker Leaf minor	<ul style="list-style-type: none"> • Spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclie 1.5 gm in 10 liters of water for the control of citrys canker in lemon. • Spray Dichlorvosh 10 ml or Quinalphos 20 ml in 10 literss of water for control of leaf minor.
Guava	Fruit development	Fruit fly	<ul style="list-style-type: none"> • For the control of fruit fly in Guava put 5-6 Pheroman trap/ha and spray Malathion 50 % EC 100 ml + 150 gm jaggery solution in 100 litre water during evening hours with large spray droplets.

Livestock & poultry 	Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. Deworming, T.B. and J.D. Testing should be done. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed. Ensure regarding vaccination of animals for different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly's and mosquitoes. Keep fodder in safe place to avoid spoilage due to rainfall.
Note	<p>Kindly download</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAUSAM App for location specific forecast & warning. • MEGHDOOT App for Agromet advisory. • DAMINI App for lighting warning.

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia.

**NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 32
(06.08.2021 to 12.08.2021) over Agricultural region**



Agricultural vigour is moderate over isolated places of the state.