



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમસેવા
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતખાંબોહવાકીય વિભાગ
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરફડિયા-૩૬૦૦૦૨૩
મો.નં. ૮૪૨૬૬૩૮૨૩૫
તા.૨૫-૦૬-૨૦૨૧ થી તા.૨૬-૦૬-૨૦૨૧



(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સૂકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જી.ક્યુ.તરફડિયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)
ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓનું કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૫૧/૨૦૨૧
પાછલા અઠવાડીયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિબળો	
વરસાદ(મી.મી)	47.5
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	29.9-33.0
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	23.8-24.9
ભેજ (%) સવાર	85-98
ભેજ (%) બપોરબાદ	65-100
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	4.2-6.6

હવામાન આગાહી :પત્રક-૫

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતખાંબોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી ૨૬-૦૬-૨૦૨૧ સવારના ૮.૩૦સુધી

તા.૨૫-૦૬-૨૦૨૧ થી ૨૬-૦૬-૨૦૨૧

કૃષિસલાહ :

- ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા વિભાગ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરફડિયા તરફથી જણાવવામાં આવેછે કે, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત ખાંબોહવાકીય વિસ્તારના

રાજકોટ :

તારીખ પેરામોટર	દિવસ-૧ ૨૫-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૬-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૭-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૮-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૯-૦૬-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	17	27	65	65	17
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	32	33	31	31	33
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	25	25	26	26	26
મહત્તમભેજ (%) સવાર	90	91	93	89	87
લઘુત્તમભેજ (%) બપોરબાદ	58	62	70	72	60
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	14	17	16	9	8
પવનની દિશા(ડીગ્રી)	248	249	257	255	180
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	6	7	8	8	7

- રજકોટ જીલ્લામાં આગામી તા.રપ-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.ર૮-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા.રપ થી ર૮ ના રોજ મધ્યમ થી ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન **૩૧-૩૩** ડિગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન **૨૫-૨૬** ડિગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે **૮૭-૮૩** અને **૫૮-૭૨** ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા **પશ્ચિમ** અને **દક્ષિણાંતર** રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૮** થી **૧૭** કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

મોરબી:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૫-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૭-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	12	19	22	22	4
મહત્વમાન તાપમાન(સે.ગ્રે)	32	33	31	31	33
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	25	25	26	26	26
મહત્વમાન ભેજ (%) સવાર	82	85	85	83	80
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	53	55	58	66	53
પવનની ગતિ(કીમી/કલાક)	16	19	18	9	9
પવનની દિશા(ડિગ્રી)	248	249	257	180	117
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	6	8	7	8	8

- મોરબી જીલ્લામાં આગામી તા.રપ-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.ર૮-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા.રપ થી ર૮ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન **૩૧-૩૩** ડિગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન **૨૫-૨૬** ડિગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે **૮૭-૮૩** અને **૫૮-૭૨** રહેશે.
- પવનની દિશા **પશ્ચિમ, દક્ષિણ** અને **અન્ધ્રાંતર** રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૮** થી **૧૭** કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

દેવભૂમિદ્વારકા:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૫-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૭-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧
વરસાદ(મી.મી.)	110	30	40	33	18
મહત્વમાન તાપમાન(સે.ગ્રે)	29	30	30	29	29
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	26	26	27	26	26
મહત્વમાન ભેજ (%) સવાર	89	88	90	85	86
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	65	66	76	62	66
પવનની ગતિ(કીમી/કલાક)	16	17	16	16	8
પવનની દિશા(ડિગ્રી)	248	249	270	300	225
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	4	7	7	8	7

- દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં આગામી તા.રપ-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.ર૮-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા.રપ થી ર૮ ના રોજ મધ્યમ થી ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન **૨૮-૩૦** ડિગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન **૨૬-૨૭** ડિગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે **૮૫-૮૦** અને **૬૨-૭૬** રહેશે.

- | |
|---|
| • પવનની દિશા પશ્ચિમ, વાયવ્ય અને નૈऋત્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૮ થી ૧૭ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. |
|---|

સુરેન્દ્રનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૫-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૬-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૭-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૮-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૯-૦૬-૨૦૨૧
વરસાદ (મી.મી.)	12	36	55	29	11
મહત્વમાન (સે.ગ્રે)	32	33	31	31	33
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	25	25	26	26	26
મહત્વમાન (%) સવાર	81	86	87	86	83
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	56	59	66	68	58
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	14	17	19	10	9
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	248	252	283	160	158
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	7	7	8	8	8

- સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૨૫-૦૬-૨૦૨૧ થી તા.૨૬-૦૬-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળણાયું રહેશે અને તા. ૨૫ થી ૨૮ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૧-૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુકૂળે ૮૧-૮૭ અને ૫૬-૬૮ રહેશે.
- પવનની દિશા પશ્ચિમ અને દક્ષિણાંતર રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૮-૧૮ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

અમરેલી :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૫-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૬-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૭-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૮-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૯-૦૬-૨૦૨૧
વરસાદ (મી.મી.)	17	60	60	65	60
મહત્વમાન (સે.ગ્રે)	33	33	32	30	32
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	25	25	25	24	24
મહત્વમાન (%) સવાર	93	94	94	91	88
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	65	67	78	78	67
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	14	16	16	8	7
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	246	249	292	285	225
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	6	7	8	8	7

- અમરેલી જીલ્લામાં આગામી તા.૨૫-૦૬-૨૦૨૧ થી તા.૨૬-૦૬-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળણાયું રહેશે અને તા. ૨૫ થી ૨૮ ના મધ્યમ થી ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૦-૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૫ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુકૂળે ૮૮-૯૪ અને ૬૫-૭૮ રહેશે.
- પવનની દિશા નૈऋત્ય અને પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૭ થી ૧૬ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

જામનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૫-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૨ ૨૬-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૩ ૨૭-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૪ ૨૮-૦૬-૨૦૨૧	દિવસ-૫ ૨૯-૦૬-૨૦૨૧
વરસાદ (મી.મી.)	65	9	20	25	15
મહત્વમાન (સે.ગ્રે)	34	34	34	33	35
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	27	27	26	26	27
મહત્વમાન (%) સવાર	89	89	90	88	86

લઘુતમ ભેજ (%) બપોરખાદ	62	64	73	66	64
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	15	18	17	11	9
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	248	249	249	295	198
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	5	8	8	8	7

• જામનગર જીલ્લામાં આગામી તા.ર૪-૦૯-૨૦૨૧ થી તા.ર૯-૦૯-૨૦૨૧ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળું અને વાદળછાયું રહેશે અને તા. ર૪ થી ર૯ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

• આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૩-૩૫ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૬-૨૭ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

• આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુતમ ભેજનું પ્રમાણ અનુકૂળે ૮૬-૯૦ અને ૬૨-૭૩ રહેશે.

• પવનની દિશા પશ્ચિમ, વાયવ્ય અને દક્ષિણાંતર રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૮ થી ૧૮ કિમી/કલા રહેવાની શક્યતા છે.

- કોરોના વાયરસ ના સંક્રમણને અટકાવવા એતી કાર્યો અને એત પેદાશના વેચાણ અને બીજ, ખાતર અને દવાઓની ખરીદી દરમ્યાન મો પર કપડું (માસ્ક) બાંધી રાખવું અને બે વ્યક્તિ વચ્ચે ૬ થી ૭ ફૂટ અંતર જાળવવું.
- તા. ૨૮-સપ્ટેમ્બર થી ૦૪-ઓક્ટોબર-૨૦૨૧: હવામાન આગોતરો વરતારો : તા.૨૮-સપ્ટેમ્બર થી ૦૪-ઓક્ટોબર-૨૦૨૧ દરમ્યાન ગરમ, ભેજવાળું અને મોટાભાગે વાદળછાયું રહેશે અને હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- સતત વરસાદના કારણે એતરના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ભરાયેલ પાણીનો નિકાલ કરવો જેથી ઉભો પાક સુકાય નહીં.
- સતત વરસાદના કારણે કપાસ, મરચી અને શાકભાજુ પાકોમાં સુકારો નાં આવે અને ફરી સારી વૃદ્ધિ માટે યુરિયા, એમોનિયમ સલેટ અને મયુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર દરેક ૩૦ કી.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટાર વરાપે આપવું અને મિક્સ માયકોન્યુટ્રીયન્ટ ૧૦૦ ગ્રામ/પ્રતિ પંપ વરાપે છાંટવું.
- જે એતરોમાં વધુ વરસાદના કારણે પાકને ખુબજ નુકશાન થયું હોય અથવા બળી ગયેલ હોય અને ફરી વાવેતર કરવાની જરૂરીયાત હોય ત્યાં અજમા, સુવા, અર્ધ તલ પૂર્વ-૧, દિવેલા, રાયડો અને ચણા (અન્નરા માટે) જેવા પાકોનું વાવેતર કરી શકાય.
- આગામી પાંચ દિવસ હળવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી ઉભા પાકમાં દવા કે ખાતરનો છંટકાવ આ સમય દરમ્યાન મુલત્વી રાખવો.
- પવન સાથે વરસાદની શક્યતા હોવાથી ઉભડી મગફળી હાલ પુરતી ઉપાડવી નહિ અને બાજરી લણીને કુંડા સલામત સ્થળે ઢાંકી દેવા અને મગ-અડણની શીંગો વીણી લેવી.
- હવામાન ચેતવણી:-
- મોબાઇલ સેટેશન :** પવન સાથે વરસાદની શક્યતા હોવાથી ઉભડી મગફળી હાલ પુરતી ઉપાડવી નહિ અને બાજરી લણીને કુંડા સલામત સ્થળે ઢાંકી દેવા.

મુખ્યપાક	પાકઅવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિસલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી)
ચોમાસું મગફળી	ફૂલ/સુયા બેસવા/ડોડવા બંધાવા	સફેદ ફૂગ  પાનાં ટપકા/	<ul style="list-style-type: none"> મગફળીમાં વરાપે નિદામણ કરવું. મગફળીમાં સફેદ ફૂગનો ઉપદ્રવ અટકાવવા ટ્રાયકોડર્મા ફૂગ ર.૫ કી.ગ્રા./હે. મુજબ ગણતીયા દેશી ખાતર અથવા દિવેલાના ખોળ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે. મિશ્ર કરીને જમીનમાં વરાપે આપવું. મગફળીમાં પાનનાં ટપકા અને ગેરુ રોગનો ઉપદ્રવ નાં થાય તે માટે હેકાનોનાઝોલ અથવા ટેબ્યુનોનાઝોલ ૧૬ મિલી દવા ૧

			પર્યાપ્તિના નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો.
કપાસ	ચાપવા બેસવા, કૂલ ખીલવા, ઝીન્ડવા બંધાવા	તડતડીયા, સફેદ માખી અને થ્રીપ્સ	<ul style="list-style-type: none"> ➢ તડતડીયા, સફેદ માખી અને થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ક્લોનીકામ્પીડ ૫૦ ટકા વે.પા. ૪ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો. ➢ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળના નર કૂદાને એકત્રીત કરવા માટે હેક્ટરે ૪૦ ની સંઘામાં ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવવાથી ઈયળોનું શરણાતની અવસ્થાથી જ નિયંત્રણ કરી શકાય. કપાસમાં ગુલાબી ઈયળથી નુકશાન પામેલ કૂલ અને ચાપવા તોડીને જમીનમાં ઢાટી દેવા. વધુ નુકશાન હોય તો પ્રોફેનોફોસ ૫૦% ઇ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા સાયપરમેથીન ૧૦ મિલી બીવેરીયા બાસીઆના કૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો. • બી.ટી. કપાસમાં યુરીયા અને એમોનિયમ સલ્ફેટ અને પ્યુરેટ ઓફ પોટાશ દરેક ૩૦ કી.ગ્રા./હે. પુરતી ખાતર તરીકે વરાપે આપવું. • બી.ટી. કપાસમાં કૂલ ભમરી, ઝીન્ડવા બનવા અને ઝીન્ડવાના વિકાસની અવસ્થાએ ૨ ટકા પોટેશિયમ નાયટ્રોટના દ્રાવણનો (૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૦૦ ગ્રામ) વરાપે છંટકાવ કરવો. • બી.ટી. કપાસમાં વાવેતર બાદ ૬૦, ૭૫ અને ૯૦ દિવસે ૧ ટકા મલ્ટી માયકોન્યુટ્રીયન્ટના દ્રાવણનો (૧૦ લીટર પાણીમાં ૧૦૦ ગ્રામ) વરાપે છંટકાવ કરવો.
તલ	દેહ ધાર્મિક પરિપક્વતા	-	<ul style="list-style-type: none"> • તલ પીળા પાડીને પાન ખરી જાય એટલે સમયસર વરાપે કાપણી કરવી.
બાજરી	દેહ ધાર્મિક પરિપક્વતા	-	<ul style="list-style-type: none"> • પાકી ગયેલ બાજરીના ડુંડા લણીને સલામત સ્થળે ઢાંકી દેવા.
તુવેર	વૃદ્ધિ/ઉગાવો	તુવેર માટે બીડીએન-૨, ગુજરાત તુવેર – ૧૦૦, ગુજરાત તુવેર હાઈબ્રોડ-૧,	<ul style="list-style-type: none"> • વરાપે ઉભા પાકમાં આંતરખેડ અને નિંદામણા કરવું.
દ્વિલા	ઉગાવો/વિકાસ	લીલી અને ધોડિયા ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> • વરાપે ઉભા પાકમાં આંતરખેડ અને નિંદામણા કરવું. • દ્વિલામાં લીલી અને ધોડિયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે ક્લોરાન્ટાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મિલી અથવા ડીડીવીપી ૭૬ ઇસી ૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો.
કુંગળી ચોમાસું	વૃદ્ધિ	રીગ વળી જવી અને જંબલી ધાબાનો રોગ	<ul style="list-style-type: none"> • કુંગળીમાં જંબલી ધાબા, ગુયળાવાળનારી કોલેટોટ્રાયકમ અને ફ્લુએરીયમ કૂગનો રોગ લાગે નહિ તે માટે પ્રોપીકોનાઝોલ, મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અને કાર્બેન્ડાઝીમ ૧૫ ગ્રામ ૧ પર્મ્પમાં વારાફરતી કોઇપણ એક દવા નાખીને ૧૫ દિવસના અંતરે ૩ વરાપે છંટકાવ કરવા.

તુરીયા, દૂધી, ગલકા, કારેલા, ગુવાર, કાકડી	કૂલ/ફળ	શ્રીપસ/ સફેદ માખી	• વેલાવાળા શાકભાજુમાં સફેદમાખીના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ઈમીડાકલોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ મિલી અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો. • જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ વરાપે છંટકાવ કરવો. • વેલાવાળા શાકભાજુમાં તળછારાના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ પ્રતિ પંપમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો. • જો ફળ માખીનો ઉપદ્રવ જણાય તો ૫૦ ગ્રામ ગોળ અને ૩૦ મી.લી. મેલાથીયોન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે મોટા ફોરાએ છંટકાવ કરવો.
ભીડા	કૂલ/ફળ	સફેદમાખી, પાનકથીરી	• ભીડામાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ઈમીડાકલોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ મિલી અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો. • ભીડામાં જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ વરાપે છંટકાવ કરવો.
રોગણી	કૂલ/ફળ	સફેદ માખી કુંખ અને→ ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ પાન કથીરી	> રોગણી અને ટામેટોમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ડાયફેન્ન્યાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૮૫ મી.લી. દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો. > ફળ અને ડોકાનો ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને ક્લોરાન્ટાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મિલી અથવા ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો. > રોગણમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૫૦ ટકા ઈસી ૧૫ મિલી અથવા પ્રોપરગાઇટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો.

મરચી	વૃધ્ઘા/કુલ/કળ	<p>પાનની શ્રીખસ→ કુકડ-</p> <p>પાનની વાયરસ કથીરી કથીરી</p>  	<p>➢ મરચીના શરૂઆતના ઝડપી વિકાસ માટે એમોનિયમ સલેફેટ અને મયુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર દરેક ૨૫ કી.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર વરાપે આપવું અને મિક્સ માયકોન્યુટ્રીયન્ટ ૧૦૦ ગ્રામ/પ્રતિ પંપ વરાપે છાંટવું.</p> <p>➢ ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા એસીટેમાપ્રોડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. અને લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો.</p> <p>➢ વાયરસના કારણે પીળા થઈ કુકડાય ગયેલ છોડ ઉપાડી તેનો જમીનમાં દાટો નાશ કરવો. ત્યાં સફેદ માખીથી ફેલાતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે હોસ્ટાથીયોન દવા ૨૦ મી.લી./૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો.</p> <p>➢ જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ મીલી પ્રતિ પંપ વરાપે છંટકાવ કરવો.</p>
લીબુ	કળનોવિકાસ	<p>સાયવા અને શ્રીખસ</p> <p>બદામી ટપકાં</p>	<p>લીબુમાં સાયલા અને શ્રીખસના નિયંત્રણ માટે ઇમ્પીડાક્લોપ્રોડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી અને લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો.</p>  <p>બદામી ટપકાના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઇડ ૪૦ ગ્રામ અને ૧૫ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીનના બે વરાપે છંટકાવ ૧૫ દિવસના ગાળે કરવા.</p> <ul style="list-style-type: none"> • પાનકોરીયુના નિયંત્રણ માટે કવીનાલફોસ ૨૦ મી.લી. ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છાંટવી.

		પાનકોરીયુ	
જમસૂખ	ફળનોવિકાસ	ફળમાખી	<ul style="list-style-type: none"> જામફળીમાં ફળમાખી નિયત્રણ માટે ફેરોમેન ટ્રેપ મુકવા અને મેલાથીઓન ૫૦ છસી ૧૦૦ મિલી. + ૧૫૦ ગોળ ૧૦૦ લીટર પાણીમાં લેણવી મોટા ફોરાએ સાંજના સમયે વરાપે છાંટવી.
પપેયા	ફૂલ અને ફળ	પાન કથીરી	  <ul style="list-style-type: none"> હાલ ગરમ અને બેજ વાળા હવામાનના કારણે પપ્યામાં પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ જોવા મળેલ છે. જો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૫૦ ટકા છસી ૧૫ મિલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ છ.સી. ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો.
પશુ/મરધા	 <p>પશુઓને શેડમાં રાખવા. પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી અને કરમિયાની દવા આપવી.. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટ્રાઝ ર મિ.લિ. એક લિટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. વરસાદના સમયે પશુઓને સુરક્ષીત જગ્યાએ રાખવા. ચોમાસા દરમ્યાન જાનવરોને રહેઠાણની જગ્યાની વ્યવસ્થિત સફાઈ તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફિનાઈલ છાંટવું. દુધાળા પ્રાણીઓને નિયમિત ૧ કિલ્લો ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્વોનું મિશ્રણ પ્રતિ ૨ લીટર દુધની ઊપજના પ્રમાણમાં આપવું. તેમજ લીલું ઘાસ + સૂકું ઘાસ + ખનીજ તત્વો ખોરાકમાં આપવા. ખુલ્લામાં રાખેલ ઘાસસારો વરસાદથી બગડે નહિ તે માટે જરૂરી પગલા ભરવા.</p>		
નોંધ	<p>નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો</p> <ul style="list-style-type: none"> મૌસમ એપ જીલ્લા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે. મેધદૂત એપ હવામાન આધારિત ફૃષ્ટસલાઇ બુલેટીન માટે. દામીની એપ વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે. 		


જા.નં.જુફયુ/સ્ક્રે.એગ્રોમેટ/બુવેટીન/ / ૨૦૨૧,
તરધડીયા(રાજકોટ), તારીખ:૨૪/૦૮/૨૦૨૧.

તંત્રીશ્રી/દાયરેક્ટરશ્રી,
રાજકોટ,

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં, રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય
કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ય કરાવવા નમ્ર વિનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

ટેકનીકલ ઓફિસર
સુકીએતી સંશોધન કેન્દ્ર
જનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
તરધડીયા

Gujarat





Gramin Krushi Mausam Seva
Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023
Cell :94269 38235



Agromet Advisory Service bulletin No. 51 for North Saurashtra districts(Gujarat)

(Issued jointly by AMFU-DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)

(Period 25 to 29-September- 2021)

Significant past weather for the preceding week of Rajkot

Rainfall (mm)	47.5
Maximum temperature (°C)	29.9-33.0
Minimum temperature (°C)	23.8-24.9
Relative Humidity (%) I	85-98
Relative Humidity (%) II	65-100
Wind speed (Kmph)	4.2-6.6

Weather forecast until 08-30 hrs. of 29/09/2021

(1) RAJKOT DISTRICT:

	25/09/2021	26/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
Rainfall (mm)	17	27	65	65	17
Max.Temp.(°C)	32	33	31	31	33
Min.Temp.(°C)	25	25	26	26	26
RH-I (%)	90	91	93	89	87
RH-II (%)	58	62	70	72	60
Wind Speed (kmph)	14	17	16	9	8
Wind Direction(deg.)	248	249	257	255	180
Total CC (octa)	6	7	8	8	7

- Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and Moderate to heavy rainfall on 25 to 29-September forecasted.
- Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-33°C and 25-26°C, respectively.
- Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 87-93 % & 58-72,

respectively.

- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W, S and 8-17 km/h, respectively.

(2) MORBI DISTRICT:

	25/09/2021	26/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
Rainfall (mm)	12	19	22	22	4
Max.Temp.(°C)	32	33	31	31	33
Min.Temp.(°C)	25	25	26	26	26
RH-I (%)	82	85	85	83	80
RH-II (%)	53	55	58	66	53
Wind Speed (kmph)	16	19	18	9	9
Wind Direction(deg.)	248	249	257	180	117
Total CC (octa)	6	8	7	8	8

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and light to moderate rainfall on 25 to 29-September forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-33°C and 25-26°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 80-85 % & 53-66, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W, S, SE and 9-19 km/h, respectively.

(3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	25/09/2021	26/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
Rainfall (mm)	110	30	40	33	18
Max.Temp.(°C)	29	30	30	29	29
Min.Temp.(°C)	26	26	27	26	26
RH-I (%)	89	88	90	85	86
RH-II (%)	65	66	76	62	66
Wind Speed (kmph)	16	17	16	16	8
Wind Direction(deg.)	248	249	270	300	225
Total CC (octa)	4	7	7	8	7

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and Moderate to heavy rainfall on 25 to 29-September forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 29-30°C and 26-27°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 85-90 % & 62-76, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W, NW, SW and 8-17 km/h, respectively.

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	25/09/2021	26/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
Rainfall (mm)	12	36	55	29	11
Max.Temp.(°C)	32	33	31	31	33
Min.Temp.(°C)	25	25	26	26	26
RH-I (%)	81	86	87	86	83
RH-II (%)	56	59	66	68	58
Wind Speed (kmph)	14	17	19	10	9
Wind Direction(deg.)	248	252	283	160	158
Total CC (octa)	7	7	8	8	8
<ul style="list-style-type: none"> • Rainfall: Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and Light to moderate rainfall on 25 to 29-September forecasted. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-33°C and 25-26°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 81-87 % & 56-68, respectively. • Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W, S and 9-19 km/h, respectively. 					

(5) AMRELI DISTRICT:

	25/09/2021	26/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
Rainfall (mm)	17	60	60	65	60
Max.Temp.(°C)	33	33	32	30	32
Min.Temp.(°C)	25	25	25	24	24
RH-I (%)	93	94	94	91	88
RH-II (%)	65	67	78	78	67
Wind Speed (kmph)	14	16	16	8	7
Wind Direction(deg.)	246	249	292	285	225
Total CC (octa)	6	7	8	8	7
<ul style="list-style-type: none"> • Rainfall: Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and Moderate to heavy rainfall on 25 to 29-September forecasted. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-33°C and 24-25°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 88-94 % & 65-78, respectively. • Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be SW, W and 7-16 km/h, respectively. 					

(6) JAMNAGAR DISTRICT:

	25/09/2021	26/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
Rainfall (mm)	65	9	20	25	15
Max.Temp.(°C)	34	34	34	33	35
Min.Temp.(°C)	27	27	26	26	27
RH-I (%)	89	89	90	88	86
RH-II (%)	62	64	73	66	64
Wind Speed (kmph)	15	18	17	11	9
Wind Direction(deg.)	248	249	249	295	198
Total CC (octa)	5	8	8	8	7

- **Rainfall:** Warm, humid and generally cloudy to cloudy weather and Heavy rainfall on 25-September & light to moderate rainfall on 26 to 29-September forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 33-35°C and 26-27°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 86-90 % & 62-73, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be W, NW, S and 9-18 km/h, respectively.

Agro meteorological Advisories:

General Advice	<ul style="list-style-type: none"> • Keeping in view of threat of COVID-19 spread farmers are advised to follow the government guidelines, personal hygiene, use mask, ensure hand washing with soap at reasonable interval, social distancing of 6 feet during harvesting and other agricultural operation in all crops. • Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast, humid and generally cloudy to cloudy weather and light to Moderate rainfall likely to observe during 29-September to 04-October 2021. • Due to forecast of rain fall during 25-29 September-2021 do not make any kind of foliar spray in standing crop. • Due to continuous rain and wet condition drain out excess runoff water from low-lying area of field immediately for prevention of wilting in all crops. • Apply Urea, ammonium sulphate and murate of potash fertilizers each @ 30 kg/ha in cotton, chilli and other fruiting vegetables immediately to revive growth and to prevent wilting at vapsa condition. • In the field where kharif crops wilted or damaged severely and need to resowing, then sowing of Ajwain, suwa, castor and Semi-rabi sesame (purva-1), chick pea for green pod, mustard are advise.
-----------------------	---

			<ul style="list-style-type: none"> Also make spray of Mencozeb fungicide @ 27 gm/10 litre of water for prevention Alternaria and other fungal diseases in cotton and vegetable crops under clear weather. Postpone harvesting of bunch groundnut, sesame, pearl millet crops due to forecast of rain fall for next five days. Sms : Postpone harvesting of bunch groundnut, sesame, pearl millet crops due to forecast of rain fall for next five days.
Crops	Stage	Insect/Pest/ Variety	Advisory
Kharif groundnut	Pod formation/development	Stem rot	<ul style="list-style-type: none"> Carry out weeding at vapsa condition. Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungus with well decopost FYM OR castor cake @ 500 kg/ha as preventive measures against Sclerotium rolfsii stem rot at vapsa condition. Spray Tebuconazole 10 ml/10 lit of to prevent leaf spot infestation in groundnut under clear weather/sky.
Cotton	Squaring /flowering/ball formation & development	Thrips, white fly & Jassids	<ul style="list-style-type: none"> Under present weather condition, infestation of Jassids, whitefly and thrips observe in cotton, for control the pest spray Flonicamid 50 % WG % 4 gm/ 10 lit of water under weather/clear sky. Farmers are advised to apply Urea, ammonium sulphate and murate of potash fertilizers each @ 30 kg/ha in cotton at vapsa condition. For the monitoring of pink bollworm infestation in cotton crop farmers are advised to put pheromone traps 6-8/ha. If infestation found,pick and burry the infested flowers/bolls in soil for control of pink bollworm infestation in cotton. Also make spray of profenofos 50 EC 20 ml in 10 liters of water. Farmers are advised to spray 3 % KNO3 solution in at flowering, boll initiation and 50% boll formation to Bt. Cotton crop under irrigated condition under clear weather. Detopping of cotton should be done in crop having 4.5-5 feet height at vapsa condition. Carry out weeding at vapsa condition.
Sesame	Physiological maturity	-	<ul style="list-style-type: none"> Harvest the crop in time after wet spell.


Pearl millet	Physiological maturity	-	<ul style="list-style-type: none"> Harvest the mature ear head put them in well ventilated place.
Pigeon pea	Growing	BDN-2, GT-100, GJP-1, Vaishali	<ul style="list-style-type: none"> Drain out accumulatedrain water from low lying area.
Castor	Germination/growing	Heliothis and semilooper	<ul style="list-style-type: none"> To control Heliothis & semilooper in castor spray chlorantraniliprole18.5 % SC 3.0 ml or /10 litre of water when weather become clear.
Onion Kharif	Sowing/Growing	Purple blotch blight & Ring diseases 	<ul style="list-style-type: none"> To prevent purple blotch blight, colletrotrichum and fuserium fungus disease infestation in onion make 3 alternate spray of Propiconazole 15 ml, Mencozeb 25 gm and Carbendazim 10 gm in 10 litre of water at 15 days interval under clear weather.
Ridge gourd, Bottle gourd, Sponge guard, Bittergourd, Cluster bean, Water melon	Flowering & fruiting	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">White flies/ Mites</div> <div style="text-align: center;">Downy mildew</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> In all vegetable crops,whitefly infestation observed above ETL,for control of whitefly,spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml neem oil or acetamiprid 20 % SP@ 5.0 g or imidacloprid17.8 SL 3 ml/10 litre of water under clear weather. If population of mite is observed, then to control it, do spraying of Ethion 50 EC 15 ml in 10 litre of water under clear weather. For the control of downy mildew,SprayMancozeb 75 WP 35 g mix in 10 litre of water under clear weather.
Ladyfinger	Flowering/fruiting	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Mites</div> <div style="text-align: center;">White flies/Jassids</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Constant monitoring of lady finger crop against attack of mite is advised. If population is found more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water under clear weather condtion is advised. For control of whitefly & jassids in Okra, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml neem oil or acephate75 % SP@ 15 gm or imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water under clear weather.

Brinjal	Flowering/ fruiting	<p>Sucking pest→</p> <p>Shoot &Fruit borer</p> <p>Mites</p>	<ul style="list-style-type: none"> For minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of water under clear weather condition. In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato crops, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If insect population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml or DDVP 7 ml/10 litre of water under clear weather condition is advised. If infestation of mite is observed in brinjal, then spraying of Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water under clear weather condition.
Chili	Flowering & fruiting	<p>Thrips→</p>  <p>Leaf curling Virus→</p>  <p>Mites</p>	<ul style="list-style-type: none"> Under present weather condition in transplanted hybrid chili to push up growth make application of ammonium sulphate and murate of potash fertilizers each @ 25 kg/ha at vapsa conditon and make spraying of mix micronutrients 100 gm/10 lit. of water under clear weather. For the control of thrips in chili make sparayof of profenofos 20 ml with 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of heavy attack, spray of spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of water under clear sky. Under present weather conditions, rouging of viral infested plants should be done in chili. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Imidacloprid @ 5 ml per 10litre of water is advisedfor control the vector, when sky remains clear. Constant monitoring of the chilli crop against attack of mites is advised If population is found more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water under clear weather.
Lemon	Fruit development	Psylla and thrips	

		Citrus canker Leaf minor		<ul style="list-style-type: none"> To prevent damage of psylla & thrips spray imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of water under clear weather. Spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclin 1.5 gm in 10 litre of water under clear sky. Spray Quinalphos 20 ml in 10 litres of water for control of leafminor under clear sky.
Guava	Fruit development	Fruit fly		<ul style="list-style-type: none"> For the control of fruit fly in Guava put 5-6 Pheroman trap/ha and spray Malathion 50 % EC 100 ml + 150 gm jaggery solution in 100 litre water during evening hours with large spray droplets.
Papaya	Flowering & fruiting	Mites		<ul style="list-style-type: none"> Due to hot and humid weather mite infestation observed in papaya and if infestation observe above ETL then spray Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water under clear weather condtn.
Livestock & poultry		Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. Deworming, Protozoan disease evaluation and its treatments should be done. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed. Ensure regarding vaccination of animals for different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly's and mosquitoes. Keep fodder in safe place to avoid spoilage due to rainfall.		
Note	<p>Kindly download</p> <ul style="list-style-type: none"> MAUSAM App for location specific forecast & warning. MEGHDOOT App for Agromet advisory. DAMINI App for lighting warning. 			

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia.

Gujarat



Agricultural vigour is good over isolated pockets of the state.