



ગ્રામીણ ફુષિ મૌસમ સેવા
હવામાન આગાહી આધારીત ફુષિ સલાહ બુલેટીન
ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતરાભોહવાકીય વિભાગ
જુનાગઢ ફુષિ યુનીવર્સિટી, તરધડિયા-૩૬૦૦૨૩
તા.૨૫-૧૨-૨૦૨૪ થી તા.૨૬-૧૨-૨૦૨૪



(ગ્રામીણ ફુષિ મૌસમ સેવા, સૂકીએતી સંશોધન કેન્દ્ર, જુ.ક્યુ.તરધડિયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપદ) ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓનું ફુષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૭૭/૨૦૨૪
પાછલા અઠવાડીયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિબળો	
વરસાદ(મી.મી)	0.0
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	24.4-27.6
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	8.0-12.4
ભેજ (%)સવાર	57-86
ભેજ (%)બપોરબાદ	31-46
પવનનીગતિ (કિલી/કલાક)	2.0-3.0

હવામાન આગાહી :પત્રક-૫

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આભોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી ૨૬-૧૨-૨૦૨૪ સવારના ૮.૩૦ સુધી

તા.૨૫-૧૨-૨૦૨૪ થી ૨૬-૧૨-૨૦૨૪

ફુષિસલાહ :

- ભારત સરકારશીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ ફૂષિ મૌસમ સેવા વિભાગ ,જુનાગઢ ફૂષિ યુનિવર્સાઈટી ,તરધડીયા તરફથી જાણાવવામાં આવેછે કે ,ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર પેત આબોહવાકીય વિસ્તારના।

રાજકોટ:

તારીખ પેરામોટર	દિવસ-૧ ૨૫-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૨ ૨૬-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૪ ૨૭-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૪ ૨૮-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૫ ૨૯-૧૨-૨૦૨૪
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાનાની રેટિંગ (સે.ગ્રે)	28	29	30	30	29
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	9	11	12	11	11
મહત્વમાનાની રેટિંગ (%) સવાર	75	80	80	80	80
લઘુત્તમ રેટિંગ (%) બપોરબાદ	40	40	50	50	50
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	13	13	12	13	16
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	14	20	18	9	21
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	0	0	4	4	4

• રાજકોટ જીલ્લામાં આગામી તા.૨૫-૧૨-૨૦૨૪ થી તા.૨૬-૧૨-૨૦૨૪ દરમ્યાન સુંક, ઠંડુ અને ચોખ્યાં હવામાન રહેવાની શક્યતા છે તેમજ તા. ૨૭ થી ૨૮ દરમ્યાન આંશિક વાદળાંથું હવામાન રહેવાની સંભાવના છે.

• આ સમય ગાળામાં મહત્વમાનાની રેટિંગ દરમ્યાન **૨૮-૩૦ ડીગ્રી** સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન **૮-૧૨ ડીગ્રી** સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

• આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાનાની રેટિંગ લઘુત્તમ રેટિંગનું પ્રમાણ અનુક્રમે **૭૫-૮૦** અને **૪૦-૫૦** ટકા રહેશે.

• પવનની દિશા **ઉત્તરની** રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૧૨ થી ૧૬ કિમી/કલાક** રહેવાની શક્યતા છે.

મોરબી:

તારીખ પેરામોટર	દિવસ-૧ ૨૫-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૨ ૨૬-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૪ ૨૭-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૪ ૨૮-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૫ ૨૯-૧૨-૨૦૨૪
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાનાની રેટિંગ (સે.ગ્રે)	28	29	30	30	29
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	9	11	12	11	11
મહત્વમાનાની રેટિંગ (%) સવાર	75	80	80	80	80
લઘુત્તમ રેટિંગ (%) બપોરબાદ	40	40	50	50	50
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	13	13	11	12	16
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	16	24	22	9	25
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	0	0	2	1	0

• મોરબી જીલ્લામાં આગામી તા.૨૫-૧૨-૨૦૨૪ થી તા.૨૬-૧૨-૨૦૨૪ દરમ્યાન સુંક, ઠંડુ અને મોટાભાગે ચોખ્યાં હવામાન રહેવાની શક્યતા છે .

• આ સમય ગાળામાં મહત્વમાનાની રેટિંગ દરમ્યાન **૨૮-૩૦ ડીગ્રી** સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન **૮-૧૨ ડીગ્રી** સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

• આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાનાની રેટિંગ લઘુત્તમ રેટિંગનું પ્રમાણ અનુક્રમે **૭૫-૮૦** અને **૪૦-૫૦** ટકા રહેશે.

• પવનની દિશા **ઉત્તર** અને **ઇશાનની** રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૧૧ થી ૧૬ કિમી/કલાક** રહેવાની શક્યતા છે.

દેવભૂમિદ્વારકા:

તારીખ પેરામોટર	દિવસ-૧ ૨૫-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૨ ૨૬-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૪ ૨૭-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૪ ૨૮-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૫ ૨૯-૧૨-૨૦૨૪
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાનાની રેટિંગ (સે.ગ્રે)	26	27	28	29	29

લધુતમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	14	15	16	16	15
મહતમ ભેજ (%) સવાર	75	75	80	80	80
લધુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	50	60	65	60	60
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	17	19	17	18	21
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	30	34	24	18	37
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	0	0	2	1	0

- દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં આગામી તા.રપ-૧૨-૨૦૨૪ થી તા.૨૮-૧૨-૨૦૨૪ દરમ્યાન સુકું, ઠંડુ અને મોટાભાગે ચોઘ્યું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન **૨૬-૨૮** ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લધુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન **૧૪-૧૬** ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહતમ અને લધુતમ ભેજનું પ્રમાણ અનુકૂમે **૭૫-૮૦** અને **૫૦-૬૫** ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન અને ઉત્તરની રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૧૭** થી **૨૧** કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

સુરેન્દ્રનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૪	દિવસ-૪	દિવસ-૫
	૨૫-૧૨-૨૦૨૪	૨૬-૧૨-૨૦૨૪	૨૭-૧૨-૨૦૨૪	૨૮-૧૨-૨૦૨૪	૨૯-૧૨-૨૦૨૪
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	28	29	30	30	29
લધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	9	11	12	11	11
મહતમ ભેજ (%) સવાર	75	80	80	80	80
લધુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	40	40	50	50	50
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	13	11	9	11	14
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	358	13	24	358	8
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	0	0	4	4	4

- સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં આગામી તા.રપ-૧૨-૨૦૨૪ થી તા.૨૮-૧૨-૨૦૨૪ દરમ્યાન સુકું, ઠંડુ અને ચોઘ્યું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે તેમજ તા. ૨૭ થી ૨૮ દરમ્યાન આંશિક વાદળછાયું હવામાન રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન **૨૮-૩૦** ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લધુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન **૮-૧૨** ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહતમ અને લધુતમ ભેજનું પ્રમાણ અનુકૂમે **૭૫-૮૦** અને **૪૦-૫૦** ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા ઉત્તર અને ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૮** થી **૧૪** કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

અમરેલી :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૪	દિવસ-૪	દિવસ-૫
	૨૫-૧૨-૨૦૨૪	૨૬-૧૨-૨૦૨૪	૨૭-૧૨-૨૦૨૪	૨૮-૧૨-૨૦૨૪	૨૯-૧૨-૨૦૨૪
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	5	2	2
મહતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	27	28	29	29	28
લધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	11	13	14	13	13
મહતમ ભેજ (%) સવાર	60	60	70	70	70
લધુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	35	40	50	50	50
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	12	12	11	12	15
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	90	10	8	358	11
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	0	0	4	4	4

- અમરેલી જીલ્લામાં આગામી તા.રપ-૧૨-૨૦૨૪ થી તા.૨૮-૧૨-૨૦૨૪ દરમ્યાન સુકું, ઠંડુ અને ચોઘ્યું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે તેમજ તા. ૨૭ થી ૨૮ દરમ્યાન આંશિક વાદળછાયું અને છૃટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવા વરસાદી આપટા થવાની સંભાવના છે.
- આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન **૨૭-૨૯** ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લધુતમ તાપમાન

રાત્રી દરમ્યાન ૧૧-૧૪ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ બેજનું પ્રમાણ અનુકૂલ ૬૦-૭૦ અને ૩૫-૫૦ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા પૂર્વ અને ઉત્તરની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૧ થી ૧૫ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

જામનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૫-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૨ ૨૬-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૩ ૨૭-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૪ ૨૮-૧૨-૨૦૨૪	દિવસ-૫ ૨૯-૧૨-૨૦૨૪
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન (સે.ગ્રે)	26	27	28	28	27
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	14	16	17	16	16
મહત્વમાન બેજ (%) સવાર	75	75	80	80	80
લઘુત્તમ બેજ (%) બપોરબાદ	50	50	60	60	60
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	15	16	14	15	18
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	27	31	24	14	32
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	0	0	2	2	0

- જામનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૨૫-૧૨-૨૦૨૪ થી તા.૨૬-૧૨-૨૦૨૪ દરમ્યાન સુકું, હંડુ અને મોટાભાગે ચોખ્યું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૬-૨૮ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૪-૧૭ ડીગ્રી સેલ્ફીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ બેજનું પ્રમાણ અનુકૂલ ૭૫-૮૦ અને ૫૦-૬૦ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન અને ઉત્તરની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૪ થી ૧૮ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

સામાન્ય કૃષિ સલાહ :

હાલના હંડુ હવામાન હોવાથી

- ઉનના ગરમ કપડા પહેરવા.
- હુંકારું ગરમ પાણી અને ગરમ પીણું ચા-કોફી પીવા.
- માથું, નાક, કાન, ગળું, હાથ અને પગ વ્યવસ્થિત રીતે ગરમ કપડાથી ઢાકવા.
- બાળકો અને વૃદ્ધ્યોને ધરની અંદર રહેવા જણાવવું.
- ધર વિહોણા નાગરિકોને સલામત રહેઠાણ અને ગરમ વસ્તોની વ્યવસ્થા કરવી.
- હંડીના કારણે શિયાળું પાકોમાં હિમની અસર ના થાય તે માટે સાંજના સમયે હળવું પિયત આપવું અને પાક અવશેષ/લાસ્ટિકનું આવરણ કરવું.
- તા.૨૬-ડિસેમ્બર-૨૦૨૪ થી ૦૩-જાન્યુઆરી-૨૦૨૫ ૨૦૨૪: હવામાન આગોતરો વરતારો : તા. ૨૬-ડિસેમ્બર-૨૦૨૪ થી ૦૩-જાન્યુઆરી-૨૦૨૫ દરમ્યાન સુકું, હંડુ અને મોટાભાગે સ્વચ્છ હવામાન રહેવાની સંભાવના છે.
- હવામાન ચેતવણી : નથી
- મોબાઇલ સેટેશન : પહીળા પાનવાળા નિંદામણ માટે ઉગવાના ૩૦ થી ૩૫ દિવસ પછી ૨,૪ ડી. ઈથાઇલ એસ્ટર ૨૦ મિલિ અથવા મેટસલફલ્યુરોન ૦.૮ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.

મુખ્યપાક	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિસલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી)
----------	------------	---------------	---

લસણ	વૃદ્ધિ/વિકાસ 	પાનનો સુકારો પીળિયો	<ul style="list-style-type: none"> લસણના પાકમાં વાવેતર બાદ ૩૦-૩૫ દિવસે ૫૪ કી.ગ્રા./હે. યુરિઆ આપવું. લસણના ઉગાવા બાદ જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગ આવે નહિ તે માટે વધુ પડતું પિયત આપવું નહિ. લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગના નિયંત્રણ માટે એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન ૧૧.૪ ટકા + ટેચ્યુંકોનાઝોલ ૧૮.૩ ટકા એસ.સી. ૧૦ મીલી/૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છાન્ટવી.
ચણા	વૃદ્ધિ/ડાળી /ફૂલ	લીલી/લશકરી ઈયળ 	<ul style="list-style-type: none"> ચણાના ઉગાવા બાદ ત્રીજું પિયત આંતર ખેડ કરીને પછી ૨૦-૨૫ દિવસે આપવું. ચણાના પાકમાં લીલી અને લશકરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે પક્ષીઓને બેસવા માટે 'T' આકારના બેલાખડા મુકવા. જો વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો સ્પીનોસાદ ૪ પ એસ.સી ૪ મિલી અથવા ઇન્ડોક્રાકાર્બ ૭ મિલિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. તેમજ લીભોળીનું તેલ પ૦મિલિ અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં કરીને છંટકાવ કરવો. ફૂલ અને પોપટા બંધાવાની અવસ્થાએ પિયત આપવું. વાદળછાયા અને ગરમ હવામાનના કારણે આગતર વાવેતર કરેલ ચણાના પાકમાં લશકરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે પક્ષીઓને બેસવા માટે 'T' આકારના બેલાખડા મુકવા. જો વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો એમામેક્ટીન બેન્જોએટ ૫ % દાણાદાર ૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
રાયડો	ફૂલ / શીંગ	મોલો, થીખ્સ ભુકીછારો	<ul style="list-style-type: none"> રાયડાના પાકમાં ૨૫ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન (૧૨૫ કી.ગ્રા. એમોનિયમ સલ્ફેટ અથવા ૫૪ કી.ગ્રામ.) પ્રતિ હેક્ટર મુજબ વાવેતર બાદ ૨૫-૩૦ દિવસે પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવું. ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોકામ ૨૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીભોળીનું તેલ પ૦મિલિ અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. રાયડાના પાકમાં ભુકીછારાનો ઉપદ્રવ થાય નહિ તે માટે હેકાકોનાઝોલ ૨૫ મિલી/પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
વરીયાળી	વૃદ્ધિ	-	<ul style="list-style-type: none"> વાવેતર બાદ ૩૦-૩૫ દિવસે ૭૭ કી.ગ્રા./હે. યુરિઆ આપવું. વરીયાળીના પાકમાં ગુંદારીયા રોગનો ઉપદ્રવ થાય નહિ તે માટે પિયત પાણી અને નાઈટ્રોજન યુક્ત ખાતરનો વધુ પડતો ઉપયોગ કરવો નહિ.
ઘઉં	ફૂટ	પહોળા - પાનવાળા નિદામણ	<ul style="list-style-type: none"> મુકુટ/તંતુ મૂળ અવસ્થાએ ૧૩૦ કી.ગ્રા. યુરિઆ અને પિયત આપવું. પહોળા પાનવાળા નિદામણ માટે ઉગવાના ૩૦ થી ૩૫

			દિવસ પછી ૨,૪ ડી. ઈથાઈલ એસ્ટર ૨૦ મિલિ અથવા મેટસલફલ્ચુરોન ૦.૮ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
ધાણા	વૃદ્ધિ	મોલો, થ્રીપ્સ ભુકીછારો	<ul style="list-style-type: none"> ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોકઝામ ર૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીબોળીનું તેલ પ૦મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ પ૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. વાદળછાયા હવામાનના કારણે ધાણાના પાકમાં ભુકીછારો નો ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે હેકઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
જીરું	વૃદ્ધિ	મોલો, થ્રીપ્સ ભુકીછારો અને ચરમી	<ul style="list-style-type: none"> ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોકઝામ ર૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીબોળીનું તેલ પ૦મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ પ૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. વાદળછાયા હવામાનના કારણે જીરુંના પાકમાં ભુકીછારો અને કાળીયા રોગનો ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે હેકઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
કપાસ	કપાસની વીળી અને સાંઠી કાઢવી	ગુલાબી ઈયળ	<p>➢ કપાસના પાકમાં ગુલાબી ઈયળનો ભારે ઉપદ્રવ જોવા મળે છે.</p> <p>➢ છેલ્લી વીળી પછી ઘેટા બકરા ચરાવવા. જેથી ખુલ્લા વગરના ગુલાબી ઈયળના નુકશાનવાળા જુંડવા અને અન્ય કયરો નાશ પામે. ત્યારબાદ કરાંઠી સળગાવવી નહિ પરંતુ રોટાવેટર / મોબાઇલ ચોપરથી નાના ટુકડા કરી જમીનમાં દાંટી દેવા જેથી જમીન સેન્ટ્રિય તત્વનો ઉમેરો થવાથી સુંક્ષમ જીવની સંઘાં વધશે અને જમીનના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અથવા કરાંઠી ભેગી કરી શ્રેડરથી નાના ટુકડા કરીને છાણ, યુરીયા, કમ્પોસ્ટ કલ્યાર ઉમેરી દેશી (સેન્ટ્રિય) ખાતર બનાવવું.</p> 
તુવેર	કૂલ/શીંગ	-	<ul style="list-style-type: none"> જરૂરીયાત મુજબ નિદામણ કરવું અને પિયત આપવું. તુવેરમાં શીંગ માખી વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો કવીનાલફોસ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. તુવેરમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળનો વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સ્પીનોસાએ ૪ મી.લી. અથવા એમામેકટીન બેન્જોએટ ૭ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.

દિવેલા	કૂલ અને ગળ બંધાવવા અને માળ પરિપક્વતા	ડોડવા કોરી ખાનાર ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> જરૂરીયાત મુજબ નિદામણ કરવું અને પિયત આપવું. ડોડવા કોરી ખાનાર ઈયળનો વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સ્પીનોસાદ ૪ મી.લી. અથવા એમામેકટીન બેન્જોએટ ૭ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. પાકી ગયેલ માળની સમયસર લાણણી કરવી.
રોગણી	કૂલ/ફળ	સફેદમાખી	<p style="color: blue;">કુંઘ અને → ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ</p> <ul style="list-style-type: none"> રોગણીમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ડાયફેન્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને કલોરાન્ટાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી. (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
મરચી	વૃધ્ય/કૂલ/ફળ	થ્રીપ્સ,સફેદમાખી	 <ul style="list-style-type: none"> પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અને લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મિલી ૧૦લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. થ્રીપ્સનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા ૭ મિલી. અથવા ફ્લુસા મેટા માઈડ ૧૦ % ઈ.સી. ૧૬ મી.લી. પ્રતિ પંપ છાંટવી. મરચીમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા ઇસી ૧૫ મિલિ અથવા પ્રોપરગાઇટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૦ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટરપાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. વાયરસના કારણે કોક્કાયેલ મરચીના છોડ ઉપાડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને ઉભા પાકમાં ઈમીડાકલોપ્રોટ ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
લીભુ	ફળનોવિકાસ	સાયવા અને થ્રીપ્સ	<p>લીભુમાં સાયવા અને થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાકલોપ્રોટ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી અને લીભોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ટાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વરાપેછંટકાવ કરવો.</p> 
		બદામી ટપકાના	<p>બદામી ટપકાના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઇડ ૪૦ ગ્રામ અને ૧.૫ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીનના બે વરાપે છંટકાવ ૧૫ દિવસના ગાળે કરવા.</p> <ul style="list-style-type: none"> પાનકોરીયુના નિયંત્રણ માટે કવીનાલફોસ ૨૦ મી.લી. ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છાંટવી.

		પાનકોરીય	
આંબો	કૂલ	મધીયો અને મગીયાની ઈયળ ભુકીછારો/રાખોડી	<ul style="list-style-type: none"> આંબામાં મધીયો અને મગીયાની ઈયળના નિયંત્રણ માટે ઈમીડિકલોપ્રીડ રિસ્લી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.  <ul style="list-style-type: none"> આંબામાં ભુકીછારો/રાખોડીના નિયંત્રણ માટે હેઝકોનાજોલ્ફ ૧૫ રિસ્લી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 
પશુ/ મરધા		<p>પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ ર મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. કરમિયાની દવા આપવી તથા ઉછરતા પશુઓમાં ઘૃસેલ્વા કાફ્ફિનું રસીકરણ કરાવવું. નાના પશુઓને રાત્રી દરમ્યાન હંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા. પશુને દ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને પ્રતિ લીટર દુધની ઊપજ હીય તેમને નિયમિત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ઘનીજ તત્ત્વોનું મિશ્રણ આપવું. તેમજ ઈલેક્ટ્રીક બલ્બ ચાલુ રાખવા.</p> <ul style="list-style-type: none"> પશુઓને ગરમ હુંફાળું પીવાનું પાણી આપવું. પશુઓને રાત્રી દરમ્યાન હંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા. મરધા ધરમાં જરૂરી હવા ઉજાસ રાખી દીવાલ પર કંતાન અથવા પ્લાસ્ટીક કપડું બાંધવું. તેમજ ઈલેક્ટ્રીક બલ્બ ચાલુ રાખવા. 	
નોંધ	<p>નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો</p> <ul style="list-style-type: none"> મૌસમ એપ જીલ્લા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે. મેધદૂત એપ હવામાન આધારિત ફ્લાઇસલાઈ બુલેટીન માટે. દામીની એપ વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે. 		

જા.નૂ.જુફ્યુ/સૂ.પો./એગ્રોમેટ/બુલેટીન/ / ૨૦૨૪,
તરધડીયા(રાજકોટ), તારીખ: ૨૪/૧૨/૨૦૨૪.

તંત્રીશ્રી/દાયરેક્ટરશ્રી,
રાજકોટ,

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં, રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય
કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ય કરાવવા નભ વિનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

ટેકનીકલ ઓફિસર
સુકીએતી સંશોધન કેન્દ્ર
જુનાગઢ ફણ યુનિવર્સિટી
તરધડીયા।



GraminKrushiMausamSeva
Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023



Agromet Advisory Service bulletin No.77 for North Saurashtra districts(Gujarat)

(Issued jointly by AMFU-DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)

(Period for 25 to 29-December-2024)

Significant past weather for the preceding week of Rajkot

Rainfall (mm)	0.0
Maximum temperature (°C)	24.4-27.6
Minimum temperature (°C)	8.0-12.4
Relative Humidity (%) I	57-86
Relative Humidity (%) II	31-46
Wind speed (Kmph)	2.0-3.0

Weather forecast until 08-30 hrs. of 29/12/2024

(1) RAJKOT DISTRICT:

	25/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	28/12/2024	29/12/2024
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	28	29	30	30	29
Min.Temp.(°C)	9	11	12	11	11
RH-I (%)	75	80	80	80	80
RH-II (%)	40	40	50	50	50
Wind Speed (kmph)	13	13	12	13	16
Wind Direction(deg.)	14	20	18	9	21
Total CC (octa)	0	0	4	4	4

- General weather:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days and partly cloudy weather forecasted during 27 to 29-December-2024.
- Rainfall:** No rainfall forecasted.
- Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 28-30 °c and 9-12°c, respectively.
- Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 75-80 & 40-50, respectively.
- Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be N and 12-16 km/h,

respectively.

(2) MORBI DISTRICT:

	25/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	28/12/2024	29/12/2024
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	28	29	30	30	29
Min.Temp.(°C)	9	11	12	11	11
RH-I (%)	75	80	80	80	80
RH-II (%)	40	40	50	50	50
Wind Speed (kmph)	13	13	11	12	16
Wind Direction(deg.)	16	24	22	9	25
Total CC (octa)	0	0	2	1	0

- General weather:** Dry, cool and clear to mainly clear weather forecasted for next five days.
- Rainfall:** No rainfall forecasted.
- Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 28-30 °c and 9-12°c, respectively.
- Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 75-80 & 40-50, respectively.
- Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be N, NE and 11-16 km/h, respectively.

(3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	25/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	28/12/2024	29/12/2024
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	26	27	28	29	29
Min.Temp.(°C)	14	15	16	16	15
RH-I (%)	75	75	80	80	80
RH-II (%)	50	60	65	60	60
Wind Speed (kmph)	17	19	17	18	21
Wind Direction(deg.)	30	34	24	18	37
Total CC (octa)	0	0	2	1	0

- General weather:** Dry, cool and clear to mainly clear weather forecasted for next five days.
- Rainfall:** No rainfall forecasted.
- Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 26-29 °c and 14-16°c, respectively.
- Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 75-80 & 50-65, respectively.
- Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, N and 17-21 km/h, respectively.

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	25/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	28/12/2024	29/12/2024
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0

Max.Temp.(°C)	28	29	30	30	29
Min.Temp.(°C)	9	11	12	11	11
RH-I (%)	75	80	80	80	80
RH-II (%)	40	40	50	50	50
Wind Speed (kmph)	13	11	9	11	14
Wind Direction(deg.)	358	13	24	358	8
Total CC (octa)	0	0	4	4	4

- **General weather:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days and partly cloudy weather forecasted during 27 to 29-December-2024.
- **Rainfall:** No rainfall forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 28-30 °c and 9-12°c, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 75-80 & 40-50, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be N, NE and 9-14 km/h, respectively.

(5) AMRELI DISTRICT:

	25/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	28/12/2024	29/12/2024
Rainfall (mm)	0	0	5	2	2
Max.Temp.(°C)	27	28	29	29	28
Min.Temp.(°C)	11	13	14	13	13
RH-I (%)	60	60	70	70	70
RH-II (%)	35	40	50	50	50
Wind Speed (kmph)	12	12	11	12	15
Wind Direction(deg.)	90	10	8	358	11
Total CC (octa)	0	0	4	4	4

- **General weather:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days and partly cloudy weather forecasted during 27 to 29-December-2024.
- **Rainfall:** Very light to light rainfall at isolated place forecasted during 27 to 29-December-2024.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 27-29 °c and 11-14°c, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 60-70 & 35-50, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be E, N and 11-15 km/h, respectively.

(6) JAMNAGAR DISTRICT:


	25/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	28/12/2024	29/12/2024
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	26	27	28	28	27
Min.Temp.(°C)	14	16	17	16	16
RH-I (%)	75	75	80	80	80
RH-II (%)	50	50	60	60	60

Wind Speed (kmph)	15	16	14	15	18
Wind Direction(deg.)	27	31	24	14	32
Total CC (octa)	0	0	2	2	0

- **General weather:** Dry, cool and clear to mainly clear weather forecasted for next five days.
- **Rainfall:** No rainfall forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 26-28 °c and 14-17°c, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 75-80 & 50-60, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, N and 14-18 km/h, respectively.

Agro meteorological Advisories:

General Advice	General Advisory Due to prevailing cool weather following cares to be taken			
	<ul style="list-style-type: none"> • Wear several layers of loose warm woolen clothing. • Drink warm water and hot drinks tea, coffee etc. • Cover head, nose, ears, hands and toes as majority of body heat loss occurs through these body parts. • Keeps children and elderly people in side home. • Provide a comfortable stay with basic facilities for homeless residents. • Put up shelters at a strategic potential location for meeting the requirement of shelterless • Due to prevailing cold weather apply light irrigation during evening hours and do mulching to protect the crops & vegetables from chilling injury. • Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast dry, cool, mainly clear weather likely to observe during 29-December- 2024 to 03-January-2025. • Alerts & Warning: NIL • Sms : At 30-35 days after sowing, Spray 2-4-D ethyl ester 20 ml or Metsulfuron 0.8 gm/10 liters of water for the control broad leafy weeds. 			
Crops	Stage	Insect/Pest/ Variety	Advisory	
Garlic	Growing 	Alternaria leaf blight	<ul style="list-style-type: none"> • Apply supplementary dose of nitrogen as urea @ 54 kg/ha at 30-35 days after sowing • Apply irrigation as per need. Do not over irrigate to prevent leaf blight (yellowing) disease in garlic. • To prevent leaf blight disease incidence in garlic, Spray Azoxystrobin 11.4 % + Tebuconazole 18.3 % SC 10 ml in 10 liters of water. 	
Chick pea	Growing/branc		<ul style="list-style-type: none"> • “T” shaped bird perches in and around crop field 	

	hing/flowering /pod formation	Prodenia & Heliothis 	<p>to be installed for natural controlling the insect population. Due to present weather condition infestation of prodenia found above ETL in early sown chick pea, spray Emamectin Benzoate 5 % SG 7 gm in 10 litres of water.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If infestation of Heliothis found above ETL, spray Spinosad 45 SC 4 ml or Indoxacarb 7ml in 10 litres of water. • Apply irrigation at flowering and pod formation stages.
Mustard	Flowering & pod formation	Ahid Powdery mildew	<ul style="list-style-type: none"> • Apply 25 kg nitrogen/ha (125 kg Ammonium sulfet OR 54 kg/ha Urea fertilizer) at 25-30 days after sowing. • Monitor the crop for infestation of Aphid, if infestation observe above ETL then carry out spraying of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water. • Spray 20 ml Hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew disease in mustard.
Wheat	Crown root initiation/Tiller ing	Broad leafy weeds 	<ul style="list-style-type: none"> • Irrigate wheat crop at CRI stage without stress. • Apply 130 kg urea/ha at crown root initiation. • At 30-35 days after sowing, Spray 2-4-D ethyl ester 20 ml or Metsulfuron 0.8 gm/10 liters of water for the control broad leafy weeds.
Coriander	Growing	Aphid/thrips Powdery mildew	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor the crop for infestation of Aphid & thrips, if infestation observe above ETL then carry out spraying of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water. • To prevent excessive growth apply control irrigation and not to apply excess urea fertilizer in coriander. • To prevent powdery mildew infestation in coriander spray Hexaconazole 5 % SC 15 ml/10 liter of water.
Cumin	Growing	Aphid/thrips Blight & Powdery mildew	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor the crop for infestation of Aphid & thrips, if infestation observe above ETL then carry out spraying of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water. • Also spray Mencozeb 27 gm or Hexaconazole 15 ml in 10 liters of water at 10 days interval as

			precautionary measure against blight and powdery mildew diseases.
Cotton	Last picking	Pink ball worm	<ul style="list-style-type: none"> Animals like goats, sheep among others, It should be allowed to graze on unopened bolls and plant debris in the cotton fields after the last picking to prevent infestation in subsequent year. After grazing, don't burn cotton stalk but do in situ chopping & burying of cotton stalk in soil by mobile chopper and rotavator to improve soil biomass and health or prepare exsitu compost. 
Pigeon pea	Flowering/pod formation-development	Pod fly/borer 	<ul style="list-style-type: none"> Monitor the crop for infestation of pod fly and pod borers due to cloudy weather if infestation observed spray quinalphos or profenofos 20 ml/10 litre of water for control of pod fly and Spinosad 4 ml or emamectin benzoate 7 gm/10 litre of water for the control of pod borer complex. Carry out weeding & apply irrigation as per need.
Castor	Flowering/capsule formation & development/spike maturity	Capsule borer→	<ul style="list-style-type: none"> Spray Spinosad 45 SC @ 4.0 ml/ 10 lit of water. Apply irrigation as per need. Harvest mature spikes in time.
Brinjal	Flowering/fruiting	White fly→ Shoot &Fruit borer	<ul style="list-style-type: none"> To minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml with Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of water. In brinjal, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If fruits and shoot borer population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole18.5 % SC 3.0 ml /10 litre of

			water is advised.
Chili	Flowering & fruiting	<p>Thrips→</p>  <p>Mites</p> <p>Viral leaf curling</p>	<ul style="list-style-type: none"> For control of thrips, spray Profenofos 20 ml with 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of severe attack, spray Spinosad or Spinetoram 3 or Fluxametamide 10 % EC 11 ml per 10 liter of water. If infestation of mite observed in chilli, then spray Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water. Under weather conditions, rouging of viral infested plants should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Imidacloprid @ 3 ml per 10 litre of water is advised to control the vector.
Lemon	Fruit development/ripening	<p>Psylla and thrips</p> <p>Citrus canker</p> <p>Leaf minor</p>	 <ul style="list-style-type: none"> To prevent damage of psylla&thrips spray imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of water under clear weather. Spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclin 1.5 gm in 10 litre of water under clear sky. Spray Quinalphos 20 ml in 10 litres of water for control of leafminor under clear sky.
Mango	Flowering	<p>Blossom midge and Leaf hopper→</p>  <p>Powdery Mildew→</p>	<p>To prevent damage spray imidacloprid 3 ml/10 litres of water.</p> <p>Spray 15 ml Hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew disease in mango.</p>

			
Livestock & poultry 	Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. Carry out Brucella and other infectious & reproductive diseases evaluation. Provide ad lib warm water to lactating animals. Keep young calves indoors during night time and provide dry bedding to avoid cold stress. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed. Avoid transportation of poultry birds during noon time. <ul style="list-style-type: none"> • In poultry house gunny bags or plastic sheet curtains should be installed on the side walls of shed with require ventilation. • Provision to switch on light bulbs in the laying hen sheds to maintain temperature. 		
Note	<p>Kindly download</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAUSAM App for location specific forecast & warning. • MEGHDOOT App for Agromet advisory. • DAMINI App for lighting warning. 		

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia.