



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમસેવા
 હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
 ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતાભોહવાકીય વિભાગ
 જુનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી, તરદદિયા-૩૬૦૦૦૨૩
 મો.નં. ૯૪૨૬૯૩૮૨૩૫
 તા. ૨૬-૦૧-૨૦૨૨ થી તા. ૩૦-૦૧-૨૦૨૨



(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સૂકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જી.ક્રિ.યુ., તરદદિયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)
 ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓનું કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૮૭/૨૦૨૨

પાછળા અઠવાડીયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિષ્ઠળો	
વરસાદ(મી.મી)	૦.૦
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૨૨.૧-૨૫.૪
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	૬.૭-૮.૩
ભેજ (%)સવાર	૪૬-૮૧
ભેજ (%)બપોરબાદ	૨૩-૪૯
પવનનીગતિ (કિમી/કલાક)	૧.૨-૨.૨

હવામાન આગાહી :પત્રક-૫

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતાભોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી ૦૨-૦૨-૨૦૨૨ સવારના ૮.૩૦ સુધી

તા. ૨૬-૦૧-૨૦૨૨ થી ૦૨-૦૨-૨૦૨૨

કૃષિસલાહ :

- ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ ફૃષ્ટી મૌસમ સેવા વિભાગ ,જુનાગઢ ફૃષ્ટી યુનિવર્સિટી ,તરધડીયા તરફથી જાણાવવામાં આવેછે કે ,ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

રાજકોટ :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૭-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૩૦-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૩૧-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૦૧-૦૨-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૦૨-૦૨-૨૦૨૨
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન(સે.ગ્રે)	28	29	29	29	29
લઘુત્વમાન(સે.ગ્રે)	11	12	13	15	16
મહત્વમાન (%) સવાર	34	34	56	85	66
લઘુત્વમાન (%) બપોરબાદ	14	13	14	20	25
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	16	11	10	11	9
પવનની દિશા(ડીગ્રી)	63	45	300	332	292
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	0	0	0	0	0

- રાજકોટ જીલ્લામાં અગામી તા.૨૭-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૦૨-૦૨-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડુ અને ચોખ્યું રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન **૨૮-૨૯** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્વમાન રાત્રી દરમ્યાન **૧૧-૧૬** ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્વમાન લેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે **૩૪-૮૫** અને **૧૩-૨૫** ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન, વાયવ્ય અને પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ **૬** થી **૧૬** કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે

મોરબી:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૭-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૩૦-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૩૧-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૦૧-૦૨-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૦૨-૦૨-૨૦૨૨
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન(સે.ગ્રે)	28	29	29	29	29
લઘુત્વમાન(સે.ગ્રે)	11	12	13	15	16
મહત્વમાન (%) સવાર	43	39	56	78	67
લઘુત્વમાન (%) બપોરબાદ	16	16	16	26	31
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	16	11	8	11	7
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	58	32	295	292	292
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	0	0	0	0	0

- મોરબી જીલ્લામાં અગામી તા.૨૭-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૦૨-૦૨-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડુ અને ચોખ્યું

રહેવાની શક્યતા છે.

- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૬-૨૮ ડીગ્રી સેલ્ચીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૧-૧૬ ડીગ્રી સેલ્ચીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ બેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૩૮-૭૮ અને ૧૬-૩૧ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન, વાયવ્ય અને પણ્ણિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૭ થી ૧૬ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

દેવભૂમિદ્વારકા:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૬-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૩૦-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૩૧-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૦૧-૦૨-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૦૨-૦૨-૨૦૨૨
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	26	27	26	26	27
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	15	16	16	17	17
મહત્વમાન બેજ (%) સવાર	46	52	82	90	84
લઘુત્તમ બેજ (%) બપોરબાદ	23	26	29	47	46
પવનની ગતિ(કીમી/કલાક)	19	15	13	12	12
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	63	34	339	296	306
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	0	0	0	0	0

- દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં અગામી તા. ૨૬-૦૧-૨૦૨૨ થી તા. ૦૨-૦૨-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડું અને ચોખ્યું રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૬-૨૭ ડીગ્રી સેલ્ચીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૫-૧૭ ડીગ્રી સેલ્ચીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ બેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૪૬-૬૦ અને ૨૩-૪૭ રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન, ઉત્તર અને વાયવ્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૨ થી ૧૮ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

સુરેન્દ્રનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૬-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૩૦-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૩૧-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૦૧-૦૨-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૦૨-૦૨-૨૦૨૨
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	28	29	29	29	29
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	11	12	13	15	16
મહત્વમાન બેજ (%) સવાર	34	38	52	73	63
લઘુત્તમ બેજ (%) બપોરબાદ	20	20	19	27	33

પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	15	11	9	9	8
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	66	68	270	292	202
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	0	0	0	0	0

• સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં અગામી તા.૨૬-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૦૨-૦૨-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડુ અને ચોખ્યું રહેવાની શક્યતા છે.

• આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૮-૨૯ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૧-૧૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

• આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૩૪-૭૩ અને ૧૮-૩૩ રહેશે.

• પવનની દિશા ઈશાન, પૂર્વ, પશ્ચિમ અને નૈઝેલ્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૮-૧૫ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

અમરેલી :


તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૬-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૩૦-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૩૧-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૦૧-૦૨-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૦૨-૦૨-૨૦૨૨
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	28	29	30	30	31
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	11	12	12	13	14
મહત્વમાન ભેજ (%)સવાર	32	34	43	71	55
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	16	16	14	15	26
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	16	11	9	10	10
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	32	90	270	288	198
વાદળની સ્થિતિ(ઓક્ટા)	0	0	0	0	1

- અમરેલી જીલ્લામાં અગામી તા.૨૬-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૦૨-૦૨-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડુ અને ચોખ્યું રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૮-૩૧ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૧-૧૪ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્વમાન અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૩૨-૭૧ અને ૧૪-૨૬ રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન, પૂર્વ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણાની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૮ થી ૧૬ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

જામનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૬-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૨ ૩૦-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૩ ૩૧-૦૧-૨૦૨૨	દિવસ-૪ ૦૧-૦૨-૨૦૨૨	દિવસ-૫ ૦૨-૦૨-૨૦૨૨
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	28	29	30	29	29

લધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	15	16	16	17	17
મહતમ ભેજ (%) સવાર	42	37	70	86	75
લધુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	19	19	21	36	36
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	18	13	12	12	11
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	68	30	326	292	290
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	0	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> આમનગર જીલ્લામાં અગામી તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૦૨-૦૨-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડ અને ચોખ્યું રહેવાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૮-૨૯ ડીગ્રી સેલ્ચ્યુલિયસ જેટલું તેમજ લધુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૫-૧૭ ડીગ્રી સેલ્ચ્યુલિયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમ્યાન મહતમ અને લધુતમ લેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૩૭-૮૬ અને ૧૮-૩૬ રહેશે. પવનની દિશા પૂર્વ, ઈશાન, વાયવ્ય અને પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૧ થી ૧૮ કિમી/કલા રહેવાની શક્યતા છે. 					
<ul style="list-style-type: none"> કોરોના વાયરસના સંકમણને અટકાવવા એતીકાર્યો અને એતપેદાશના વેચાણ અને બીજ, ખાતર અને દવાઓની ખરીદી દરમ્યાન મો પર કપડું (માસ્ક) બાંધી રાખવું અને બે વ્યક્તિ વચ્ચે ૬ થી ૭ ફૂટ અંતર જાળવવું. ઠંડીના કારણે શિયાળું પાકોમાં છિમની અસર ના થાય તે માટે સાંજના સમયે પિયત આપવું અને આવરણ કરવું. 					
<ul style="list-style-type: none"> હાલની હવામાન પરિસ્થિતિમાં લસણ અને દુંગળીના પાકમાં શ્રીઘનના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મિલી ૧૫ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંકાવ કરવો. ઉનાળું મગફળી, તલ, મગ, અડદ અને શાકભાજના વાવેતર માટે જમીન એડીને તૈયાર કરવી અને પસંદગીના પાકનું સારી જાતનું પ્રમાણિત બિયારણ મેળવી લેવું. તા.૦૨ થી ૦૭-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૨: હવામાન આગોતરો વરતારો : તા.૦૨ થી ૦૭-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂક્ષ્મ, ઠંડ અને મોટા ભાગે ચોખ્યું રહેવાની સંભાવના છે. 					
<p>હવામાન ચેતવણી: નથી</p> <p>મોખાઈલ સંદર્ભ: રાયડામાં ભુકીછારો/રાખોડી અને સફેદ ગેસના નિયંત્રણ માટે હેક્ટાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંકાવ કરવો.</p>					
મુખ્યપાક	પાકઅવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિસલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી)		
ઉનાળું મગફળી	જમીન તૈયાર કરવી	ટીએજી-૨૪, જીજી- ૨, ટિજી-૩૭-એ, ટીપીજી-૪૧	<ul style="list-style-type: none"> દાંતી અને રાપ મારી જમીન તૈયાર કરવી. <p>આ પખવાડીયામાં તાપમાન ૨૨-૨૫ ડીગ્રી સે. થાય એટલે ઉનાળું મગફળીનું વાવેતર કરી દેવું. વાવેતર સમયે મગફળીના બીયાને</p>		

			૧.૨૫ ગ્રામ ટેબ્યુકોનાઝોલ દવાનો ૧ કિ.ગ્રા. દાણા પ્રમાણે પટ આપવો. સીગલ સુપર ફોસ્ફેટ દરૂર્ય કિ.ગ્રા., એમોનીયમ સલ્ફેટ ૧૨૫ કિ.ગ્રા. અને એરંડીનો ખોળ રૂપો કિ.ગ્રા./હેક્ટર અથવા ડી.એ.પી. ૧૦૮ કિ.ગ્રા. અને જુખ્સમ રૂપો કિ.ગ્રા./હેક્ટર અને એરંડીનો ખોળ રૂપો કિ.ગ્રા./હેક્ટર પાણીમાં આપવો.
લસણ	વૃદ્ધિ/વિકાસ	પાનનો સુકારો પીળિયો  થ્રીપ્સ 	<ul style="list-style-type: none"> લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગ આવે નહિ તે માટે વધુ પડતું પિયત આપવું નહિ. લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગના નિયંત્રણ માટે એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન ૧૧.૪ ટકા + ટેબ્યુકોનાઝોલ ૧૮.૩ ટકા એસ.સી. ૧૦ મિલી/૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છાન્ટવી. લસણના પાકમાં થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે લેમ્બડા સાચહેલોથ્રીન ૧૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
ચણા	કૂલ અને પોપટા અવસ્થા	લીલી/લશકરી ઈયળ  સ્ટેટ વાઇરસ 	<ul style="list-style-type: none"> ચણાના પાકમાં લીલી અને લશકરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે પક્ષીઓને બેસવા માટે 'T' આકારના બેલાખડા મુકવા. જો વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો સ્પીનોસાદ ૪૫ એસ.સી ૪ મિલી અથવા ઇન્ડોકાર્બ ૭ મિલિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. તેમજ લીબોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. કૂલ અને પોપટા બંધાવાની અવસ્થાએ પિયત આપવું. ચણામાં સ્ટેટ રોગનો ઉપદ્રવ ફેલાય નહિ તે માટે ચુસિયા જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ઇસી ૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
રાયડો	કૂલ/શીગ બેસવી/ દાણા ભરાવવા	મોલો, થ્રીપ્સ  ભૂકી છારો અને સફેદ ગેરુ	<ul style="list-style-type: none"> ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોકામ ૨૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. રાયડામાં લુકીછારો/રાખોડી અને સફેદ ગેરુના નિયંત્રણ માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

ધાણા	કૂલ /બીજ બંધાવવા	મોલો, થ્રીપ્સ રાખોડી/ભૂકી છારો અને કાળી ચરમી	<ul style="list-style-type: none"> ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોકઝામ રૂપ ટકા મમરી પ ગ્રામ સાથે લીભોળીનું તેલ પ૦મિલિ અથવા લીભોળીના મીજનું પ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ધાણાના પાકમાં ભૂકીછારો/રાખોડી અને કાળી ચરમી નો ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે હેકાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ધાણાનો વધુ પડતો વાનસ્પતિક વિકાસ ના થાય તે માટે પિયત નિયંત્રિત આપવું.
જીડું	ડાળી અને કૂલ	મોલો, થ્રીપ્સ ભૂકી છારો અને કાળી ચરમી	<ul style="list-style-type: none"> ચુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોકઝામ રૂપ ટકા મમરી પ ગ્રામ સાથે લીભોળીનું તેલ પ૦મિલિ અથવા લીભોળીના મીજનું પ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. જૂમાં ભૂકી છારો અને કાળી ચાર્મિના રોગના નિયંત્રણ માટે પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ટકા છસી ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
ઘઉં	નીધલ/કૂલ	-	<ul style="list-style-type: none"> કૂલ અવસ્થાએ પિયત આપવું. ઘઉંમાં ગેરુના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૭૫ ટકા વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
કપાસ	કપાસની વીણી અને સાંઠી કાઢવી	<p>ગુલાબી ઇયળ</p> <p>ગુલાબી ઇયળનાં નિયંત્રણ માટે તેમજ પિયત આપવું નહિ. બીજો ફાલ લેવો નહિ. છેલ્લી વીણી પછી ઘેટા બકરા ચરાવવા. જેથી ખુલ્ખા વગરના ગુલાબી ઇયળના નુકશાન વાળા જુંડવા અને અન્ય કચરો નાશ પામે. ત્યારબાદ કરાંઠી સળગાવવી નહિ પરંતુ રોટાવેટર/મોબાઇલ ચોપરથી નાના ટુકડા કરી જમીનમાં દાંટી દેવા જેથી જમીન સેન્ટ્રિય તત્વનો ઉમેરો થવાથી સુંકમ જીવોની સંઘાની વધશે અને જમીનના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અથવા કરાંઠી ભેગી કરી શ્રેદરથી નાના ટુકડા કરીને છાણ, યુરીયા, કંપોસ્ટ કલ્યર ઉમેરી દેશી(સેન્ટ્રિય) ખાતર બનાવવું.</p> 	
તુવેર	શીંગ પરિપક્વતા	-	<ul style="list-style-type: none"> સમયસર પરિપક્વ શીંગનોની કાપણી કરવી.
દિવેલા	ડોડવા અવસ્થા	-	<ul style="list-style-type: none"> પાકી ગયેલ એરંડાની લુમો સમયસર ઉતારી લેવી.

કુંગળી	ફેર રોપણી અને વૃદ્ધિ અવસ્થા	ફેર રોપણી પર્પલ બ્લોચ અથવા જંબલી ધાબાના 	<ul style="list-style-type: none"> કુંગળીની ફેર રોપણી કરવી. છ અઠવાડીયાથી મોટું ધરું રોપણી માટે ઉપયોગમાં લેવું નહિ. જમીન તૈયાર કરતી વખતે હેક્ટરે ૨૦ ટન સંપૂર્ણ કોહવાયેલ છાણીયું ખાતર, ૨૫ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન (૧૨ કી.ગ્રા. યુરિઆ), ૫૦ કી.ગ્રા. ફોસ્ફોરસ (૧૦૮ કી.ગ્રા. ડિ.એ.પી.)અને ૫૦ કી.ગ્રા. પોટાશ(૮૪ કી.ગ્રા. મ્યુરેટ ઓક્સ પોટાશ) આપવું. કુંગળીના પાકમાં જંબલી ધાબાના રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્જોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા કલોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામના ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા. <p>કુંગળીના પાકમાં થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</p>
રોગણી	ફુલ/ફળ	સફેદ માખી કુંખ અને→ ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> રોગણી અને ટામેટીમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ડાયફેન્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી રૂપ મિ.લી. દ્વાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં ઢાંટી દેવા અને કલોરાનટાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દ્વારા ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
મરચી	વૃદ્ધિ/ફુલ/ફળ	શ્રીપ્સ, સફેદ માખી 	<ul style="list-style-type: none"> પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અને લીભોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મિલી ૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. શ્રીપ્સનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ અથવા સ્પીનેટોરમ દ્વારા ૫ મિલી. પ્રતિ ૫૫ છાંટવી. કાલવ્રણ રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્જોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા કલોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઇલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા.
લીભુ	-	સાયલા અને શ્રીપ્સ	<ul style="list-style-type: none"> તેના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી અને લીભોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીભોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ લિટર

			<p>પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p> 
		<p>બદામી ટપકાના પાનકોરીયુ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • બદામી ટપકાના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઇડ ૪૦ ગ્રામ અને ૧.૫ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન/૧૦ લીટર પાણીમાં બે છંટકાવ ૧૫ દિવસના ગળે કરવા. • પાનકોરીયુના નિયંત્રણ માટે ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાંટવી.
આંબો	કૂલ	<p>મધીયો અને મગાયાની ઈયળ</p> <p>ભુકીછારો/રાખોડી</p>	<ul style="list-style-type: none"> • આંબામાં મધીયો અને મગાયાની ઈયળના નિયંત્રણ માટે ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. • આંબામાં ભુકીછારો/રાખોડીના નિયંત્રણ માટે હેકાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.  

			છંટકાવ કરવો જેથી કેરીનું ખરણ ઓછું થાય.
પશુ/ મરધા	 <p>પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટ્રાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. કરમિયાની દવા આપવી તથા ઉછરતા પશુઓમાં બૃસેલ્વા કાફ્વિનુંની ચકાસણી કરાવવી. નાના પશુઓને રાત્રી દરમ્યાન ઠંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા. પશુને ૬ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને પ્રતિ લીટર દુધની ઊપજ હોય તેમને નિયમિત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્ત્વોનું મિશ્રણ આપવું.તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફીનાઈલ છાંટવું. <ul style="list-style-type: none"> • પશુઓને ગરમ હુંકાળું પીવાનું પાણી આપવું. • નાના પશુઓને રાત્રી દરમ્યાન ઠંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા. • મરધા ઘરમાં જરૂરી હવા ઉજાસ રાખી દીવાલ પર કંતાન અથવા પ્લાસ્ટિક કપડું બાંધવું. તેમજ ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ ચાલુ રાખવા. </p>		
નોંધ	<p>નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો</p> <ul style="list-style-type: none"> • મૌસમ એપ જીલ્વા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે. • મેધારૂત એપ હવામાન આધારિત ફુષિસલાઇ બુલેટીન માટે. • દામીની એપ વરસાથી વીજળીની ચેતવણી માટે. 		

જા.નં.જુફ્યુ/સૂ.એ./એગ્રોમેટ/બુલેટીન/
તરધડિયા(રાજકોટ), તારીખ:૨૮/૦૧/૨૦૨૨.


તંત્રીશ્રી/દાયરેક્ટરશ્રી,
રાજકોટ,

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં ,રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ય કરાવવા નામ વિનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

ટેકનીકલ ઓફિસર
સુકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર
જનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
તરધડિયા

**NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 03
(15.01.2022 to 21.01.2022) over Agricultural region**

Gujarat



Agricultural vigour is good over few pockets of the state.



**Gramin Krushi Mausam Seva
Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023**
Cell :94269 38235



Agromet Advisory Service bulletin No. 87 for North Saurashtra districts(Gujarat)

(Issued jointly by AMFU-DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)

(Period 29-January to 02-February -2022)

Significant past weather for the preceding week of Rajkot

Rainfall (mm)	0.0
Maximum temperature (°C)	22.1-25.4
Minimum temperature (°C)	6.7-8.3
Relative Humidity (%) I	46-81
Relative Humidity (%) II	23-49
Wind speed (Kmph)	1.2-2.2

Weather forecast until 08-30 hrs. of 02/02/2022

(1) RAJKOT DISTRICT:

	29/01/2022	30/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	28	29	29	29	29
Min.Temp.(°C)	11	12	13	15	16
RH-I (%)	34	34	56	85	66
RH-II (%)	14	13	14	20	25
Wind Speed (kmph)	16	11	10	11	9
Wind Direction(deg.)	63	45	300	332	292
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 28-29°C and 11-

16°C, respectively.

- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 34-85 % & 13-25, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, NW, W and 9-16 km/h, respectively.

(2) MORBI DISTRICT:

	29/01/2022	30/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	28	29	29	29	29
Min.Temp.(°C)	11	12	13	15	16
RH-I (%)	43	39	56	78	67
RH-II (%)	16	16	16	26	31
Wind Speed (kmph)	16	11	8	11	7
Wind Direction(deg.)	58	32	295	292	292
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 28-29°C and 11-16°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 39-78 % & 16-31, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, NW, W and 7-16 km/h, respectively.

(3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	29/01/2022	30/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	26	27	26	26	27
Min.Temp.(°C)	15	16	16	17	17
RH-I (%)	46	52	82	90	84
RH-II (%)	23	26	29	47	46
Wind Speed (kmph)	19	15	13	12	12
Wind Direction(deg.)	63	34	339	296	306
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 26-27°C and 15-17°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 46-90 % & 23-47, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, N, NW and 12-19 km/h, respectively.

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	29/01/2022	30/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	28	29	29	29	29
Min.Temp.(°C)	11	12	13	15	16
RH-I (%)	34	38	52	73	63
RH-II (%)	20	20	19	27	33
Wind Speed (kmph)	15	11	9	9	8
Wind Direction(deg.)	66	68	270	292	202
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 28-29°C and 11-16°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 34-73 % & 19-33, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, E, W, SW and 8-15 km/h, respectively.

(5) AMRELI DISTRICT:

	29/01/2022	30/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	28	29	30	30	31
Min.Temp.(°C)	11	12	12	13	14
RH-I (%)	32	34	43	71	55
RH-II (%)	16	16	14	15	26
Wind Speed (kmph)	16	11	9	10	10
Wind Direction(deg.)	32	90	270	288	198
Total CC (octa)	0	0	0	0	1

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 28-31°C and 11-14°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 32-71 % & 14-26, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, E, W, S and 9-16 km/h, respectively.

(6) JAMNAGAR DISTRICT:

	29/01/2022	30/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	28	29	30	29	29
Min.Temp.(°C)	15	16	16	17	17
RH-I (%)	42	37	70	86	75

RH-II (%)	19	19	21	36	36
Wind Speed (kmph)	18	13	12	12	11
Wind Direction(deg.)	68	30	326	292	290
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **Rainfall:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 28-29°C and 15-17°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 37-86 % & 19-36, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be E, NE, NW, W and 11-18 km/h, respectively.

Agro meteorological Advisories:

General Advice	<ul style="list-style-type: none"> • Keeping in view of threat of COVID-19 spread farmers are advised to follow the government guidelines, personal hygiene, use mask, ensure hand washing with soap at reasonable interval, social distancing of 6 feet during harvesting and other agricultural operation in all crops. • Due to prevailing cold weather apply irrigation during evening hours to protect the crops & vegetables from chilling injury. • Under prevailing weather condition heavy attack of thrips observed in garlic and onion crops. For control of thrips in garlic and onion spray profenofos 50 % @ 20 ml/10 litre of water. • Field preparation by cultivator and harrowing for sowing summer crops i.e. groundnut, sesame, green gram, black gram and procure good quality seeds. <p>Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast dry, cool and mainly clear to clear weather likely to observe during 02 to 07-February-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alerts & Warning: NIL <p>Sms.: Spray 15 ml hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew and white rust diseases in mustard.</p>
-----------------------	---

Crops	Stage	Insect/Pest/ Variety	Advisory
Summer groundnut	Field preparation	TAG-24,TG-37-A, TPG-41,GG-2, GJG-31	Prepare the field by ploughing and harrowing for summer groundnut. Carry out sowing of summer groundnut as temperature rises to 22-25°C and give seed treatment of Tebuconazole 1.25 gm/1 kg seed. Apply Single Super Phosphate 625 kg, Ammonium sulphate 125 kg and Castor cake 250 kg/ha OR DAP 108

			kg, Gypsum 250 kg and castor cake 250 kg/ha as basal.
Garlic	Growing	Alternaria leaf blight  Thrips 	<ul style="list-style-type: none"> Do not over irrigate to prevent leaf blight (yellowing) disease in garlic. To prevent blight disease incidence in garlic, Spray Azoxystrobin 11.4 % + Tebuconazole 18.3 % SC 10 ml in 10 liters of water under clear weather. Heavy infestation of thrips observed in garlic. For the control of thrips in garlic spray Profenofos 5% EC 20 ml in 10 lit of water under clear weather.
Chick pea	Flowering/pod formation/development	Heliothis  Stunt virus	<ul style="list-style-type: none"> For monitoring of the pod borer in the gram crop, installation of Pheromone trap @ 3-4 traps per acre is advised. "T" shaped bird perches in and around crop field to be installed for natural controlling the insect population. If infestation of Heliothis found above ETL, spray Spinosad 45 SC 4 ml or Indoxacarb 7ml in 10 litres of water under clear weather. To prevent infestation of stunt virus disease in chickpea spray Imidacloprid 30.5 % EC 5 ml per 10 lit. of water under clear weather for the control of vector. To prevent blight disease infestation spray Mencozeb 75 % WP 27 gm in 10 liters of water as precautionary measure under clear sky. Irrigate gram crop at flowering and pod formation stages.
Mustard	Flowering/ Pod formation/development	Aphid, Thrips Powdery mildew & white rust 	<ul style="list-style-type: none"> Monitor the crop for infestation of Aphid, if infestation observe above ETL then carry out spraying of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiometoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water under clear weather. Spray 15 ml hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew and white rust diseases in mustard. Irrigate mustard crop at flowering and pod formation stages.
Coriander	Flowering/ seed	Aphid/thrips	<ul style="list-style-type: none"> Monitor the crop for infestation of Aphid & thrips, if infestation observe above ETL then carry out spraying

	formation	Powdery mildew/blight	<p>of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water under clear weather.</p> <ul style="list-style-type: none"> • To prevent excessive growth apply control irrigation and not to apply excess urea fertilizer in coriander. • Spray 10 ml Propiconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew/ blight disease in coriander under clear weather.
Cumin	Flowering	Aphid/thrips Powdery mildew and blight	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor the crop for infestation of Aphid & thrips, if infestation observe above ETL then carry out spraying of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml with Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water under clear weather. • Spray 15 ml Propiconazole 25 % EC in 10 liters of water to prevent powdery mildew and blight disease in cumin under clear weather.
Wheat	Flowering	-	<ul style="list-style-type: none"> • Irrigate wheat crop at flowering and milking stages.
Cotton	Plucking & pulling of cotton stalk	<p>Heavy tatack of pink boll worm observed in cotton field. Carry out picking in time.</p> <p>Animals like goats, sheep among others, should be allowed to graze on unopened bolls and plant debris in the cotton fields after the last picking to prevent infestation of pink boll worm in subsequent year. After grazing don't burn cotton stalksbut, recycle the stalk by thedo in situ chopping & burying of cotton stalk in soil by mobile chopper and rotavator or make compost from the cotton residues to improve soil biomass and health.</p> 	
Pigeon pea	Pod Maturity	-	<ul style="list-style-type: none"> • Harvest the mature pods.
Castor	Capsule development, maturity	-	<ul style="list-style-type: none"> • Give irrigation as per crop need under clear sky. • Harvest mature spike in time to prevent shedding of mature capsule.
Onion	Transplanting		<ul style="list-style-type: none"> • Keeping in view of optimum weather conditions, Farmers are advised for transplantation of onion

		Purple Blotch Thrips	<p>seedling in this week. Seedling should not be older than six weeks. Ten to fifteen days before transplanting, apply 20 ton well decomposed FYM with 25 kg nitrogen, 50-60 kg phosphorus and 50 kg potash at the time of last ploughing.</p> <ul style="list-style-type: none"> For the control of purple blotch in onion spray mancozeb 27 gm or Chlorothalonil 75% WP 27 gm in 10 liters of water at 15 days interval under clear sky. Heavy infestation of thrips observed in onion. For the control of thrips in onion spray profenofos 20 ml in 10 lit of water under clear sky.
Brinjal	Flowering/ fruiting	Sucking pest → Shoot & Fruit borer	<ul style="list-style-type: none"> For minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of water under clear weather condition under clear sky. In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato crops, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If insect population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole18.5 % SC 3.0 ml ml/10 litre of water under clear weather condition is advised.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips →  Anthracnose →  Leaf curling Virus → 	<ul style="list-style-type: none"> Under present weather conditions, severe attack of thrips has been reported. Spray Profenofos 20 ml with 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of heavy attack make spray of spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of water under clear sky. For the control of Anthracnose spray Mancozeb 27gm OR Chlorothalonil 27 gram OR Fosetyl 20 gm in 10 liters of water at 15 days interval under clear sky. In present weather conditions, rouging of viral infested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Hostathion 20 ml per 10 litre of water is advised for control the vector white fly under clear sky.


				
Lemon	Fruit development	<p>Psylla and thrips</p>  <ul style="list-style-type: none"> To prevent damage of psylla & thrips spray imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of water under clear sky. <p>Citrus canker</p> <ul style="list-style-type: none"> For the control of citrus canker spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclin1.5 gm in 10 litre of water under clear sky. <p>Leaf minor</p> <ul style="list-style-type: none"> Spray Imidacloprid 17.8 % SL 5 ml or Quinalphos 20 ml in 10 litres of water for control of leaf minor in lemon under clear sky. 		
Mango	Flowering	<p>Blossom midge and Leaf hopper→</p>  <p>Powdery Mildew→</p>  <ul style="list-style-type: none"> To prevent damage of leaf hopper in mago spray imidacloprid 5 ml/10 litres of water under clear sky. For the control of powdery mildew in mango spray 15 ml Hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew disease. To prevent dropping of immature fruits in mango spray 2 gm NAA and 2 kg Urea in 100 litres of water. 		
Livestock & poultry 	<p>Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. Carry out Brucella and other infectious & reproductive diseases evaluation. Spray phenyl in the animal shed to avoid flys and mosquitoes.</p> <p>Provide ad lib warm water to lactating animals. Keep young calves indoors during night time to avoid cold stress. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Provide ad lib warm water to lactating animals. Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed.</p> <p>•In poultry house gunny bags or plastic sheet curtains can be installed on the side walls</p>			

	<p>of shed with require ventilation.</p> <p>• Provision to switch on light bulbs in the laying hen sheds to maintain temperature.</p>
Note	<p>Kindly download</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAUSAM App for location specific forecast & warning. • MEGHDOOT App for Agromet advisory. • DAMINI App for lighting warning.

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia.

**NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 03
(15.01.2022 to 21.01.2022) over Agricultural region**

Gujarat



Agricultural vigour is good over few pockets of the state.